

QK91
.S95
1779f
t.5



RÈGNE
VÉGÉTAL.

SYSTÈME
DES
PLANTES,

Contenant les Classes, Ordres, Genres et Espèces; les caractères naturels et essentiels des Genres; les phrases caractéristiques des Espèces; la citation des meilleures Figures; le climat et le lieu natal des Plantes; l'époque de leur floraison; leurs propriétés et leurs usages dans les Arts, dans l'Économie rurale et la Médecine :

Extrait et traduit des Ouvrages de LINNÉ,

PAR M. J. P. MOUTON-FONTENILLE, de l'Académie, de la Société d'Agriculture, d'Histoire Naturelle et Arts utiles de Lyon, et de plusieurs Sociétés Littéraires et d'Agriculture.

TOME CINQUIÈME.

TABLES.

A LYON,
Chez BRUYSET AINÉ et BUYNAND.

AN XIII — 1805.

+QK91
.S95
1779 f
t.5

SÉRIE des Tables du Système des Plantes.

N.° 1. Table alphabétique françoise des Genres.
N.° 2. Table alphabétique latine des Genres.
N.° 3. Table françoise numérique des Genres.
N.° 4. Table alphabétique Nosologique.
N.° 5. Table alphabétique Pharmacéutique.
N.° 6. Table alphabétiqce latine des Plantes nutritives.
N.° 7. Table systématique des Plantes colorantes.
N.° 8. Table alphabétique latine des Synonymes de G. Bauhin.
N.° 9. Table alphabétique latine des Synonymes des Genres.
N.° 10. Table alphabétique des Auteurs de Botanique.
N.° 11. Table chronologique des Auteurs de Botanique.
N.° 12. Table alphabétique des Etymologies des Genres.

RÈGNE VÉGÉTAL.

TABLE PREMIÈRE.

TABLE ALPHABÉTIQUE FRANÇOISE DES GENRES.

Le premier chiffre indique le *Tome ;* le second le *Numéro du genre ;* le troisième, le *nombre d'Espèces contenues dans chaque genre ;* le quatrième, la *page du Tome.*

A.

Aere,	III	924	1	276	Aizoon,	II	685	3	353
Acajou,	II	546	1	158	Ajonc,	III	932	1	290
Acanthe,	III	857	5	141	Albuce,	II	449	2	38
Acène,	I	173	1	216	Alcée,	III	905	2	238
Ache,	I	397	2	496	Alchemille,	I	177	3	218
Achillee,	III	1053	20	578	Aldrovande,	I	420	1	524
Achit,	I	153	6	201	Alétris,	II	462	5	59
Achyranthe,	I	311	6	387	Alibousier,	II	599	1	214
Acnide,	IV	1219	1	204	Alisier,	II	678	9	337
Aconit,	II	737	7	425	Allamande,	I	321	1	397
Acore,	II	468	1	64	Allione,	I	123	2	174
Acrostich,	IV	1290	29	316	Allophyle,	II	511	1	112
Actée,	II	700	2	387	Aloës,	II	464	7	60
Adansone,	III	900	3	231	Alpinie,	I	4	1	6
Adèle,	IV	1245	3	236	Alstroëmère,	II	466	3	63
Adonis,	II	756	5	450	Alvarde,	I	76	1	100
Agalloche,	IV	1205	1	192	Alysson,	III	869	17	165
Agaric,	IV	1325	28	409	Amandier,	II	674	3	328
Agave,	II	465	4	62	Amaranthe,	IV	1156	22	111
Agérate,	III	1016	2	488	Amaranthine,	I	343	7	424
Agripaume,	III	780	5	47	Amaryllis,	II	439	11	20
Agrostème,	II	635	4	267	Ambrosie,	IV	1153	4	108
Agrostis,	I	86	22	113	Ambrosine,	IV	1118	1	45
Agynéie,	IV	1197	2	169	Amelle,	III	1055	2	583
Aigremoine,	II	663	3	295	Améthyste,	I	37	1	42
Ail,	II	442	39	23	Ammane,	I	163	3	209
Airelle,	II	523	12	119	Ammi,	I	365	3	453

AN 7 - 1969

	tome.	genre.	esp.	pag.
Amome,	I	2	4	4
Amorpha,	III	933	1	291
Anabase,	I	340	3	422
Anacycle,	III	1051	4	573
Anagyre,	II	552	1	172
Ananas,	II	427	7	7
Anastatique,	III	862	2	150
Ancolie,	II	741	4	429
Andarèse,	III	823	2	112
Andrachnée,	IV	1196	2	168
Andromede,	II	593	12	207
Androsace,	I	209	6	269
Andryale,	III	994	3	447
Anémone,	II	752	25	439
Aneth,	I	394	3	491
Angélique,	I	377	5	469
Anguine,	IV	1190	4	157
Angurie,	IV	1129	3	72
Anthéric,	II	455	15	46
Anthocère,	IV	1318	3	376
Antholyze,	I	64	7	77
Anthosperme,	IV	1276	2	292
Antichore,	II	508	1	110
Antidesme,	IV	1216	1	202
Aphytée,	III	...	1	212
Aplude,	IV	1253	3	259
Apocin,	I	332	5	408
Aphyllanthe,	II	441	1	23
Aquartie,	I	142	1	191
Aquilice,	I	303	1	381
Arabette,	III	882	10	189
Arachide,	III	937	1	301
Aralie,	I	417	5	515
Arbousier,	II	596	5	211
Arctope,	IV	1278	1	294
Arctotide,	III	1074	10	620
Arduine,	I	287	1	368
Arec,	IV	1341	2	428
Aréthuse,	IV	1099	4	22
Arétie,	I	208	3	268
Argan,	I	283	7	360
Argémone,	II	705	3	395
Argousier,	IV	1210	2	196
Arguse,	I	204	1	266
Aristide,	I	100	4	139
Aristoloche,	IV	1111	21	36
Armarinthe,	I	372	2	461
Armoise,	III	1025	24	500
Armoselle,	III	1087	5	635
Arnique,	III	1038	7	553
Arroche,	IV	1260	13	268
Artédie,	I	363	1	450
Artichaud,	III	1007	4	471
Asclépiade,	I	333	22	409
Ascyre,	III	982	3	403
Aspalathe,	III	931	29	286
Asperge,	II	457	13	49
Aspérule,	I	128	8	177
Asphodèle,	II	454	3	45
Aster,	III	1034	36	537
Astragale,	III	965	42	357
Astronie,	IV	1214	1	201
Athamanthe,	I	369	9	457
Athanasie,	III	1023	11	496
Atractyle,	III	1009	4	474
Atragène,	II	753	3	444
Atraphaxe,	II	484	2	79
Atrope,	I	266	6	339
Avicenne,	III	855	2	139
Avoine,	I	97	16	134
Axyris,	IV	1138	4	89
Ayénie,	IV	1108	3	31
Azalée,	I	226	6	286

B.

BACCHARIS,	III	1029	8	518
Bæckée,	II	532	1	138
Badomier,	IV	1261	1	270
Badiane,	II	746	2	434
Baguenaudier,	III	954	3	334
Balisier,	I	1	3	3
Ballote,	III	778	5	43
Balsamier,	II	516	8	114
Balsamine,	III	1093	7	647
Baltimore,	III	1068	1	613
Bananier,	IV	1248	3	250
Bandure,	IV	1107	1	30

	tome.	genre.	esp.	pag.
Banistère,	II	622	7	253
Barbon,	IV	1251	21	253
Bardane,	III	1002	3	457
Barrelière,	III	848	7	133
Bartsie,	III	797	4	74
Baselle,	I	413	3	512
Basilic,	III	790	13	65
Batis,	IV	1208	1	193
Bauhine,	II	554	8	174
Bec-de-grue,	III	897	66	217
Béfare,	II	648	1	284
Bégone,	IV	1165	1	121
Béjugo,	I	60	1	73
Belle-de-nuit,	I	259	3	328
Bellie,	III	1043	2	560
Bellone,	I	242	1	316
Bénoite,	II	692	5	372
Berce,	I	375	6	466
Bergère,	II	571	1	191
Bergie,	II	631	1	263
Berle,	I	378	9	471
Bermudiane,	IV	1103	2	28
Beslère,	III	813	3	100
Bétoine,	III	776	5	39
Bette,	I	338	3	419
Bident,	III	1012	12	479
Bignone,	III	817	17	106
Biscutelle,	III	872	6	170
Bissérule,	III	966	1	365
Blairie,	I	145	3	192
Blakée,	II	647	2	283
Blasie,	IV	1316	1	374
Blechne,	IV	1292	5	322
Blérie,	I	145	3	192
Blite,	I	14	3	12
Bobartie,	I	77	1	100
Boccone,	II	643	1	281
Boërrhaave,	I	9	6	8
Bolet,	IV	1326	14	412
Bonduc,	II	560	5	182
Bontie,	III	854	1	139
Bosée,	I	344	1	425
Boucage,	I	396	7	493
Bouleau,	IV	1147	6	97
Boulette,	III	1084	4	633
Bourbone,	III	928	6	279
Bourrache,	I	200	5	261
Brabei,	IV	1262	1	272
Brésillet,	II	559	4	182
Bri,	IV	1311	34	356
Brize,	I	90	5	122
Brome,	I	95	23	129
Brossée,	I	261	1	330
Browalle,	III	834	3	121
Browne,	III	898	1	230
Brunie,	I	293	7	374
Brunsfelse,	I	281	1	359
Bruyère,	II	524	61	122
Bryone,	IV	1194	7	165
Bubon,	I	380	4	474
Buchnère,	III	833	6	121
Bucide,	II	602	1	217
Buddlège,	I	146	2	193
Buffone,	I	180	1	220
Bugle,	III	763	5	10
Buglosse,	I	194	7	253
Bugrane,	III	935	25	294
Bulbocode,	II	440	1	22
Bunias,	III	887	8	201
Buphthalme,	III	1059	10	588
Buplèvre,	I	358	15	442
Burmanne,	II	429	2	9
Bursère,	II	475	1	72
Buis,	IV	1148	1	99
Butome,	II	550	1	162
Buttnère,	I	288	2	368
Buxbaume,	IV	1307	1	351
Bysse,	IV	1324	14	407

C.

Cabaret,	II	642	3	280
Cacalie,	III	1013	16	481
Cacaoyer,	III	972	3	390
Cacte,	II	668	25	318
Caféyier,	I	247	2	319
Caillelait,	I	132	24	181
Caïmitier,	I	282	2	359
Calcéolaire,	I	32	2	36

	tome.	genre.	esp.	pag.
Calebassier,	III	820	2	110
Calée,	III	1021	4	494
Calle,	IV	1121	3	51
Callicarpe,	I	141	2	190
Calligone,	II	735	1	422
Callisie,	I	69	1	85
Callitriche,	I	13	2	11
Calophylle,	II	716	2	402
Calycanthe,	II	695	2	375
Camarine,	IV	1202	2	189
Cambogier,	II	706	1	395
Camélée,	I	52	1	69
Camelle,	III	914	1	254
Cameline,	III	860	9	148
Camérier,	I	326	2	402
Camomille,	III	1052	17	574
Campanule,	I	234	44	303
Campêche,	II	567	1	189
Camphrée,	I	176	4	217
Camarine,	II	480	1	76
Canarium,	IV	1215	1	201
Cannabine,	IV	1237	2	225
Capillaire,	IV	1197	22	338
Capraire,	III	827	3	115
Caprier,	II	699	13	385
Capsique,	I	269	4	349
Capucine,	II	502	4	104
Capure,	II	477	1	74
Carambolier,	II	626	3	256
Cardamine,	III	876	15	174
Cardère,	I	120	3	166
Cardiosperme,	II	540	2	149
Carex,	IV	1137	40	80
Carica,	IV	1232	2	221
Carisse,	I	318	2	395
Carline,	III	1008	7	472
Carmantine,	I	28	22	31
Carotte,	I	364	5	451
Caroubier,	IV	1282	1	298
Carpèse,	III	1028	2	518
Carthame,	III	1010	9	475
Carvi,	I	395	1	492
Caryocar,	II	739	1	428
Caryota,	IV	1343	1	430
Casse,	II	557	31	176
Cassie,	II	578	2	196
Cassine,	I	401	4	502
Cassyte,	II	548	2	160
Cataire,	III	768	15	22
Catesbée,	I	136	1	187
Cature,	IV	1206	2	192
Caucalier,	I	362	6	449
Céanothe,	I	286	3	367
Cédrèle,	I	297	1	377
Célastre,	I	290	6	370
Célosie,	I	312	9	388
Celsie,	III	815	3	104
Centaurée,	III	1066	65	599
Centelle,	IV	1143	2	94
Centenille,	I	151	1	200
Céphalanthe,	I	119	1	166
Céraiste,	II	637	16	270
Cératocarpe,	IV	1125	1	68
Cératophylle,	IV	1162	2	118
Cerbère,	I	319	3	396
Cerfeuil,	I	388	8	483
Ceropége,	I	328	4	404
Cestre,	I	272	3	352
Chalcas,	II	569	1	190
Chalef. *Voyez* ELÉAGNE.				
Chanvre,	IV	1220	1	205
Charagne,	IV	1127	2	71
Chardon,	III	1004	31	462
Charme,	IV	1171	2	131
Chélidoine,	II	703	4	389
Chélone,	III	806	4	87
Chêne,	IV	1168	13	124
Chenilette,	III	959	4	342
Chénopode,	I	337	18	415
Cherlérie,	II	619	1	250
Chèvrefeuille,	I	250	13	321
Chicorée,	III	1000	3	455
Chiocoque,	I	248	2	320
Chionanthe,	I	21	2	21
Chirone,	I	275	8	354
Chlore,	II	519	3	117
Choin.	I	71	15	86
Chondrille,	III	989	3	430

	tome.	genre.	esp.	pag.
Chou,	III	884	12	192
Chrysanthème,	III	1048	22	564
Chrysite,	IV	1281	1	297
Chrysobolan,	II	677	1	337
Chrysocome,	III	1019	11	491
Chrysogone,	III	1071	1	816
Cicca,	IV	1146	1	96
Ciguë,	I	384	3	478
Cimifuge,	II	740	1	428
Cinéraire,	III	1036	13	545
Cinne,	I	15	1	12
Circée,	I	25	2	23
Cissampelos,	IV	1243	3	234
Ciste,	II	728	43	410
Citronnier,	III	974	4	392
Clandestine,	III	801	4	81
Clathre,	IV	1329	4	614
Clavaire,	IV	1332	8	418
Claytone,	I	309	3	386
Clématite,	II	754	12	445
Cleome,	III	890	18	204
Cléonie,	III	794	1	72
Clérodendron,	III	852	4	136
Cléthra,	II	597	1	212
Clibade,	IV	1156	1	111
Clifforte,	IV	1239	6	228
Clinopode,	III	783	3	52
Clitorie,	III	943	5	312
Clusie,	IV	1263	4	272
Clutie,	IV	1247	7	239
Clypéole,	III	870	3	168
Cnique,	III	1005	9	468
Cochléaria,	III	867	8	160
Cocotier,	IV	1338	2	426
Codon,	II	563	1	185
Coldène,	I	185	1	224
Colchique,	II	492	3	89
Collinsone,	I	43	1	51
Columnée,	III	456	2	140
Comaret,	II	694	1	374
Combrète,	II	509	2	111
Comète,	I	167	1	212
Commeline,	I	68	11	84
Comoclade,	I	53	2	69
Concombre,	IV	1193	11	163
Condori,	II	572	2	191
Conferve,	IV	1323	21	404
Conie,	I	367	4	454
Connare,	III	895	1	216
Consoude,	I	197	3	258
Conyze,	III	1030	23	520
Copaier,	II	601	1	216
Coqueluchiole,	I	78	2	101
Coqueret,	I	267	12	341
Corchore,	II	730	8	418
Coréopse,	III	1062	11	594
Coriandre,	I	386	2	480
Coris,	I	260	1	330
Corisperme,	I	12	2	11
Cornillet,	II	616	34	240
Cornouiller,	I	155	7	203
Cornutie,	III	825	1	114
Coronille,	III	956	11	337
Corossol,	II	751	8	438
Corrigiole,	I	409	1	509
Cortuse,	I	211	2	273
Corymbiole,	III	1089	2	637
Coryphe,	IV	1337	1	425
Coste,	I	3	1	5
Cotonnier,	III	910	5	247
Cotonnière,	III	1079	7	627
Cotule,	III	1050	11	571
Cotylier,	II	628	4	257
Coulekin,	IV	1200	1	182
Courbaril,	II	555	1	175
Courge,	IV	1192	6	160
Crambe,	III	889	3	203
Craniolaire,	III	810	2	98
Crapaudine,	III	770	11	27
Crassule,	I	423	25	526
Cratève,	II	654	3	287
Crépide,	III	993	16	443
Cresse,	I	341	1	423
Crinum,	II	438	5	19
Crithme,	I	371	2	460
Crotalaire,	III	934	18	291
Croton,	IV	1181	23	146

	tome.	genre.	esp.	pag.
Crucianelle,	I	133	6	185
Cruzite,	I	179	1	220
Cucubale,	II	615	15	237
Cumin,	I	381	1	475
Cunile,	I	38	3	42
Cunonie,	II	605	1	218
Cupane,	IV	1182	1	150
Cupidone,	III	999	3	454
Curatelle,	II	733	1	421
Curcume,	I	6	2	6
Custute,	I	182	2	221
Cyanelle,	II	453	1	45
Cycas,	IV	1285	1	309
Cyclame,	I	214	2	275
Cymbaire,	III	809	1	97
Cynanche,	I	331	10	406
Cynoglosse,	I	195	8	255
Cynomètre,	II	562	2	185
Cynomore,	IV	1126	1	70
Cynosure,	I	93	10	125
Cyprès,	IV	1177	4	141
Cyrille,	I	294	1	375
Cytise,	III	951	10	330

D.

DACTYLE,	I	92	4	124
Dais,	II	588	2	203
Daléchampe,	IV	1179	1	143
Dattier,	IV	1339	1	427
Décumare,	II	652	1	286
Délime,	II	721	1	405
Delphin,	II	736	8	423
Dentaire,	III	875	3	172
Dent-de-lion,	III	991	8	433
Dentelaire,	I	227	4	287
Diali,	I	23	1	22
Dianthère,	I	29	34	2
Diapense,	I	207	1	268
Dictamne,	II	564	1	186
Digitale,	III	816	8	105
Dillène,	II	745	1	434
Diode,	I	129	1	179
Dionée,	II	584	1	200
Diosme,	I	292	13	372
Dirca,	II	527	1	134
Disandre,	II	497	1	94
Dodart,	III	843	2	128
Dodonée,	II	520	1	117
Dolic,	III	941	26	307
Doradille,	IV	1295	25	324
Dorine,	II	607	2	219
Doronic,	III	1039	3	555
Dorstène,	I	166	4	211
Dracocéphale,	III	787	14	61
Draconte,	IV	1120	5	50
Drave,	III	864	8	152
Drosère,	I	421	6	525
Dryade,	II	693	2	374
Drypis,	I	412	1	512
Duhamèle,	I	249	1	320
Durante,	III	849	2	134
Durio,	III	977	1	395

E.

ÉBÉNIER,	III	938	2	302
Échinophore,	I	359	2	445
Échite,	I	324	11	400
Éclipte,	III	1056	2	584
Égilope,	IV	1256	6	262
Égiphile,	I	158	1	206
Ehrétie,	I	278	4	357
Élais,	IV	1340	1	428
Élaté,	IV	1342	1	429
Élatère,	IV	1128	2	72
Élatine,	II	544	2	152
Éléagne,	I	168	4	213
Éléocarpe,	II	719	1	404
Éléphantope,	III	1081	2	630
Ellise,	I	218	1	279
Élyme,	I	102	9	140
Endormie,	I	263	6	334
Épervière,	III	992	30	436

	tome.	genre.	esp.	pag.
Éphèdre,	IV	1242	2	233
Épigée,	II	594	1	209
Épilobe,	II	507	7	108
Épimède,	I	154	1	202
Épinard,	IV	1218	2	203
Épine-vinette,	II	476	2	73
Érable,	IV	1266	11	274
Éranthème,	I	24	3	32
Érine,	III	832	5	119
Ériocéphale,	III	1078	2	626
Erithale,	I	255	1	326
Érythrine,	III	926	5	278
Erythrone,	II	447	1	37
Erythroxyle,	II	625	2	255
Éthulie,	III	1014	5	484
Éthuse,	I	385	3	479
Euclée,	IV	1236	1	224
Eugénie,	II	671	7	323
Eupatoire,	III	1015	23	485
Euphorbe,	II	665	64	299
Euphraise,	III	799	7	77

F.

Fagarier,	I	157	4	205
Fagone,	II	579	4	197
Ferrare,	IV	1104	1	29
Férule,	I	373	9	462
Festuque,	I	94	16	127
Févier,	II	577	9	194
Feuillée,	IV	1223	2	208
Ficoïde,	II	684	45	347
Figuier,	IV	1283	12	299
Filaria,	I	19	3	19
Flagellaire,	II	486	1	85
Fléau,	I	83	5	109
Flouve,	I	46	3	52
Fluteau,	II	495	8	91
Foin,	I	87	11	116
Fontinale,	IV	1306	4	350
Forskoehle,	II	639	1	274
Fothergille,	II	734	1	421
Fragon,	IV	1246	5	237
Fraisier,	II	689	3	364
Frankène,	II	481	3	76
Frêne,	IV	1273	3	289
Fritillaire,	II	444	6	34
Fromager,	III	901	4	232
Froment,	I	105	13	144
Fuschie,	II	518	2	116
Fumeterre,	III	920	13	266
Fusain,	I	291	3	371
Fusan,	IV	1265	1	274

G.

Gaïac,	II	561	3	184
Gainier,	II	553	2	173
Galanga,	I	5	2	6
Galanthe,	II	433	1	12
Galax,	I	296	1	376
Galé,	IV	1211	6	197
Galéga,	III	963	10	354
Gaëopside,	III	775	3	37
Galène,	II	534	1	139
Gantelée,	I	237	1	313
Garance,	I	134	5	186
Gardène,	I	320	1	396
Garidèle,	II	620	1	251
Garou,	II	526	13	132
Gattilier,	III	853	4	137
Gaulthère,	II	595	1	210
Gaure,	II	506	1	108
Gaurée,	II	515	1	114
Genêt,	III	930	14	283
Genevrier,	IV	1240	10	229
Gentiane,	I	352	31	430
Gentianelle,	I	147	2	194
Genipayer,	I	271	1	351
Geoffroie,	III	902	1	332
Gérarde,	III	805	6	86
Germandrée,	III	764	35	11
Géropogone,	III	983	3	419
Gesnère,	III	807	3	88

	tom.	genre.	esp.	pag.
Gesse,	III	946	21	317
Géthyllide,	II	644	1	281
Ginore,	II	661	1	294
Gin-seng,	IV	1280	3	296
Géroflier,	II	727	1	409
Giroflier,	III	879	17	183
Giroselle,	I	213	1	275
Gisèke,	I	422	1	526
Glabrare,	III	973	1	393
Glauce,	I	314	1	392
Glayeul,	I	63	12	75
Gléchome,	III	773	1	34
Gléditsche,	IV	1272	2	288
Glinus,	II	666	2	311
Globe,	I	45	3	52
Globulaire,	I	118	7	164
Glorieuse,	II	446	2	36
Glouteron,	IV	1152	3	106
Glute,	IV	1109	1	31
Glycine,	III	942	11	311
Gnélme,	III	821	1	111
Gnet,	IV	1188	1	156
Gnide,	II	528	6	135
Gordone,	III	913	1	254
Gortère,	III	1064	5	597
Gouane,	IV	1268	1	278
Gouet,	IV	1119	22	45
Goyavier,	II	670	2	322
Grassette,	I	33	4	36
Gratiole,	I	30	6	34
Grémil,	I	193	7	251
Grenadille,	IV	1110	26	32
Grenadier,	II	673	2	327
Grewe,	IV	1117	4	44
Grias,	II	715	1	401
Griel,	II	633	1	264
Grislée,	II	510	1	111
Gronove,	I	302	1	380
Grosellier,	I	301	8	378
Guettarde,	IV	1161	1	117
Gui,	IV	1209	6	194
Guimauve,	III	904	4	237
Guitarin,	III	818	3	109
Gundèle,	III	1085	1	634
Gunnère,	IV	1102	1	28
Gustave,	III	917	1	256
Gypsophile,	II	612	10	229

H.

HALÉSIE,	II	651	2	286
Hallère,	III	819	1	110
Hamamelis,	I	181	1	220
Haricot,	III	940	15	304
Hasselquiste,	I	360	1	446
Hébenstreitie,	III	831	4	119
Hédyote,	I	124	3	175
Heistère,	II	586	1	202
Hélénie,	III	1041	1	557
Hélianthe,	III	1060	13	590
Hélicone,	I	310	1	386
Helictère,	IV	1114	6	42
Héliocarpe,	II	662	1	294
Héliophile,	III	880	2	187
Héliotrope,	I	191	9	249
Hellébore,	II	760	5	464
Helleborine,	IV	1097	7	19
Hélonias,	II	493	3	90
Helvelle,	IV	1330	2	416
Hémanthe,	II	432	4	12
Hémérocalle,	II	467	2	64
Hémionite,	IV	1293	3	323
Hépatique,	IV	1315	7	372
Hermanne,	III	893	9	213
Hermas,	IV	1270	1	280
Hernande,	IV	1141	2	92
Herniaire,	I	336	4	414
Hêtre,	IV	1170	3	129
Heuchère,	I	349	1	428
Hibisque,	III	911	26	249
Hille,	II	479	1	75
Hippie,	III	1077	1	625
Hippocrépide,	III	958	3	341
Hirée,	II	623	1	254
Hirtelle,	I	299	1	377
Holoste,	I	110	4	149
Hopée,	III	979	1	396
Hormin,	III	788	1	64

	tome.	genre.	esp.	pag.
Hottone,	I	216	2	278
Houblon,	IV	1221	1	206
Houque,	IV	1252	12	257
Houstone,	I	131	2	180
Houx,	I	184	4	223
Hudsone,	II	637	1	290
Hugone,	III	896	1	216
Hyacinthe,	II	461	15	56
Hydne,	IV	1327	5	414
Hydrangée,	II	604	1	218
Hydraste,	II	762	1	467
Hydrocotyle,	I	355	5	440
Hydrole,	I	347	1	427
Hydrophylle,	I	217	2	278
Hyobanche,	III	842	1	128
Hyosère,	III	995	9	448
Hypne,	IV	1312	47	361
Hypociste,	IV	1115	1	43
Hypochéride,	III	997	4	451
Hypoxe,	II	450	4	39
Hyssope,	III	767	3	21

I.

Ibéride,	III	868	12	163
If,	IV	1241	2	232
Igname,	IV	1227	8	213
Illipée,	II	645	1	282
Immortelle,	III	1026	47	507
Impératoire,	I	389	1	485
Indigottier,	III	962	14	352
Inule,	III	1037	25	548
Ipomée,	I	232	21	299
Irésine,	IV	1217	1	202
Iris,	I	65	23	78
Ischème,	IV	1254	2	260
Isnarde,	I	164	1	210
Isopyre,	II	759	3	463
Isoëte,	IV	1301	1	344
Itée,	I	295	1	375
Iva,	IV	1155	2	110
Ivraie,	I	101	4	139
Ixie,	I	62	12	74
Ixore,	I	137	3	188

J.

Jacquine,	I	274	3	353
Jambolier,	II	513	1	113
Jasione,	III	1090	1	637
Jasmin,	I	17	4	18
Jatropha,	IV	1183	8	150
Jonc,	II	471	19	66
Joncinelle,	I	106	5	147
Joubarbe,	II	667	8	312
Julienne,	III	881	6	188
Jungermanne,	IV	1313	29	368
Jusquiame,	I	264	8	335
Jussieue,	II	585	6	291

K.

Kalmie,	II	590	2	205
Kleinhove,	IV	1113	1	41
Kiggelaire,	IV	1233	1	222
Knautie,	I	122	4	173
Knavel,	II	611	3	228
Knotie,	I	130	1	177
Koénige,	I	111	1	150
Kramère,	I	172	1	215
Kuhnie,	I	254	1	326

L.

Lachnée,	II	531	2	138
Laétie,	II	718	2	403
Lagerstroémie,	II	725	1	407

	tome.	genre.	esp.	pag.
Lagoëcie,	I	306	1	384
Lagurier,	I	98	2	137
Laitron,	III	987	12	425
Laitue,	III	988	8	428
Lamie,	III	774	8	35
Lamprette,	II	636	8	268
Lantane,	III	824	9	112
Lappulier,	II	655	4	288
Lapsane,	III	998	4	452
Larmille,	IV	1135	1	79
Laser,	I	374	10	463
Laugère,	I	280	1	358
Laurier,	II	545	12	155
Laurier rose,	I	323	4	399
Lavande,	III	769	4	25
Lavatère,	III	907	9	244
Lawsone,	II	521	2	118
Léchée,	I	116	2	153
Lécythe,	II	720	2	405
Lède,	II	591	1	206
Lée,	IV	1158	2	115
Lemne,	IV	1130	5	73
Lentille,	III	948	6	326
Léontice,	II	456	4	48
Lerchée,	III	891	1	212
Leucoïe,	II	434	3	13
Leysère,	III	1045	3	562
Lichen,	IV	1319	101	377
Lierre,	I	304	2	381
Lilas,	I	22	2	21
Liméole,	II	499	1	96
Limodore,	IV	1098	2	21
Limonellier,	II	582	3	199
Limoselle,	III	837	2	124
Lin,	I	419	22	519
Linaigrette,	I	74	5	98
Linconе,	I	335	1	413
Linderne,	III	828	1	116
Linnée,	III	835	1	122
Lipare,	III	950	6	329
Lippie,	III	844	3	129
Liquidambar,	IV	1174	2	135
Lis,	II	443	9	31
Liseret,	I	416	5	514
Liseron,	I	231	54	291
Lisianthe,	I	224	2	285
Littorelle,	IV	1145	1	96
Livêche,	I	376	7	467
Lobélie,	III	1091	27	638
Loëflinge,	I	58	1	71
Loësèle,	III	826	1	115
Lonchite,	IV	1294	4	323
Loose,	II	724	1	407
Loranthe,	II	478	9	74
Lotier,	III	969	18	377
Ludwige,	I	161	3	207
Lunaire,	III	873	2	171
Lupin,	III	939	8	302
Luzerne,	III	971	9	383
Lycict,	I	273	4	352
Lycope,	I	36	2	41
Lycopode,	IV	1302	25	345
Lycopside,	I	202	7	263
Lysimachie,	I	219	9	280

M.

	tome.	genre.	esp.	pag.
MACERON,	I	393	5	490
Macre,	I	165	1	210
Macrocnème,	I	241	1	315
Magnolier,	II	748	4	436
Maherne,	I	424	2	530
Mahogon,	II	575	1	193
Malachre,	III	903	2	236
Malope,	III	908	1	246
Malpighie,	II	621	9	252
Mammée,	II	713	2	400
Mancenillier,	IV	1186	3	154
Manette,	I	171	1	214
Mangoustan,	II	650	3	285
Manglier,	I	253	3	325
Manguier,	I	298	1	377
Manisuris,	IV	1257	1	263
Manuèle,	III	830	2	118
Marcgrave,	II	696	1	384
Maronnier,	II	498	2	95
Marrube,	III	779	10	44

	tome.	genre.	esp.	pag.
Marsile,	IV	1299	3	343
Martine,	III	811	3	98
Massette,	IV	1131	2	74
Matricaire,	III	1049	6	569
Matthiole,	I	258	1	328
Mauve,	III	906	23	239
Mays,	IV	1133	1	77
Médéole,	II	490	2	88
Mélaleuque,	III	978	1	395
Mélampode,	III	1072	2	617
Mélampyre,	III	800	5	79
Mélanthe,	II	489	4	87
Mélastome,	II	589	12	203
Mélianthe,	III	859	2	143
Mélicoque,	II	514	1	113
Mélie,	II	576	2	193
Mélinet,	I	198	2	259
Mélique,	I	88	6	118
Mélisse,	III	786	6	59
Melitte,	III	789	1	65
Mélochie,	III	894	6	215
Mélothrie,	I	55	1	70
Mémécylon,	II	522	1	119
Ménais,	I	256	1	327
Ménisperme,	IV	1238	8	226
Menthe,	III	771	17	30
Mentzèle,	II	723	1	406
Menyanthe,	I	215	3	276
Mercuriale,	IV	1230	5	218
Mésnée,	III	915	1	255
Michelie,	II	749	2	437
Micocoulier,	IV	1267	3	277
Micrope,	III	1080	2	629
Millepertuis,	III	981	37	397
Millère,	III	1067	2	612
Millet,	I	85	7	112
Mimule,	III	846	2	131
Mimusope,	II	512	2	112
Minuarte,	I	114	3	152
Mitchelle,	I	140	1	190
Mitelle,	II	610	2	227
Mnie,	IV	1310	20	353
Moehringe,	II	536	1	140
Moisissure,	IV	1334	13	421
Molène,	I	262	22	331
Mollé,	IV	1234	2	223
Mollugine,	I	113	4	151
Molucelle,	III	782	3	51
Momordique,	IV	1191	8	158
Monbin,	II	627	2	256
Monarde,	I	40	5	44
Monnière,	III	918	1	265
Monotrope,	II	583	1	209
Monsone,	III	973	1	391
Montie,	I	107	1	148
Morée,	I	66	3	84
Morelle,	I	268	34	343
Morène,	IV	1231	1	220
Morgeline,	I	411	3	511
Morille,	IV	1328	2	415
Morinde,	I	252	3	325
Morine,	I	44	1	51
Morisone,	III	916	1	255
Moschatelline,	II	543	1	152
Mouron,	I	220	5	282
Moutarde,	III	885	13	197
Muenchhause,	III	976	1	394
Mufflier,	III	808	43	89
Muguet,	II	459	8	53
Muntinge,	II	707	1	396
Mûrier,	IV	1150	7	104
Murraie,	II	570	1	190
Mussende,	I	257	3	327
Myginde,	I	190	1	228
Myosure,	I	426	1	531
Myriophylle,	IV	1163	2	119
Myrsine,	I	289	1	369
Myrte,	II	672	13	324

N.

Naïade,	IV	1198	1	180
Name,	I	346	2	427
Napée,	IV	1244	2	235
Narcisse,	II	436	13	15
Nard,	I	73	4	99
Nauclée,	I	239	1	314
Néflier,	II	681	7	341
Nélitte,	III	960	7	343

	tome.	genre.	esp.	pag.
Nénuphar,	II	709	4	397
Néphèle,	IV	1151	1	106
Nerprun,	I	284	24	361
Neurade,	II	640	1	275
Nicotiane,	I	265	7	337
Nielle,	II	742	5	431
Nigrine,	I	228	1	288
Nissole,	III	923	2	275
Nitrare,	II	658	1	290
Noisetier,	IV	1172	2	133
Nolane,	I	206	1	267
Noyer,	IV	1169	5	127
Nyctante,	I	16	5	17
Nyssa,	IV	1275	1	292

O.

OBOLAIRE,	III	840	1	125
Ochnée,	II	714	2	401
Œdère,	III	1082	1	631
Œillet,	II	614	20	233
Œnanthe,	I	382	5	475
Olax,	I	49	1	67
Oldenlande,	I	162	8	208
Olivier,	I	20	3	20
Olyre,	IV	1136	1	80
Omphale,	IV	1139	2	90
Onagre,	II	505	10	106
Onoclée,	IV	1287	2	311
Onoporde,	III	1006	4	470
Onosme,	I	199	3	260
Ophioglosse,	IV	1288	7	311
Ophiorhize,	I	223	2	284
Ophioxyle,	IV	1264	1	273
Ophyre,	II	525	1	131
Ophrys,	IV	1096	19	14
Orchis,	IV	1094	32	5
Orge,	I	104	8	142
Origan,	III	784	11	53
Orme,	I	345	3	426
Ornithogale,	II	451	12	40
Ornithope,	III	957	4	339
Orpin,	II	629	19	258
Orobanche,	III	841	8	126
Orobe,	III	945	9	315
Oronce,	II	469	1	65
Ortége,	I	57	2	71
Ortie,	IV	1149	19	100
Osbeckе,	II	503	1	105
Osmite,	III	1063	3	596
Osmonde,	IV	1289	18	313
Osteosperme,	III	1075	9	622
Othonne,	III	1076	11	624
Oviède,	III	850	2	135

P.

PALETUVIER,	II	646	7	282
Palmiste,	IV	1335	1	424
Panais,	I	392	3	489
Pancrace,	II	437	7	18
Panic,	I	82	33	105
Panicaud,	I	354	9	438
Pâquerette,	III	1042	2	558
Pariétaire,	IV	1259	6	266
Paris,	II	542	1	151
Parkinsone,	II	556	1	176
Parnassie,	I	415	1	513
Paronique,	I	313	17	390
Parthène,	IV	1154	2	109
Paspale,	I	81	5	104
Passerage,	III	865	20	154
Passerine,	II	530	6	136
Pastel,	III	888	4	202
Patagonule,	I	277	1	356
Patience,	II	485	29	79
Paturin,	I	89	24	119
Pavette,	I	138	1	188
Pavot,	II	704	9	391
Paullinie,	II	539	14	147
Pectis,	III	1047	3	563
Pédalie,	III	858	1	142
Pédère,	I	317	1	395
Pédérote,	I	27	3	30
Pédiculaire,	III	804	16	83

	tome.	genre.	esp.	pag.
Pégane,	II	856	2	289
Peltaire,	III	871	1	169
Pentapète,	III	899	3	230
Penthore,	II	630	1	262
Peplide,	II	482	2	77
Percepier,	I	178	1	219
Perdice,	III	1040	3	556
Pergulaire,	I	329	2	405
Pérille,	II	772	1	34
Périploque,	I	330	4	405
Pervenche,	I	322	4	398
Pesse,	I	11	1	10
Pétésie,	I	139	3	189
Pétivère,	II	494	2	90
Pétrée,	III	822	1	111
Peucédan,	I	370	6	459
Peuplier,	IV	1228	5	215
Pézize,	IV	1331	6	416
Pharnace,	I	410	6	510
Phalaris,	I	80	11	103
Phaque,	III	964	6	356
Pharelle,	IV	1160	1	117
Phasque,	IV	1305	5	350
Phellandre,	I	383	2	477
Phlomide,	II	781	13	48
Phloxe,	I	229	10	289
Phylique,	I	285	10	366
Phyllanthe,	IV	1142	6	93
Phyllis,	I	353	1	437
Phryme,	III	796	1	74
Phytolaque,	II	641	4	275
Picride,	III	986	3	424
Pigamon,	II	755	15	448
Pilulaire,	IV	1300	1	344
Pimprenelle,	I	152	3	201
Pin,	IV	1175	12	136
Piscidier,	III	927	2	279
Pisone,	IV	1279	2	295
Pistachier,	IV	1212	5	198
Pistie,	IV	1112	1	40
Pivoine,	III	732	3	420
Plantain,	I	148	21	194
Plaqueminier,	IV	1274	2	290
Platane,	IV	1173	2	134
Plectronie,	I	300	1	378
Pline,	II	676	2	336
Plukenète,	IV	1178	1	143
Plumière,	I	325	4	402
Podagraire,	I	398	1	497
Podophylle,	II	702	2	389
Poincillade,	II	558	3	181
Poirier,	II	682	6	343
Poivrier,	I	47	20	53
Pois,	III	944	4	313
Pois-chiche,	III	949	1	328
Polémoine,	I	233	3	502
Polycnème,	I	59	1	72
Polycarpe,	I	112	1	150
Polygale	III	921	32	269
Polymnie,	III	1070	4	615
Polypode,	IV	1296	68	328
Polyprème,	I	143	1	191
Polytrich,	IV	1309	3	352
Pontédère,	II	431	4	11
Populage,	II	761	1	466
Porane,	I	230	1	290
Porelle,	IV	1303	1	349
Portlande,	I	243	2	316
Potamogeton,	I	186	12	224
Potentille,	II	690	29	365
Poterie,	IV	1167	3	122
Pothos,	IV	1122	7	52
Pourpier,	II	659	7	291
Prase,	III	795	2	73
Prêle,	IV	1284	7	308
Prénanthe,	III	990	9	431
Primevère,	I	210	6	271
Prinos,	II	474	2	72
Prockie,	II	729	1	417
Prosope,	II	568	1	189
Protée,	I	117	29	161
Prunelle,	III	793	3	71
Prunier,	II	675	14	330
Psorale,	III	967	18	365
Psycotre,	I	246	3	318
Ptélée,	I	159	1	206
Ptéride,	IV	1291	20	320
Ptérocarpe,	III	925	3	277
Ptérone,	III	1017	2	489
Pulmonaire,	I	196	6	256
Pyrole,	II	598	6	213

Q.

	tome.	genre.	esp.	pag.
QUÉRIE,	I	115	2	152
Quinquina,	I	245	2	317
Quisqualis,	II	587	1	202

R.

	tome.	genre.	esp.	pag.
RACLE,	IV	1255	9	260
Radiaire,	I	357	2	442
Raifort,	III	886	4	199
Raiponce,	I	236	6	312
Rajanie,	IV	1226	3	212
Raisinier,	II	538	7	146
Randie,	I	225	2	286
Rapette,	I	201	2	262
Rauwolfe,	I	316	3	394
Reaumure,	II	743	1	432
Redoul,	IV	1335	2	224
Réglisse,	III	955	3	335
Renoncule,	II	757	41	451
Renouée,	II	537	27	140
Réséda,	II	664	12	296
Restio,	IV	1204	6	191
Rhacoma,	I	150	1	200
Rhéède,	II	698	1	385
Rhexie,	II	504	3	106
Rhinanthe,	III	798	7	75
Rhodiole,	IV	1229	1	217
Rhubarbe,	II	549	5	160
Riccie.	IV	1317	5	375
Richarde,	II	472	1	70
Ricin,	IV	1184	2	152
Ricinelle,	IV	1180	4	145
Ricotie,	III	874	1	172
Rivine,	I	174	3	216
Riz,	II	483	1	78
Robinier,	III	953	8	333
Rocou,	II	710	1	398
Roelle,	I	235	2	311
Romarin,	I	41	1	45
Ronce,	II	688	15	361
Rondelette,	I	240	4	315
Rondier,	IV	1336	1	425
Roridule,	I	307	1	385
Rosage,	II	592	6	206
Roseau,	I	99	6	137
Rosier,	II	687	17	357
Rotale,	I	56	1	71
Rotang,	II	470	1	66
Rouvet,	IV	1203	1	190
Royène,	II	603	4	217
Rubanier,	IV	1132	2	76
Rudbecke,	III	1061	6	593
Rue,	II	565	4	186
Ruelle,	III	847	13	131
Rumphe,	I	51	1	68
Ruppie,	I	187	1	226

S.

	tome.	genre.	esp.	pag.
SABLIER,	IV	1189	1	156
Sablière,	II	618	25	247
Sabot,	IV	1100	2	23
Safran,	I	61	1	73
Sagine.	I	188	4	227
Sagittaire,	IV	1164	4	119
Sainfoin,	III	961	53	345
Salace,	IV	1105	1	29
Salicaire,	II	660	10	292
Salicorne,	I	10	5	9
Salsifis,	III	984	11	419
Salvadore,	I	175	1	217
Samare,	I	156	1	205
Samole,	I	238	1	313
Samyde,	II	600	5	215
Sang-dragon,	II	458	5	52
Sanguinaire,	II	701	1	388
Sanicle,	I	356	3	441
Santal,	I	169	1	213
Santalin,	I	160	1	207
Santoline,	III	1022	4	495
Saponaire,	II	613	8	231

	tome.	genre.	esp.	pag.
Sapotilier,	II	473	3	71
Saraca,	III	919	1	265
Sarcocollier,	I	144	5	192
Sarothre,	I	414	1	513
Sarracène,	II	708	2	396
Sarrette,	III	1003	14	459
Sarriette,	III	765	8	19
Satyrion,	IV	1095	8	12
Savonnier,	II	541	4	150
Sauge,	I	42	39	45
Saule,	IV	1201	31	182
Saurure,	II	500	2	97
Sauvage,	I	308	1	389
Saxifrage,	II	608	38	220
Scabieuse,	I	121	30	167
Scabrite,	I	125	1	175
Scandix,	I	387	10	481
Scévole,	I	244	1	317
Schwenke,	I	31	1	35
Scheuchzère,	II	487	1	86
Schmidèle,	II	533	1	139
Schrebère,	I	348	1	428
Schwalbée,	III	802	1	82
Scille,	II	452	10	42
Scirpe,	I	73	37	9
Scolyme,	III	1001	2	457
Scopare,	I	149	2	199
Scorpionne,	I	192	5	256
Scorsonère,	III	988	12	422
Scrophulaire,	III	884	16	101
Sebestier,	I	276	6	355
Sécuridaca,	III	922	2	275
Séguière,	II	731	1	419
Seigle,	I	103	4	142
Sélagine,	III	829	9	117
Selin,	I	368	5	456
Seneçon,	III	1033	40	530
Sensitive,	IV	1271	46	281
Septas,	II	501	1	97
Sériole,	III	996	4	450
Serpicule,	IV	1144	1	90
Sésame,	III	845	2	129
Séseli,	I	390	11	486
Sésuve,	II	680	1	341
Shérarde,	I	127	3	177
Sibbaldie,	I	425	2	530
Sibthorpe,	III	836	1	123
Sicyos,	IV	1195	3	167
Side,	III	902	21	233
Sigesbecke,	III	1057	2	585
Siliquier,	I	183	3	222
Silphe,	III	1069	6	614
Siphonanthe,	I	135	1	187
Sison,	I	379	6	472
Sisymbre,	III	877	27	177
Sloane,	II	711	2	399
Smilax,	IV	1225	13	210
Solandre,	IV	1269	1	279
Soldanelle,	I	212	1	274
Sophore,	II	551	12	171
Sorbier,	II	679	3	339
Souchet,	I	72	26	89
Souci,	III	1073	8	618
Soude,	I	339	13	420
Spargoute,	II	638	5	273
Spartie,	III	929	13	280
Spathélie,	I	403	1	505
Spermacoce,	I	126	6	176
Sphagne,	IV	1304	3	349
Sphéranthe,	III	1083	3	632
Spigélie,	I	222	2	284
Spilanthe,	III	1011	6	477
Spinifex,	IV	1250	1	253
Spirée,	II	686	14	354
Splachne,	IV	1308	4	352
Stachyde,	III	777	15	40
Stapélie,	I	334	3	413
Staphylier,	I	404	2	505
Statice,	I	418	18	516
Stébée,	III	1086	4	634
Stehéline,	III	1018	6	490
Stellaire,	II	617	8	243
Stellère,	II	529	2	136
Stémode,	III	839	1	125
Sterculie,	IV	1185	2	153
Stéris,	I	342	1	424
Stewarte,	III	912	1	253
Stilago,	IV	1106	1	30
Stilbé,	IV	1277	2	293
Stillinge,	IV	1187	1	155

	tome.	genre.	esp.	pag.
Stipe,	I	96	6	132
Stratiote,	II	744	2	433
Strumphe,	III	1088	1	636
Struthiole,	I	170	2	214
Subulaire,	III	863	1	151
Sucre,	I	79	4	101
Sumac,	I	399	17	498
Sureau,	I	402	4	503
Surelle,	II	634	16	264
Suriane,	II	632	1	263
Swerse,	I	351	5	429
Symplocos,	III	980	1	396
Syringa,	II	669	2	322

T.

TABERNÉMONTANE,	I	327	6	403
Tagète,	III	1044	3	560
Tamarin,	I	50	1	67
Tamarisque,	I	405	2	506
Tame,	IV	1224	2	209
Tanaisie,	III	1024	8	498
Tarchonanthe,	III	1020	1	493
Targione,	IV	1314	1	372
Télèphe,	I	408	2	509
Terre-noix,	I	366	2	454
Tétracère,	II	738	1	428
Tétragone,	II	683	2	346
Thapsie,	I	391	5	488
Thlaspi,	III	866	10	157
Thé,	II	726	2	408
Théligone,	IV	1166	1	122
Théophraste,	I	221	1	283
Thésie,	I	315	12	393
Thalie,	I	8	1	8
Thryallis,	II	581	1	198
Thuya,	IV	1176	3	140
Thym,	III	785	11	56
Thymbre,	III	766	2	20
Tiarelle,	II	609	2	227
Tillandse,	II	428	9	8
Tillée,	I	189	2	228
Tilleul,	II	717	2	402
Tinus,	II	547	1	159
Tolu,	II	566	1	188
Toque,	III	792	15	69
Tordylier,	I	361	7	447
Torène,	III	812	1	99
Tormentille,	II	691	2	371
Tourneforte,	I	205	7	266
Tozzie,	III	803	1	82
Tradescante,	II	430	7	10
Tragie,	IV	1140	5	91
Trèfle,	III	968	46	368
Trémelle,	IV	1320	8	394
Trewe,	II	712	1	399
Trianthème,	II	606	3	219
Tribule,	II	580	4	198
Trichilie,	II	573	3	192
Trichomane,	IV	1298	11	341
Trichostème,	III	791	2	68
Tridax,	III	1054	1	583
Trientale,	II	496	1	94
Trigonelle,	III	970	10	380
Trilix,	II	697	1	384
Trillie,	II	491	3	88
Trioptère,	II	624	1	254
Trioste,	I	251	2	324
Triplare,	I	109	1	149
Tripsaque,	IV	1134	2	78
Trixide,	I	108	1	149
Troène,	I	18	1	19
Trolle,	II	758	2	462
Trophis,	IV	1207	1	193
Troscart,	II	488	3	86
Tubéreuse,	II	460	1	55
Tubalge,	II	435	1	14
Tulipe,	II	448	3	38
Tulipier,	II	747	2	435
Turnère,	I	407	4	508
Turrée,	II	574	1	192
Turrite,	III	883	3	191
Tussilage,	III	1032	10	527

U.

	tome.	genre.	esp.	pag.		tome.	genre.	esp.	pag.
ULVE,	IV	1322	16	402	Utriculaire,	I	34	8	37
Uniole,	I	91	4	124	Uvaire,	II	750	2	437
Urène,	III	909	4	247	Uvulaire,	II	445	3	36

V.

VAILLANT,	IV	1258	8	264	Verge-d'or,	III	1035	14	542
Valériane,	I	48	20	68	Vergerette,	III	1031	19	523
Vallisnérie,	IV	1199	1	180	Véronique,	I	26	38	24
Vandèle,	III	838	1	124	Verveine,	I	35	16	39
Vanille,	IV	1101	30	24	Vesce,	III	947	18	322
Varec,	IV	1321	57	395	Vesce-de-loup,	IV	1333	15	419
Varrone,	I	279	6	357	Vigne,	I	305	8	382
Vatère,	II	722	1	406	Violette,	III	1092	27	642
Vatique,	II	649	1	284	Viorne,	I	400	9	500
Vélar,	III	878	6	182	Vipérine,	I	203	11	264
Vélèze,	I	350	1	428	Volkamère,	III	851	3	136
Velle,	III	861	2	150	Vomique,	I	270	2	350
Vératre,	IV	1249	3	251	Vulnéraire,	III	936	13	298
Verbésine,	III	1058	9	586	Vulpin,	I	84	8	110

W.

WACHENDORFE,	I	67	3	83	Weinmanne,	II	535	1	139
Walthère,	III	892	3	213	Williche,	I	54	1	70
					Wintérane,	II	653	1	287

X.

XÉRANTHÈME,	III	1027	13	515	Xylope,	IV	1116	2	44
Ximénie,	II	517	2	115	Xyris,	I	70	1	86
Xylophylle,	I	406	2	507					

Y.

YUQUE,	II	463	4	60

Z.

	tome.	genre.	esp.	pag.		tome.	genre.	esp.	pag.
ZAMIE,	IV	1286	1	310	Zinne,	III	1046	2	562
Zannichellie,	IV	1124	1	68	Zizane,	IV	1159	3	116
Zanonie,	IV	1222	1	207	Ziziphore,	I	39	4	43
Zanthoxyle,	IV	1213	2	200	Zoégée,	III	1065	1	598
Zédoaire,	I	7	2	7	Zostère,	IV	1123	2	53

Fin de la première Table.

TABLE SECONDE.

TABLE ALPHABÉTIQUE LATINE DES GENRES.

Le premier chiffre indique le *Tome ;* le second le *Numéro du genre ;* le troisième, le *nombre d'Espèces contenues dans chaque genre ;* le quatrième, la *page du Tome.*

A.

	tome.	genre.	esp.	pag.
Abrus,	III	924	1	276
Acæna,	I	173	1	216
Acalypha,	IV	1180	4	145
Acanthus,	III	857	5	141
Acer,	IV	1266	11	274
Achillea,	III	1053	20	578
Achras,	II	473	3	71
Achyranthes,	I	311	6	387
Acnida,	IV	1219	1	204
Aconitum,	II	735	7	425
Acorus,	II	468	1	64
Acrostichum,	IV	1290	29	316
Actæa,	II	700	2	387
Adansonia,	III	900	1	231
Adelia,	IV	1245	3	236
Adenanthera,	II	572	2	191
Adiantum,	IV	1297	22	338
Adonis,	II	756	6	450
Adoxa,	II	543	1	152
Ægilops,	IV	1256	6	262
Ægiphila,	I	158	1	206
Ægopodium,	I	398	1	497
Æschynomene,	III	960	7	343
Æsculus,	II	498	2	95
Æthusa,	I	385	3	479
Agaricus,	IV	1325	18	409
Agave,	II	465	4	62
Ageratum,	III	1016	2	488
Agrimonia,	II	663	3	295
Agrostema,	II	635	4	267
Agrostis,	I	86	22	113
Agyneia,	IV	1197	2	169
Aira,	I	87	11	116
Ajuga,	III	763	5	10
Aizoon,	II	685	3	353
Albuca,	II	449	2	38
Alcea,	III	905	2	238
Alchemilla,	I	177	3	218
Aldrovanda,	I	420	1	524
Alectris,	II	462	5	59
Alisma,	II	495	8	91
Allamanda,	I	321	1	397
Allionia,	I	123	2	174
Allium,	II	442	39	23
Allophyllus,	II	511	1	112
Aloë,	II	464	7	60
Alopecurus,	I	84	8	110
Alpinia,	I	4	1	5
Alsine,	I	411	3	511
Alstroëmeria,	II	466	3	63
Althæa,	III	904	4	237
Alyssum,	III	869	17	165
Amaranthus,	IV	1157	22	111
Amaryllis,	II	439	11	20
Ambrosia,	IV	1153	4	108
Ambrosinia,	IV	1118	1	45
Amellus,	III	1055	2	583

	tome.	genre.	esp.	pag.
Amethystea,	I	37	1	42
Ammannia,	I	163	3	209
Ammi,	I	365	3	453
Amomum,	I	2	4	4
Amorpha,	III	933	1	291
Amygdalus,	II	674	3	328
Amyris,	II	516	8	114
Anabasis,	I	340	3	422
Anacardium,	II	546	1	158
Anacyclus,	III	1051	5	573
Anagallis,	I	220	5	282
Anagyris,	II	552	1	172
Anastatica,	III	862	2	150
Anchusa,	I	194	7	253
Andrachne,	IV	1196	2	168
Andromeda,	II	593	12	207
Andropogon,	IV	1251	21	253
Androsace,	I	209	6	269
Andryala,	III	994	3	447
Anemone,	II	752	25	439
Anethum,	I	394	3	491
Angelica,	I	377	5	469
Anguria,	IV	1129	3	72
Annona,	II	751	8	438
Anthemis,	III	1052	17	574
Anthericum,	II	415	15	46
Anthoceros,	IV	1318	3	376
Antholyza,	I	64	7	77
Anthospermum,	IV	1276	2	292
Anthoxanthum,	I	46	3	52
Anthyllis,	III	936	13	298
Antichorus,	II	508	1	110
Antidesma,	IV	1216	1	202
Antirrhinum,	III	808	43	89
Aphanes,	I	178	1	219
Aphyllanthes,	II	441	1	23
Aphyteia,	III	. . .	1	212
Apium,	I	397	2	496
Apluda,	IV	1253	3	259
Apocynum,	I	332	5	408
Aquartia,	I	142	1	191
Aquilegia,	II	741	4	429
Aquilicia,	I	303	1	381
Arabis,	III	882	10	189
Arachis,	III	937	1	301
Aralia,	I	417	5	515
Arbutus,	II	596	5	211
Arctium,	III	1002	3	457
Arctopus,	IV	1278	1	294
Arctotis,	III	1074	10	620
Arduina,	I	287	1	368
Areca,	IV	1341	2	428
Arenaria,	II	618	25	247
Arethusa,	IV	1099	4	22
Aretia,	I	208	3	268
Argemone,	II	705	3	395
Aristida,	I	100	4	139
Aristolochia,	IV	1111	21	36
Arnica,	III	1038	7	553
Artedia,	I	363	1	450
Artemisia,	III	1025	24	500
Arum,	IV	1119	22	45
Arundo,	I	99	6	137
Asarum,	II	642	3	280
Ascyrum,	III	982	3	403
Asclepias,	I	333	22	409
Aspalathus,	III	931	29	286
Asparagus,	II	457	13	49
Asperugo,	I	201	1	262
Asperula,	I	128	8	177
Asphodelus,	II	454	3	45
Asplenium,	IV	1295	25	324
Aster,	III	1034	35	537
Astragalus,	III	965	42	357
Astrantia,	I	357	2	442
Astronium,	IV	1214	1	201
Athamanta,	I	369	9	457
Athanasia,	III	1023	11	496
Atractylis,	III	1009	4	474
Atragene,	II	753	3	444
Atraphaxis,	II	484	2	79
Atriplex,	IV	1260	13	268
Atropa,	I	266	6	339
Avena,	I	97	16	134
Averrhoa,	II	626	3	256
Avicennia,	III	855	2	139
Axyris,	IV	1138	4	89
Ayenia,	IV	1108	3	31
Azalea,	I	226	6	286
Azarum,	II	642	3	280

B.

	tome.	genre.	esp.	pag.
Baccharis,	III	1029	8	518
Bæckea,	II	532	1	138
Ballota,	III	778	5	43
Baltimora,	III	1068	1	613
Banisteria,	II	622	7	253
Barleria,	III	848	7	133
Bartsia,	III	797	4	74
Basella,	I	413	4	512
Basia,	II	645	1	282
Batis,	IV	1208	1	193
Bauhinia,	II	554	8	174
Befaria,	II	648	1	284
Begonia,	IV	1165	1	121
Bellis,	III	1042	2	558
Bellium,	III	1043	2	560
Bellonia,	I	242	1	316
Berberis,	II	476	2	73
Bergera,	II	571	1	191
Bergia,	II	631	1	263
Besleria,	III	813	3	100
Beta,	I	338	3	419
Betonica,	III	776	5	39
Betula,	I	1147	6	97
Bidens,	III	1012	12	479
Bignonia,	III	817	17	106
Biscutella,	III	872	6	170
Bisserula,	III	966	1	365
Bixa,	II	710	1	398
Blœria,	I	145	3	192
Blakea,	II	647	2	283
Blasia,	IV	1316	1	374
Blechnum,	IV	1292	5	322
Blitum,	I	14	3	12
Bobartia,	I	77	1	100
Bocconia,	II	643	1	281
Boerrhaavia,	I	9	6	8
Boletus,	IV	1326	14	412
Bombax,	III	901	4	232
Bontia,	III	854	1	139
Borassus,	IV	1336	1	425
Borbonia,	III	928	6	279
Borrago,	I	200	5	261
Bosea,	I	344	1	425
Brabeium,	IV	1262	1	271
Brassica,	III	884	12	192
Briza,	I	90	5	122
Bromelia,	II	427	7	7
Bromus,	I	95	23	129
Brossæa,	I	261	1	330
Browallia,	III	834	3	121
Brownæa,	III	898	1	230
Brunfelsia,	I	281	1	359
Brunia,	I	293	6	374
Bryonia,	IV	1194	7	165
Bryum,	IV	1311	34	356
Bubon,	I	380	4	474
Buchnera,	III	833	6	121
Bucida,	II	602	1	217
Buddleia,	I	146	2	193
Buffonia,	I	180	1	220
Bulbocodium,	II	440	1	22
Bunias,	III	887	8	201
Bunium,	I	366	2	454
Buphthalmum,	III	1059	10	588
Buplevrum,	I	358	15	442
Burmannia,	II	429	2	9
Bursera,	II	475	1	72
Butomus,	II	550	1	162
Buttneria,	I	288	2	368
Buxbaumia,	IV	1307	1	351
Buxus,	IV	1148	1	99
Byssus,	IV	1324	14	407

C.

Cacalia,	III	1013	16	481
Cachrys,	I	372	2	461
Cactus,	II	668	25	318
Cæsalpinia,	II	559	4	182
Calamus,	II	470	1	66
Calceolaria,	I	32	2	36
Calea,	III	1021	4	494
Calendula,	III	1073	8	618

	tome.	genre.	esp.	pag.
Calla,	IV	1121	3	51
Callicarpa,	I	141	2	190
Calligonum,	II	735	1	422
Callisia,	I	69	1	85
Callitriche,	I	13	2	11
Calophyllum,	II	716	2	402
Caltha,	II	761	1	466
Calycanthus,	II	695	2	375
Cambogia,	II	706	1	395
Camellia,	III	914	1	254
Cameraria,	I	326	2	402
Campanula,	I	234	44	303
Camphorosma,	I	176	4	217
Canarina,	II	480	1	76
Canarium,	IV	1215	1	201
Canna,	I	1	3	3
Cannabis,	IV	1220	1	205
Capparis,	II	699	13	385
Capraria,	III	827	3	115
Capura,	II	477	1	74
Capsicum,	I	269	4	349
Cardamine,	III	876	15	174
Cardiospermum,	II	540	1	149
Carduus,	III	1004	31	462
Carex,	IV	1137	40	80
Carica,	IV	1232	2	221
Carissa,	I	318	2	395
Carlina,	III	1008	7	472
Carpesium,	III	1028	2	518
Carpinus,	IV	1171	2	131
Carthamus,	III	1010	9	475
Carum,	I	395	1	492
Caryophyllus,	II	727	1	409
Caryocar,	II	739	1	428
Caryota,	IV	1343	1	430
Cassia,	II	557	31	176
Cassine,	I	401	4	502
Cassyta,	II	548	2	160
Catananche,	III	999	3	454
Catesbæa,	I	136	1	187
Caturus,	IV	1206	2	192
Caucalis,	I	362	6	449
Cœanothus,	I	286	3	367
Cœsalpinia,	II	559	4	182

	tome.	genre.	esp.	pag.
Cecropia,	IV	1200	1	182
Cedrela,	I	297	1	376
Celastrus,	I	290	6	370
Celosia,	I	312	9	388
Celsia,	III	815	3	104
Celtis,	IV	1267	3	277
Cenchrus,	IV	1255	9	260
Centaurea,	III	1066	65	599
Centella,	IV	1143	2	94
Centunculus,	I	151	1	200
Cephalanthus,	I	119	1	166
Cerastium,	II	637	16	270
Ceratocarpus,	IV	1125	1	68
Ceratonia,	IV	1282	1	298
Ceratophyllum,	IV	1162	2	218
Cerbera,	I	319	3	396
Cercis,	II	553	2	173
Cerinthe,	I	198	2	259
Ceropegia,	I	328	4	404
Cestrum,	I	272	3	352
Chærophyllum,	I	388	8	483
Chalcas,	II	569	1	190
Chamærops,	IV	1335	1	424
Chara,	IV	1127	4	71
Cheiranthus,	III	879	17	183
Chelidonium,	II	703	4	389
Chelone,	III	806	4	87
Chenopodium,	I	337	18	415
Cherleria,	II	619	1	250
Chiococca,	I	248	2	320
Chionanthus,	I	21	2	21
Chironia,	I	275	8	354
Chlora,	II	519	3	117
Chondrilla,	III	989	3	430
Chrysanthemum,	III	1048	22	564
Chrysitrix,	IV	1281	1	297
Chrysobalanus,	II	677	1	337
Chrysocoma,	III	1019	11	491
Chrysogonum,	III	1071	1	616
Chrysophyllum,	I	282	2	359
Chrysosplenium,	II	607	2	215

	tome.	genre.	esp.	pag.
Cicca,	IV	1146	1	96
Cicer,	III	949	1	328
Cichorium,	III	1000	3	455
Cicuta,	I	384	3	478
Cimifuga,	II	740	1	428
Cinchona,	I	245	2	317
Cineraria,	III	1036	13	545
Cinna,	I	15	12	12
Circæa,	I	23	2	23
Cissampelos,	IV	1243	3	234
Cissus,	I	153	6	201
Cistus,	II	728	43	410
Citharexylum,	III	818	3	109
Citrus,	III	974	4	392
Clathrus,	IV	1329	4	415
Clavaria,	IV	1332	8	418
Claytonia,	I	309	3	386
Clematis,	II	754	12	445
Cleome,	III	890	18	204
Cleonia,	III	794	1	72
Clerodendrum,	III	852	4	136
Clethra,	II	597	1	212
Clibadium,	IV	1156	1	111
Cliffortia,	IV	1239	6	228
Clinopodium,	III	783	3	52
Clitoria,	III	943	5	312
Clusia,	IV	1263	4	272
Clutia,	IV	1247	7	239
Clypeola,	III	870	3	168
Cneorum,	I	52	1	69
Cnicus,	III	1005	9	468
Coccoloba,	II	538	7	146
Cochlearia,	III	867	8	160
Cocos,	IV	1338	2	426
Codon,	II	563	1	185
Coffæa,	I	247	2	319
Coix,	IV	1135	1	79
Colchicum,	II	492	3	89
Coldenia,	I	185	1	224
Collinsonia,	I	43	1	51
Columnea,	III	856	2	140
Colutea,	III	954	3	334
Comarum,	II	694	1	374
Cometes,	I	167	1	212
Combretum,	II	509	2	111
Commelina,	I	68	84	11
Comocladia,	I	53	2	69
Conferva,	IV	1323	21	404
Conium,	I	367	4	454
Connarus,	III	895	1	216
Conocarpus,	I	253	3	325
Convallaria,	II	459	8	53
Convolvulus,	I	231	54	291
Conyza,	III	1030	23	520
Copaifera,	II	601	1	216
Corchorus,	II	730	8	418
Cordia,	I	276	6	355
Coreopsis,	III	1062	11	594
Coriandrum,	I	386	2	480
Coriaria,	IV	1235	2	224
Coris,	I	260	1	330
Corispermum,	I	12	2	11
Cornucopiæ,	I	78	2	101
Cornus,	I	155	7	203
Cornutia,	III	825	1	114
Coronilla,	III	956	11	337
Corrigiola,	I	409	1	509
Cortusa,	I	211	2	273
Corylus,	IV	1172	2	133
Corymbium,	III	1089	2	637
Corypha,	IV	1337	1	425
Costus,	I	3	1	5
Cotula,	III	1050	11	571
Cotyledon,	II	628	4	257
Crambe,	III	889	3	203
Craniolaria,	III	810	2	98
Crassula,	I	423	25	526
Cratægus,	II	678	9	337
Crateva,	II	654	3	287
Crepis,	III	993	16	443
Cressa,	I	341	1	423
Crescentia,	III	820	2	110
Crinum,	II	438	5	19
Crithmum,	I	371	2	460
Crocus,	I	61	1	73
Crotalaria,	III	934	18	291
Croton,	IV	1181	23	146
Cruciancella,	I	133	6	185
Cruzita,	I	179	1	220

	tome.	genre.	esp.	pag.
Cucubalus,	II	615	15	237
Cucumis,	IV	1193	11	163
Cucurbita,	IV	1192	6	160
Cuminum,	I	381	1	475
Cunila,	I	38	3	42
Cunonia,	II	605	1	218
Cupania,	IV	1182	1	150
Cupressus,	IV	1177	4	141
Curatella,	II	733	1	421
Curcuma,	I	6	2	6
Cuscuta,	I	182	2	221
Cyanella,	II	453	1	45
Cycas,	IV	1285	1	309
Cyclamen,	I	214	2	275
Cymbaria,	III	809	1	97
Cynanchum,	I	331	10	407
Cynara,	III	1007	4	471
Cynoglossum,	I	195	8	255
Cynometra,	II	562	2	185
Cynomorium,	IV	1126	1	70
Cynosurus,	I	93	10	125
Cyperus,	I	72	26	89
Cypripedium,	IV	1100	2	23
Cyrilla,	I	294	1	375
Cytinus,	IV	1115	1	43
Cytisus,	III	951	10	330

D.

	tome.	genre.	esp.	pag.
Dactylis,	I	92	4	124
Daïs,	II	588	2	203
Dalechampia,	IV	1179	1	143
Daphne,	II	526	13	132
Datisca,	IV	1237	2	225
Datura,	I	263	6	334
Daucus,	I	364	5	451
Decumaria,	II	652	1	286
Delphinium,	II	736	8	423
Delima,	II	721	1	405
Dentaria,	III	875	3	172
Dialium,	I	23	1	22
Dianthera,	I	29	2	34
Dianthus,	II	614	20	233
Diapensia,	I	207	1	268
Dictamnus,	II	564	1	186
Digitalis,	III	816	8	105
Dillenia,	II	745	1	434
Diodia,	I	129	1	179
Dionæa,	II	584	1	200
Dioscorea,	IV	1227	8	213
Diosma,	I	292	13	372
Diospyros,	IV	1274	2	290
Dipsacus,	I	120	3	166
Dirca,	II	527	1	134
Disandra,	II	497	1	94
Dodartia,	III	843	2	128
Dodecatheon,	I	213	1	275
Dodonæa,	II	520	1	117
Dolichos,	III	941	26	307
Doronicum,	III	1039	3	555
Dorstenia,	I	166	4	211
Draba,	III	864	8	152
Dracæna,	II	458	5	52
Dracocephalum,	III	787	14	61
Dracontium,	IV	1120	5	50
Drosera,	I	421	6	525
Dryas,	II	693	2	374
Drypis,	I	412	1	512
Duranta,	III	849	2	134
Durio,	III	977	1	395

E.

	tome.	genre.	esp.	pag.
Ebenus,	III	938	2	302
Echinophora,	I	359	2	445
Echinops,	III	1084	4	633
Echites,	I	324	11	400
Echium,	I	203	11	264
Eclypta,	III	1056	2	584
Ehretia,	I	278	4	357
Elæagnus,	I	168	4	213

	tome.	genre.	esp.	pag.
Elæocarpus,	II	719	1	404
Elaïs,	IV	1340	1	428
Elate,	IV	1342	1	429
Elaterium,	IV	1128	2	72
Elatine,	II	544	2	152
Elephantopus,	III	1081	2	630
Ellisia,	I	218	1	279
Elymus,	I	102	9	140
Empetrum,	IV	1202	2	189
Ephedra,	IV	1242	2	233
Epidendrum,	IV	1101	30	24
Epigæa,	II	594	1	209
Epilobium,	II	507	7	108
Epimedium,	I	154	1	202
Equisetum,	IV	1284	7	308
Eranthemum,	I	24	3	22
Erica,	II	524	61	122
Erigeron,	III	1031	19	523
Erinus,	III	832	5	119
Eriocaulon,	I	106	5	147
Eriocephalus,	III	1078	2	626
Eriophorum,	I	74	5	98
Erithalis,	I	255	1	326
Ervum,	III	948	6	326
Eryngium,	I	354	9	438
Erysimum,	III	878	6	182
Erythrina,	III	926	5	278
Erythronium,	II	447	1	37
Erythroxylon,	II	625	2	255
Ethulia,	III	1014	5	484
Euclea,	IV	1236	1	224
Eugenia,	II	671	7	323
Evolvulus,	I	416	5	514
Evonymus,	I	291	3	371
Eupatorium,	III	1015	23	485
Euphorbia,	II	665	64	299
Euphrasia,	III	799	7	77
Exacum,	I	147	2	194
Excoecaria,	IV	1205	1	192

F.

Fagara,	I	157	3	205
Fagonia,	II	579	4	197
Fagus,	IV	1170	3	129
Ferraria,	IV	1104	1	29
Ferula,	I	373	9	462
Festuca,	I	94	16	127
Fevillea,	IV	1223	2	208
Ficus,	IV	1283	12	299
Filago,	III	1079	7	627
Flagellaria,	II	486	1	85
Fontinalis,	IV	1306	4	350
Forskoehlea,	II	639	1	274
Fothergilla,	III	734	1	421
Fragaria,	II	689	3	364
Frankenia,	II	481	3	76
Fraxinus,	IV	1273	3	289
Fritillaria,	II	444	6	34
Fuchsia,	II	518	2	116
Fucus,	IV	1321	57	395
Fumaria,	III	920	13	266
Fusanus,	IV	1265	1	274

G.

Galanthus,	II	433	1	12
Galax,	I	296	1	376
Galega,	III	963	10	354
Galenia,	II	534	1	139
Galeopsis,	III	775	3	37
Galium,	I	132	24	181
Garcinia,	II	650	3	285
Gardenia,	I	320	1	396
Garidella,	II	620	1	251
Gaultheria,	II	595	1	210
Gaura,	II	506	1	108
Gaurea,	II	615	1	114
Genipa,	I	271	1	351

	tome.	genre.	esp.	pag.
Genista,	III	930	14	283
Gentiana,	I	352	31	430
Geoffroya,	III	952	1	332
Geranium,	III	897	66	217
Gerardia,	III	805	6	86
Geropogon,	III	983	3	419
Gesneria,	III	807	3	88
Gethyllis,	II	644	1	281
Geum,	II	692	5	372
Ginkgo,	IV	...	1	430
Ginora,	II	661	1	294
Giseckia,	I	422	1	526
Glabraria,	III	975	1	393
Gladiolus,	I	63	12	75
Glaux,	I	314	1	392
Glechoma,	III	773	1	34
Gleditschia,	IV	1272	2	288
Glinus,	II	666	2	311
Globba,	I	45	3	52
Globularia,	I	118	7	164
Gloriosa,	II	446	2	36
Gluta,	IV	1109	1	31
Glycine,	III	942	11	311
Glycyrrhiza,	III	955	3	335
Gmelina,	III	821	1	111
Gnaphalium,	III	1026	47	507
Gnetum,	IV	1188	1	156
Gnidia,	II	528	6	135
Gomphrena,	I	343	7	424
Gordonia,	III	913	1	254
Gorteria,	III	1064	5	597
Gossypium,	III	910	5	247
Gouania,	IV	1268	1	278
Gratiola,	I	30	6	34
Grewia,	IV	1117	4	44
Grias,	II	715	1	401
Grielum,	II	633	1	264
Grislea,	II	510	1	111
Gronovia,	I	302	1	380
Guaiacum,	II	561	3	184
Guettarda,	IV	1161	1	117
Guilandina,	II	560	5	182
Gundelia,	III	1085	1	634
Gunnera,	IV	1102	1	28
Gustavia,	III	917	1	256
Gypsophila,	II	612	10	229

H.

Hæmanthus,	II	432	4	12
Hæmatoxylum,	II	567	1	189
Halesia,	II	651	2	286
Halleria,	III	819	1	110
Hamamelis,	I	181	1	220
Hamellia,	I	249	1	320
Hasselquistia,	I	360	1	446
Hebenstreitia,	III	831	4	119
Hedera,	I	304	2	381
Hedyotis,	I	124	3	175
Hedysarum,	III	961	53	345
Heisteiria,	II	586	1	202
Helenium,	III	1041	1	557
Helianthus,	III	1060	13	590
Heliconia,	I	310	1	386
Helicteres,	IV	1114	6	42
Heliocarpos,	II	662	1	294
Heliophila,	II	880	2	187
Heliotropium,	II	191	9	249
Helleborus,	II	760	5	464
Helonias,	II	493	3	90
Helvella,	IV	1330	2	416
Hemerocallis,	II	467	2	64
Hemionitis,	IV	1293	3	323
Heracleum,	I	375	6	466
Hermannia,	III	893	9	213
Hermas,	IV	1270	1	280
Hernandia,	IV	1141	2	92
Herniaria,	I	336	4	414
Hesperis,	III	881	6	188
Heuchera,	I	349	1	428
Hibiscus,	III	931	26	249
Hieracium,	III	992	30	436
Hillia,	II	479	1	75
Hippia,	III	1077	1	625
Hippocratea,	I	60	1	73
Hippocrepis,	III	958	3	341
Hippomane,	IV	1186	3	154

	tome.	genre.	esp.	pag.
Hippophaë,	IV	1210	2	196
Hippuris,	I	11	1	10
Hiræa,	II	623	1	254
Hirtella,	I	299	1	377
Holcus,	IV	1252	12	257
Holosteum,	I	110	4	149
Hopea,	III	979	1	396
Hordeum,	I	104	8	142
Horminum,	III	788	1	64
Hottonia,	I	216	2	278
Houstonia,	I	131	2	180
Hudsonia,	II	657	1	290
Hugonia,	III	896	1	216
Humulus,	IV	1221	1	206
Hura,	IV	1189	1	156
Hyacinthus,	II	481	15	56
Hydnum,	IV	1327	5	414
Hydrangæa,	II	604	1	218
Hydrastis,	II	762	1	467
Hydrocharis,	IV	1231	1	220
Hydrocotyle,	I	355	5	440
Hydrolea,	I	347	1	427
Hydrophyllum,	I	217	2	278
Hymenæa,	II	555	1	175
Hyobanche,	III	842	1	128
Hyoscyamus,	I	264	8	335
Hyoseris,	III	995	9	448
Hypecoum,	I	183	3	222
Hypericum,	III	981	37	397
Hypnum,	IV	1312	47	361
Hypochœris,	III	997	4	451
Hypoxis,	II	450	4	39
Hyssopus,	III	767	3	21

I.

	tome.	genre.	esp.	pag.
Iberis,	III	868	12	163
Illecebrum,	I	313	17	390
Ilex,	I	184	4	223
Illicium,	II	746	2	434
Impatiens,	III	1093	7	647
Imperatoria,	I	389	1	485
Indigofera,	III	962	17	352
Inula,	III	1037	25	548
Ipomæa,	I	252	21	299
Iresine,	IV	1217	1	202
Iris,	I	65	23	78
Isatis,	III	888	4	202
Ischæmum,	IV	1254	2	260
Isnardia,	I	164	1	210
Isoëtes,	IV	1301	1	344
Isopyrum,	II	759	3	463
Itea,	I	295	1	375
Iva,	IV	1155	2	110
Ixia,	I	62	12	74
Ixora,	I	137	3	188

J.

	tome.	genre.	esp.	pag.
Jacquinia,	I	274	3	353
Jambolifera,	II	513	1	113
Jasione,	III	1090	1	637
Jasminum,	I	17	6	18
Jatropha,	IV	1183	8	150
Juglans,	IV	1169	5	127
Juncus,	II	471	19	66
Jungermannia,	IV	1313	29	368
Juniperus,	IV	1240	10	229
Jussiæa,	II	585	6	201
Justicia,	I	28	22	31

K.

	tome.	genre.	esp.	pag.
Kalmia,	II	590	2	205
Kæmpferia,	I	7	2	7
Kiggelaria,	IV	1233	1	222
Kleinhovia,	IV	1113	1	41
Knautia,	I	122	4	173
Knotia,	I	30	1	179
Koenigia,	I	111	1	150
Krameria,	I	172	1	215
Kuhnia,	I	254	1	326

L.

	tome.	genre.	esp.	pag.
Lachnæa,	II	531	2	138
Lactuca,	III	988	8	428
Laetia,	II	718	2	403
Lagerstroëmia,	II	725	1	407
Lagoëcia,	I	306	1	384
Lagurus,	I	98	2	137
Lamium,	III	774	8	35
Lantana,	III	824	9	112
Lapsana,	III	998	4	452
Laserpitium,	I	374	10	463
Lathræa,	III	801	4	81
Lathyrus,	III	946	21	317
Lavandula,	III	769	4	25
Lavatera,	III	907	9	244
Laugeria,	I	280	1	358
Laurus,	II	545	12	155
Lawsonia,	II	521	2	118
Lechea,	I	116	2	153
Lecythis,	II	720	2	405
Ledum,	II	591	1	206
Leea,	IV	1158	2	115
Lemna,	IV	1130	5	73
Leontice,	II	456	4	48
Leontodon,	III	991	8	433
Leonurus,	III	780	4	47
Lepidium,	III	865	20	154
Lerchea,	III	891	1	212
Leucoium,	II	434	3	13
Leysera,	III	1045	3	562
Lichen,	IV	1319	101	377
Ligusticum,	I	376	7	467
Ligustrum,	I	18	1	19
Lilium,	II	443	9	31
Limeum,	II	499	1	96
Limodorum,	IV	1098	2	21
Limonia,	II	582	3	199
Limosella,	III	837	2	124
Linconia,	I	335	1	413
Lindernia,	III	828	1	116
Linnæa,	III	835	1	122
Linum,	I	419	22	519
Liparia,	III	950	6	329
Lippia,	III	844	3	129
Liquidambar,	IV	1174	2	135
Liriodendrum,	II	747	2	435
Lisianthus,	I	224	2	285
Littospermum,	I	193	7	251
Littorella,	IV	1145	1	96
Lobelia,	III	1091	27	638
Loëflingia,	I	58	1	71
Loësclia,	III	826	1	115
Lolium,	I	101	4	139
Lonchitis,	IV	1294	4	323
Lonicera,	I	250	13	321
Loosa,	II	724	1	407
Loranthus,	II	478	9	74
Lotus,	III	969	18	377
Ludwigia,	I	161	3	207
Lunaria,	III	873	2	171
Lupinus,	III	939	8	302
Lychnis,	II	636	8	268
Lycium,	I	273	4	352
Lycoperdon,	IV	1333	15	419
Lycopodium,	IV	1302	25	345
Lycopsis,	I	202	7	263
Lycopus,	I	36	2	41
Lygæum,	I	76	1	100
Lysimachia,	I	219	9	280
Lythrum,	II	660	10	292

M.

Macronemum,	I	241	1	315
Magnolia,	II	748	4	435
Mahernia,	I	424	2	530
Malachra,	III	903	2	236
Malope,	III	908	1	246
Malpighia,	II	621	9	252
Malva,	III	906	23	239

	tome.	genre.	esp.	pag.
Mammea,	II	713	2	400
Manettia,	I	171	1	214
Mangifera,	I	298	1	377
Manisuris,	IV	1257	1	263
Manuela,	III	830	2	118
Maranta,	I	5	2	6
Marchantia,	IV	1315	7	372
Marcgravia,	II	696	1	384
Marrubium,	III	779	10	44
Marsilea,	IV	1299	3	343
Martynia,	III	811	3	98
Matricaria,	III	1049	6	569
Matthiola,	I	258	1	328
Medeola,	II	490	2	88
Medicago,	III	971	9	383
Melaleuca,	III	978	1	395
Melampodium,	III	1072	2	617
Melampyrum,	III	800	5	79
Melanthium,	II	489	4	87
Melastoma,	II	589	12	203
Melia,	II	576	2	193
Melianthus,	III	859	2	143
Melica,	I	88	6	118
Melicocca,	II	514	1	113
Melissa,	III	786	6	59
Melittis,	III	789	1	65
Melochia,	III	894	6	215
Melothria,	I	55	1	70
Memecylon,	II	522	1	119
Menaïs,	I	256	1	327
Menispermum,	IV	1238	8	226
Mentha,	III	771	17	30
Mentzelia,	II	723	1	406
Menyanthes,	I	215	3	276
Mercurialis,	IV	1230	5	218
Mesembryanthemum,	II	684	45	347
Mespilus,	II	681	7	341
Messerschmidia,	I	204	1	266
Mesua,	III	915	1	255
Michelia,	II	749	2	437
Micropus,	III	1080	2	629
Milium,	I	85	7	112
Milleria,	III	1067	2	612
Mimosa,	IV	1271	46	281
Mimulus,	III	846	2	131
Mimusops,	II	512	2	112
Minuartia,	I	114	3	152
Mirabilis,	I	259	3	328
Mitchella,	I	140	1	190
Mitella,	II	610	2	227
Mnium,	IV	1310	20	353
Moehringia,	II	536	1	140
Mollugo,	I	113	4	151
Molucella,	III	782	3	51
Momordica,	IV	1191	8	158
Monarda,	I	40	5	44
Monnieria,	III	918	1	265
Monotropa,	II	583	2	200
Monsonia,	III	973	1	391
Montia,	I	107	1	148
Moræa,	I	66	3	82
Morina,	I	44	1	51
Morinda,	I	252	3	325
Morisonia,	III	916	1	255
Morus,	IV	1150	7	104
Mucor,	IV	1334	13	421
Muenchausia,	III	976	1	394
Muntingia,	II	707	1	396
Murraya,	II	570	1	190
Musa,	IV	1248	3	250
Mussænda,	I	257	3	327
Myagrum,	III	860	9	148
Myginda,	I	190	1	228
Myosotis,	I	192	5	250
Myosurus,	I	426	1	531
Myrica,	IV	1211	6	197
Myriophyllum,	IV	1163	2	119
Myrsine,	I	289	1	369
Myrtus,	II	672	13	324

N.

	tome.	genre.	esp.	pag.
NÁIAS,	IV	1198	1	180
Nama,	I	346	2	427
Napœa,	IV	1244	2	235
Narcissus,	II	436	14	15
Nardus,	I	75	4	99
Nauclea,	I	239	1	314
Nepenthes,	IV	1107	1	30
Nepeta,	III	768	15	22
Nephelium,	IV	1151	1	106
Nerium,	I	323	4	399
Neurada,	II	640	1	275
Nicotiana,	I	265	7	337
Nigella,	II	742	5	431
Nigrina,	I	228	1	288
Nissolia,	III	923	2	275
Nitraria,	II	658	1	290
Nolana,	I	206	1	267
Nyctanthes,	I	16	5	17
Nymphœa,	II	709	4	397
Nyssa,	IV	1275	1	292

O.

OCOLARIA,	III	840	1	125
Ochna,	II	714	2	401
Ocymum,	III	790	13	65
Œdera,	III	1082	1	631
Œnanthe,	I	382	5	475
Œnothera,	II	505	10	106
Olax,	I	49	1	67
Oldenlandia,	I	162	8	208
Olea,	I	20	3	20
Olyra,	IV	1136	1	80
Omphalea,	IV	1139	2	90
Onoclea,	IV	1287	2	311
Ononis,	III	935	25	294
Onopordum,	III	1006	4	470
Onosma,	I	199	3	260
Ophiorrhiza,	I	223	2	284
Ophioglossum,	IV	1288	7	311
Ophioxylon,	IV	1264	1	273
Ophira,	II	525	1	131
Ophrys,	IV	1096	19	14
Orchis,	IV	1094	34	5
Origanum,	III	784	11	53
Ornithogalum,	II	451	12	40
Ornithopus,	III	957	4	339
Orobanche,	III	841	8	126
Orobus,	III	945	9	315
Orontium,	II	469	1	65
Ortegia,	I	57	2	71
Oryza,	II	483	1	78
Osbeckia,	II	503	1	105
Osmites,	III	1063	3	596
Osmunda,	IV	1289	18	313
Osteospermum,	III	1075	9	624
Osyris,	IV	1203	1	190
Othonna,	III	1076	19	624
Ovieda,	III	850	2	135
Oxalis,	II	634	16	264

P.

PÆDERIA,	I	317	1	395
Pœderota,	I	27	1	30
Panax,	IV	1280	3	296
Pancratium,	II	437	7	18
Panicum,	I	82	33	105
Papaver,	II	704	9	391
Parietaria,	IV	1259	6	266
Paris,	II	542	1	151
Parkinsonia,	II	556	1	176
Parnassia,	I	415	1	513
Parthenium,	IV	1154	2	109
Paspalum,	I	81	5	104

	tome.	genre.	esp.	pag.
Passerina,	II	530	6	136
Passiflora,	IV	1110	26	32
Pastinaca,	I	392	3	489
Patagonula,	I	277	1	356
Pavetta,	I	138	1	188
Paullinia,	II	539	14	147
Pectis,	III	1047	3	563
Pedalium,	III	858	1	142
Pedicularis,	III	804	16	83
Peganum,	II	656	2	289
Peltaria,	III	871	1	169
Penæa,	I	144	5	192
Pentapetes,	III	899	3	230
Penthorum,	II	630	1	262
Peplis,	II	482	2	77
Perdicium,	III	1040	3	556
Pergularia,	I	329	2	405
Perilla,	III	772	1	34
Periploca,	I	330	4	405
Petesia,	I	139	3	189
Petiveria,	II	494	2	90
Petrea,	III	822	1	111
Peucedanum,	I	370	6	459
Peziza,	IV	1331	9	416
Phaca,	III	964	6	356
Phalaris,	I	80	11	103
Phallus,	IV	1328	2	415
Pharnaceum,	I	410	6	510
Pharus,	IV	1160	1	117
Phascum,	IV	1305	5	350
Phaseolus,	III	940	15	304
Phellandrium,	I	383	2	477
Philadelphus,	II	669	2	322
Phillyrea,	I	19	3	19
Phleum,	I	83	5	109
Phlomis,	III	781	13	48
Phlox,	I	229	10	289
Phœnix,	IV	1339	1	427
Phryma,	III	796	1	74
Phylica,	I	285	10	366
Phylanthus,	IV	1142	6	93
Phyllis,	I	353	1	437
Physalis,	I	267	12	341
Phyteuma,	I	236	6	312
Phytolacca,	II	641	4	275

	tome.	genre.	esp.	pag.
Picris,	III	986	3	424
Pilularia,	IV	1300	1	344
Pimpinella,	I	396	7	493
Pinguicula,	I	33	4	55
Pinus,	IV	1175	12	136
Piper,	I	47	20	53
Piscidia,	III	927	2	279
Pisonia,	IV	1279	2	295
Pistacia,	IV	1212	5	198
Pistia,	IV	1112	1	40
Pisum,	III	944	4	313
Plantago,	I	148	21	194
Platanus,	IV	1173	2	134
Plectronia,	I	300	1	378
Plinia,	II	676	2	326
Plukenetia,	IV	1178	1	143
Plumbago,	I	227	4	287
Plumeria,	I	325	4	402
Poa,	I	89	24	119
Pœonia,	II	732	3	420
Podophyllum,	II	702	2	389
Poinciana,	II	558	3	181
Polemonium,	I	233	3	302
Polyanthes,	II	460	1	55
Polycarpon,	I	112	1	150
Polycnemum,	I	59	1	72
Polygala,	III	921	32	269
Polygonum,	II	537	27	140
Polymnia,	III	1070	4	615
Polypodium,	IV	1296	68	328
Polypremum,	I	143	1	191
Polytrichum,	IV	1309	3	362
Pontederia,	II	431	4	11
Populus,	IV	1228	5	215
Porana,	I	230	1	290
Porella,	IV	1303	1	349
Portlandia,	I	243	2	316
Portulaca,	II	659	7	292
Potamogeton,	I	186	12	224
Potentilla,	II	690	29	365
Poterium,	IV	1167	3	122
Pothos,	IV	1122	7	52
Prasium,	III	795	2	73
Premna,	III	823	2	112
Prenanthes,	III	990	9	431

	tom.	genre.	esp.	pag.
Primula,	I	210	6	271
Prinos,	II	474	2	372
Prockia,	II	729	1	417
Protea,	I	117	29	161
Proserpinaca,	I	108	1	149
Prosopis,	II	568	1	189
Prunella,	III	793	3	71
Prunus,	II	675	14	330
Psidium,	II	670	2	322
Psoralea,	III	967	18	365
Psychotria,	I	246	3	318
Ptelea,	I	159	1	206
Pteris,	IV	1291	20	320
Pterocarpus,	III	925	3	277
Pteronia,	III	1017	2	489
Pulmonaria,	I	196	6	256
Punica,	II	673	2	327
Pyrola,	II	598	6	213
Pyrus,	II	682	6	343

Q.

Quassia,	II	578	2	196
Quercus,	IV	1168	13	124
Queria,	I	115	2	152
Quisqualis,	II	587	1	202

R.

Rajania,	IV	1226	3	212
Randia,	I	225	2	286
Ranunculus,	II	757	41	451
Raphanus,	III	886	4	199
Rauwolfia,	I	316	3	394
Reaumuria,	II	743	1	432
Reseda,	II	664	12	296
Restio,	IV	1204	6	191
Rhacoma,	I	150	1	200
Rhamnus,	I	284	24	361
Rheedia,	II	698	1	385
Rheum,	II	549	5	160
Rhexia,	II	504	3	106
Rhinanthus,	III	798	7	75
Rhizophora,	II	646	7	282
Rhodiola,	IV	1229	1	217
Rhododendrum,	II	592	6	206
Rhus,	I	399	17	498
Ribes,	I	301	8	378
Riccia,	IV	1317	5	375
Richardia,	II	472	1	70
Ricinus,	IV	1184	3	152
Ricotia,	III	874	1	172
Rivina,	I	174	3	216
Robinia,	III	953	8	333
Roëlla,	I	235	2	311
Rondeletia,	I	240	4	315
Roridula,	I	307	1	385
Rosa,	II	687	17	357
Rosmarinus,	I	41	1	45
Rotala,	I	56	1	71
Royena,	II	603	4	217
Rubia,	I	134	5	186
Rubus,	II	688	15	361
Rudbeckia,	III	1061	6	593
Ruellia,	III	847	13	131
Rumex,	II	485	29	79
Rumphia,	I	51	1	68
Ruppia,	I	187	1	226
Ruscus,	IV	1246	5	237
Ruta,	II	565	4	186

S.

Saccharum,	I	79	4	101
Sagina,	I	188	4	227
Sagittaria,	IV	1164	4	119
Salacia,	IV	1105	1	29

	tome.	genre.	esp.	pag.
Salicornia,	I	10	5	9
Salix,	IV	1201	31	182
Salsola,	I	339	13	420
Salvadora,	I	175	1	217
Salvia,	I	42	39	45
Samara,	I	156	1	205
Sambucus,	I	402	4	503
Samolus,	I	238	1	313
Samyda,	II	600	5	215
Sanguinaria,	II	701	1	388
Sanguisorba,	I	152	3	201
Sanicula,	I	356	3	441
Santalum,	I	169	1	213
Santolina,	III	1022	4	495
Sapindus,	II	541	4	150
Saponaria,	II	613	8	231
Saraca,	III	919	1	265
Sarothra,	I	414	1	513
Sarracenia,	II	708	2	396
Satureia,	III	765	8	19
Satyrium,	IV	1095	8	12
Saururus,	II	500	2	97
Sauvagesia,	I	308	1	385
Saxifraga,	II	608	38	220
Scabiosa,	I	121	30	167
Scabrita,	I	125	1	175
Scævola,	I	244	1	317
Scandix,	I	387	10	481
Scheuchzeria,	II	487	1	86
Schinus,	IV	1234	2	223
Schmidelia,	II	533	1	139
Schœnus,	I	71	15	86
Schrebera,	I	348	1	428
Schwalbea,	III	802	1	82
Schwenkia,	I	31	1	35
Scilla,	II	452	10	42
Scirpus,	I	73	37	93
Scleranthus,	II	611	3	228
Scolymus,	III	1001	2	457
Scoparia,	I	149	2	199
Scorpiurus,	III	959	4	342
Scorzonera,	III	985	12	422
Scrophularia,	III	814	16	101
Scutellaria,	III	792	15	69
Secale,	I	103	4	142
Securidaca,	III	922	2	275
Sedum,	II	629	19	258
Seguieria,	II	731	1	419
Selago,	III	829	9	117
Selinum,	I	368	5	456
Sempervivum,	II	667	8	312
Senecio,	III	1033	40	530
Septas,	II	501	1	97
Serapias,	IV	1097	7	19
Seriola,	III	996	4	456
Seriphium,	III	1087	5	635
Serpicula,	IV	1144	1	95
Serratula,	III	1003	14	459
Sesamum,	III	845	2	129
Seseli,	I	390	11	485
Sesuvium,	II	680	1	341
Sherardia,	I	127	3	177
Sibbaldia,	I	425	2	530
Sibthorpia,	III	836	1	123
Sicyos,	IV	1195	3	167
Sida,	III	902	21	233
Sideritis,	III	770	11	27
Sideroxylon,	I	283	8	360
Sigesbeckia,	III	1057	2	585
Silene,	II	616	34	240
Silphium,	III	1069	7	614
Sinapis,	III	885	13	197
Siphonanthus,	I	135	1	187
Sirium,	I	160	1	207
Sison,	I	379	6	472
Sisymbrium,	III	877	27	177
Sisyrinchium,	IV	1103	2	28
Sium,	I	378	9	471
Sloanea,	II	711	2	399
Smilax,	IV	1225	13	210
Smyrnium,	I	393	5	490
Solandra,	IV	1269	1	279
Solanum,	I	268	34	343
Soldanella,	I	212	1	274
Solidago,	III	1035	14	542
Sonchus,	III	987	12	423
Sophora,	II	551	12	171
Sorbus,	II	679	3	339
Sparganium,	IV	1132	2	78
Spartium,	III	929	13	280

	tome.	genre,	esp.	pag.
Spathelia,	I	403	1	505
Spergula,	II	638	5	273
Spermacoce,	I	126	6	176
Sphæranthus,	III	1083	3	632
Sphagnum,	IV	1304	3	349
Spigelia,	I	222	2	284
Spilanthus,	III	1011	6	477
Spinacia,	IV	1218	2	203
Spinifex,	IV	1250	1	253
Spiræa,	II	686	14	354
Splachnum,	IV	1308	4	352
Spondias,	II	627	2	256
Stachys,	III	777	15	40
Stæhelina,	III	1018	6	490
Stapelia,	I	334	3	413
Staphylæa,	I	404	2	505
Statice,	I	418	18	516
Stellaria,	II	617	8	245
Stellera,	II	529	2	136
Stemodia,	III	839	1	125
Sterculia,	IV	1185	2	153
Steris,	I	342	1	424
Stewartia,	III	912	1	253
Stilago,	IV	1106	1	30
Stilbe,	IV	1277	2	293
Stillingia,	IV	1187	1	155
Stipa,	I	96	9	132
Stœbe,	III	1086	4	634
Stratiotes,	II	744	2	433
Strumfia,	III	1088	1	636
Struthiola,	I	170	2	214
Strychnos,	I	270	2	350
Styrax,	II	599	1	214
Subularia,	III	863	1	151
Suriana,	II	632	1	263
Symphytum,	I	197	3	258
Symplocos,	III	980	1	396
Syringa,	I	22	2	21
Swertia,	I	351	5	429
Swietenia,	II	575	1	193

T.

Tabernæmontana,	I	327	6	403
Tagetes,	III	1044	3	560
Tamarindus,	I	50	1	67
Tamarix,	I	405	2	506
Tamus,	IV	1224	2	209
Tanacetum,	III	1024	8	498
Tarchonanthus,	III	1020	1	493
Targionia,	IV	1314	1	372
Taxus,	IV	1241	2	232
Telephium,	I	408	2	509
Terminalia,	IV	1261	1	270
Tetracera,	II	738	1	428
Tetragonia,	II	683	2	346
Teucrium,	III	764	35	11
Thalia,	I	8	1	8
Thalictrum,	II	755	15	448
Thapsia,	I	391	5	488
Thea,	II	726	2	408
Theligonum,	IV	1166	1	122
Theobroma,	III	972	3	390
Theophrasta,	I	221	1	283
Thesium,	I	315	12	393
Thlaspi,	III	866	10	157
Thryallis,	II	581	1	198
Thuya,	IV	1176	3	140
Thymbra,	III	766	2	20
Thymus,	III	785	11	56
Tiarella,	II	609	2	227
Tilia,	II	717	2	402
Tillæa,	I	189	2	228
Tillandsia,	II	428	9	8
Tinus,	II	547	1	159
Toluifera,	II	566	1	188
Tordylium,	I	361	7	447
Torenia,	III	812	1	99
Tormentilla,	II	691	2	371
Tournefortia,	I	203	7	266
Tozzia,	III	803	1	82
Trachelium,	I	237	1	313
Tradescantia,	II	430	7	10
Tragia,	IV	1140	5	91
Tragopogon,	III	984	11	419

	tome.	genre.	esp.	pag.
Trapa,	I	165	1	210
Tremella,	IV	1320	8	394
Trewia,	II	712	1	399
Trianthema,	II	606	3	219
Tribulus,	II	580	4	198
Trichilia,	II	573	3	192
Trichomanes,	IV	1298	11	341
Trichosanthes,	IV	1190	4	157
Trichostema,	III	791	2	68
Tridax,	III	1054	1	583
Trientalis,	II	496	1	94
Trifolium,	III	968	46	368
Triglochin,	II	488	3	86
Trigonella,	III	970	10	380
Trilix,	II	697	1	384
Trillium,	II	491	3	88
Triopteris,	II	624	1	254
Triosteum,	I	251	2	324
Triplaris,	I	109	1	149
Tripsacum,	IV	1134	2	78
Triticum,	I	105	13	144
Triumfetta,	II	655	4	288
Trollius,	II	758	2	462
Tropæolum,	II	502	4	104
Trophis,	IV	1207	1	193
Tubalgia,	II	435	1	14
Tulipa,	II	448	3	38
Turnera,	I	407	4	508
Turræa,	II	574	1	192
Turritis,	III	883	3	191
Tussilago,	III	1032	10	527
Typha,	IV	1131	2	74

U.

Ulex,	III	932	2	290
Ulmus,	I	345	3	426
Ulva,	IV	1322	16	402
Uniola,	I	91	4	124
Urena,	III	909	4	247
Urtica,	IV	1149	19	100
Utricularia,	I	34	8	37
Uvaria,	II	750	2	437
Uvularia,	II	445	2	36

V.

Vaccinium,	II	523	12	119
Valantia,	IV	1258	8	264
Valeriana,	I	48	20	63
Vallisneria,	IV	1199	1	180
Vandelia,	III	838	1	124
Varronia,	I	279	6	357
Vateria,	II	722	1	406
Vatica,	II	649	1	284
Velezia,	I	350	1	428
Vella,	III	861	2	150
Veratrum,	IV	1249	3	251
Verbascum,	I	262	12	331
Verbena,	I	35	16	39
Verbesina,	III	1058	9	586
Veronica,	I	26	38	24
Viburnum,	I	400	9	500
Vicia,	III	947	13	322
Vinca,	I	322	4	398
Viola,	III	1092	27	642
Viscum,	IV	1209	6	194
Vitex,	III	853	4	137
Vitis,	I	305	8	382
Volkameria,	III	851	3	136
Wachendorfia,	I	67	3	83
Waltheria,	III	892	3	213
Weinmannia,	II	535	1	139
Willichia,	I	54	1	70
Winterana,	II	653	1	287

X.

	tome.	genre.	esp.	pag.
XANTHIUM,	IV	1152	3	106
Xanthoxylum,	IV	1213	2	200
Xeranthemum,	III	1027	13	515
Ximenia,	II	517	2	115
Xylophylla,	I	406	2	507
Xylopia,	IV	1116	2	44
Xyris,	I	70	1	86

Y.

YUCCA,	II	463	4	60

Z.

ZAMIA,	IV	1286	1	310
Zannichellia,	IV	1124	1	68
Zanonia,	IV	1222	1	207
Zanthoxylum,	IV	1213	2	200
Zea,	IV	1133	1	77
Zinnia,	III	1046	2	562
Zizania,	IV	1159	3	116
Ziziphora,	I	39	4	43
Zoëgea,	III	1065	1	598
Zostera,	IV	1123	2	53
Zygophyllum,	II	577	9	194

Fin de la seconde Table.

TABLE TROISIÈME.

TABLE FRANÇOISE NUMÉRIQUE DES GENRES.

Le premier chiffre indique le *Tome*, le second la *page du Tome*.

1	Balisier,	I 3	37	Améthyste,	I 42
2	Amome,	4	38	Cunile,	*ibid.*
3	Coste,	5	39	Ziziphore,	43
4	Alpinie,	*ibid.*	40	Monarde,	44
5	Galanga,	6	41	Romarin,	45
6	Curcume,	*ibid.*	42	Sauge,	*ibid.*
7	Zédoaire,	7	43	Collinsone,	51
8	Thalie,	8	44	Morine,	*ibid.*
9	Boerrhaave,	*ibid.*	45	Globbe,	52
10	Salicorne,	9	46	Flouve,	*ibid.*
11	Pesse,	10	47	Poivrier,	53
12	Corisperme,	11	48	Valériane,	63
13	Callitriche,	*ibid.*	49	Olax,	67
14	Blite,	12	50	Tamarin,	*ibid.*
15	Cinne,	*ibid.*	51	Rumphe,	68
16	Nyctante,	17	52	Camelée,	69
17	Jasmin,	18	53	Comoclade,	*ibid.*
18	Troëne,	19	54	Williche,	70
19	Filaria,	*ibid.*	55	Mélothrie,	*ibid.*
20	Olivier,	20	56	Rotale,	71
21	Chionante,	21	57	Ortége,	*ibid.*
22	Lilac,	*ibid.*	58	Loëflinge,	*ibid.*
23	Diali,	22	59	Polycnème,	72
24	Éranthême,	*ibid.*	60	Béjugo,	73
25	Circée,	23	61	Safran,	*ibid.*
26	Véronique,	24	62	Ixie,	74
27	Pédérote,	30	63	Glayeul,	75
28	Carmantine,	31	64	Antholyze,	77
29	Dianthère,	34	65	Iris,	78
30	Gratiole,	*ibid.*	66	Morée,	82
31	Schewenke,	35	67	Wachendorfe,	83
32	Calcéolaire,	36	68	Commeline,	84
33	Grassette,	*ibid.*	69	Callisie,	85
34	Utriculaire,	37	70	Xyris,	86
35	Verveine,	39	71	Choin,	*ibid.*
36	Lycope,	41	72	Souchet,	89

		tome.	pag.
73	Scirpe,	I	93
74	Linaigrette,		98
75	Nard,		99
76	Alvarde,		100
77	Bobartie,		*ibid.*
78	Coqueluchiole,		101
79	Sucre,		*ibid.*
80	Phalaris,		103
81	Paspale,		104
82	Panic,		105
83	Fléau,		109
84	Vulpin,		110
85	Millet,		112
86	Agrostis,		113
87	Foin,		116
88	Mélique,		118
89	Paturin,		119
90	Brize,		122
91	Uniole,		124
92	Dactyle,		*ibid.*
93	Cynosure,		125
94	Festuque,		127
95	Brome,		129
96	Stipe,		132
97	Avoine,		134
98	Lagurier,		137
99	Roseau,		*ibid.*
100	Aristide,		139
101	Ivraie,		*ibid.*
102	Élyme,		140
103	Seigle,		142
104	Orge,		*ibid.*
105	Froment,		144
106	Joncinelle,		147
107	Montie,		148
108	Trixide,		149
109	Triplare,		*ibid.*
110	Holoste,		*ibid.*
111	Koénige,		150
112	Polycarpe,		*ibid.*
113	Mollugine,		151
114	Minuarte,		152
115	Quérie,		*ibid.*
116	Léchée,		153
117	Protée,		161
118	Globulaire,	I	164
119	Céphalante,		166
120	Cardère,		*ibid.*
121	Scabieuse,		167
122	Knautie,		173
123	Allione,		174
124	Hédyote,		175
125	Scabrite,		*ibid.*
126	Spermacoce,		176
127	Shérarde,		177
128	Aspérule,		*ibid.*
129	Diode,		179
130	Knotie,		*ibid.*
131	Houstone,		180
132	Caille-lait,		181
133	Crucianelle,		185
134	Garance,		186
135	Siphonanthe,		187
136	Catesbée,		*ibid.*
137	Ixore,		188
138	Pavette,		*ibid.*
139	Pétésie,		189
140	Mitchelle,		190
141	Callicarpe,		*ibid.*
142	Aquartie,		191
143	Polyprême,		*ibid.*
144	Sarcocollier,		192
145	Blérie,		*ibid.*
146	Buddlége,		193
147	Gentianelle,		194
148	Plantain,		*ibid.*
149	Scopare,		199
150	Rhacome,		200
151	Centenille,		*ibid.*
152	Pimprenelle,		201
153	Achit,		*ibid.*
154	Épimède,		202
155	Cornouiller,		203
156	Samare,		205
157	Fagarier,		*ibid.*
158	Egiphile,		206
159	Ptélée,		*ibid.*
160	Santalin,		207
161	Ludwige,		*ibid.*
162	Oldenlande,		208

		tome.	pag.
163	Ammanne,	I	209
164	Isnarde,		210
165	Macre,		*ibid.*
166	Dorstène,		211
167	Comète,		212
168	Éléagne,		213
169	Santal,		*ibid.*
170	Struthiole,		214
171	Manette,		*ibid.*
172	Kramère,		215
173	Acène,		216
174	Rivine,		*ibid.*
175	Salvadore,		217
176	Camphrée,		*ibid.*
177	Alchemille,		218
178	Percepier,		219
179	Cruzite,		220
180	Buffone,		*ibid.*
181	Hamamelis,		*ibid.*
182	Cuscute,		221
183	Siliquier,		222
184	Houx,		223
185	Coldène,		224
186	Potamogeton,		*ibid.*
187	Ruppie,		226
188	Sagine,		227
189	Tillée,		228
190	Myginde,		*ibid.*
191	Héliotrope,		249
192	Scorpione,		250
193	Grémil,		251
194	Buglosse,		253
195	Cynoglosse,		255
196	Pulmonaire,		256
197	Consoude,		258
198	Mélinet,		259
199	Onosme,		260
200	Bourrache,		261
201	Rapette,		262
202	Lycopside,		263
203	Vipérine,		264
204	Arguse,		266
205	Tourneforte,		*ibid.*
206	Nolane,		267
207	Diapense,		268
208	Arétie,	I	*ibid.*
209	Androsace,		269
210	Primevère,		271
211	Cortuse,		273
212	Soldanelle,		274
213	Giroselle,		275
214	Cyclame,		*ibid.*
215	Ményanthe,		277
216	Hottone,		278
217	Hydrophylle,		*ibid.*
218	Ellise,		279
219	Lysimachie,		280
220	Mouron,		282
221	Théophraste,		283
222	Spigélie,		284
223	Ophiorhize,		*ibid.*
224	Lisianthe,		285
225	Randie,		286
226	Azalée,		*ibid.*
227	Dentelaire,		287
228	Nigrine,		288
229	Phloxe,		289
230	Porane,		290
231	Liseron,		291
232	Ipomée,		299
233	Polémoine,		302
234	Campanule,		303
235	Roelle,		311
236	Raiponce,		312
237	Gantelée,		313
238	Samole,		*ibid.*
239	Nauclée,		314
240	Rondelète,		316
241	Macrocnème,		*ibid.*
242	Bellone,		316
243	Portlande,		*ibid.*
244	Scévole,		317
245	Quinquina,		*ibid.*
246	Psychotre,		318
247	Cafféyer,		319
248	Chiocoque,		320
249	Duhamèle,		*ibid.*
250	Chèvre-feuille,		321
251	Trioste,		324
252	Morinde,		325

		tome.	pag.
253	Manglier,	I	325
254	Kuhnie,		326
255	Érithale,		*ibid.*
256	Ménaïs,		327
257	Mussende,		*ibid.*
258	Matthiole,		328
259	Belle-de-nuit,		*ibid.*
260	Coris,		330
261	Brossée,		*ibid.*
262	Molène,		331
263	Endormie,		334
264	Jusquiame,		335
265	Nicotiane,		337
266	Atrope,		339
267	Coqueret,		341
268	Morelle,		343
269	Capsique,		349
270	Vomique,		350
271	Génipayer,		351
272	Cestre,		352
273	Lyciet,		*ibid.*
274	Jacquine,		353
275	Chirone,		354
276	Sebestier,		355
277	Patagonule,		356
278	Ehréthie,		357
279	Varrone,		*ibid.*
280	Laugère,		358
281	Brunsfelse,		359
282	Caïmitier,		*ibid.*
283	Argant,		360
284	Nerprun,		361
285	Phylique,		366
286	Céanothe,		367
287	Arduine,		368
288	Buttnère,		*ibid.*
289	Myrsine,		369
290	Célastre,		370
291	Fusain,		371
292	Diosme,		372
293	Brunie,		374
294	Cyrille,		375
295	Itée,		*ibid.*
296	Galax,		376
297	Cédrèle,		377
298	Manguier,	I	377
299	Hirtelle,		*ibid.*
300	Plectronie,		378
301	Groseillier,		*ibid.*
302	Gronove,		380
303	Aquilice,		381
304	Lierre,		*ibid.*
305	Vigne,		382
306	Lagoëcie,		384
307	Roridule,		385
308	Sauvage,		385
309	Claytone,		386
310	Hélicone,		*ibid.*
311	Achyranthe,		387
312	Célosie,		388
313	Paronique,		390
314	Glauce,		392
315	Thésie,		393
316	Rauwolfe,		394
317	Pédère,		395
318	Carisse,		*ibid.*
319	Cerbère,		396
320	Gardène,		*ibid.*
321	Allamande,		397
322	Pervenche,		398
323	Laurier-rose,		399
324	Échite,		400
325	Plumière,		402
326	Camérier,		*ibid.*
327	Tabernémontane,		403
328	Céropége,		404
329	Pergulaire,		405
330	Périploque,		*ibid.*
331	Cynanche,		406
332	Apocin,		408
333	Asclépiade,		409
334	Stapélie,		413
335	Lincone,		*ibid.*
336	Herniaire,		414
337	Chénopode,		415
338	Bette,		419
339	Soude,		420
340	Anabase,		422
341	Cresse,		423
342	Stéris,		424

		tome.	pag.
343	Amaranthine,	I	424
344	Bosée,		425
345	Orme,		426
346	Name,		427
347	Hydrole,		*ibid.*
348	Schrebère,		428
349	Heuchère,		*ibid.*
350	Velèze,		*ibid.*
351	Swerse,		429
352	Gentiane,		430
353	Phyllis,		437
354	Panicaud,		438
355	Hydrocotyle,		440
356	Sanicle,		441
357	Radiaire,		442
358	Buplèvre,		*ibid.*
359	Échinophore,		445
360	Hasselquiste,		446
361	Tordylier,		447
362	Caucalier,		449
363	Artédie,		450
364	Carotte,		451
365	Ammi,		453
366	Terre-noix,		454
367	Conie,		*ibid.*
368	Selin,		456
369	Athamanthe,		457
370	Peucédan,		459
371	Crithme,		460
372	Armarinthe,		461
373	Férule,		462
374	Laser,		463
375	Berce,		466
376	Livêche,		467
377	Angélique,		469
378	Berle,		471
379	Sison,		472
380	Bubon,		474
381	Cumin,		475
382	Œnanthe,		*ibid.*
383	Phellandre,		477
384	Ciguë,		478
385	Éthuse,		479
386	Coriandre,		480
387	Scandix,		481
388	Cerfeuil,	I	483
389	Impératoire,		485
390	Seseli,		486
391	Thapsie,		488
392	Panais,		489
393	Maceron,		490
394	Aneth,		491
395	Carvi,		492
396	Boucage,		493
397	Ache,		495
398	Podagraire,		497
399	Sumac,		498
400	Viorne,		500
401	Cassine,		502
402	Sureau,		503
403	Spathélie,		505
404	Staphylier,		*ibid.*
405	Tamarisque,		506
406	Xylophylle,		507
407	Turnère,		508
408	Télèphe,		509
409	Corrigiole,		*ibid.*
410	Pharnace,		510
411	Morgeline,		511
412	Drypis,		512
413	Baselle,		*ibid.*
414	Sarothre,		513
415	Parnassie,		*ibid.*
416	Liseret,		514
417	Aralie,		515
418	Statice,		516
419	Lin,		519
420	Aldrovande,		524
421	Drosère,		525
422	Gisecke,		526
423	Crassule,		*ibid.*
424	Maherne,		530
425	Sibbaldie,		*ibid.*
426	Myosure,		531
427	Ananas,	*Tome* II	7
428	Tillandse,		8
429	Burmanne,		9
430	Tradescante,		10
431	Pontédère,		11
432	Hémanthe,		12

		tome.	pag.
433	Galanthe,	II	12
434	Leucoie,		13
435	Tubaïge,		14
436	Narcisse,		15
437	Pancrace,		18
438	Crinum,		19
439	Amaryllis,		20
440	Bulbocode,		22
441	Aphyllanthe,		23
442	Ail,		*ibid.*
443	Lis,		31
444	Fritillaire,		34
445	Uvulaire,		36
446	Glorieuse,		*ibid.*
447	Érythrone,		37
448	Tulipe,		38
449	Albuce,		*ibid.*
450	Hypoxe,		39
451	Ornithogale,		40
452	Scille,		42
453	Cyanelle,		45
454	Asphodèle,		*ibid.*
455	Anthéric,		46
456	Léontice,		48
457	Asperge,		49
458	Sang-dragon,		52
459	Muguet,		53
460	Tubéreuse,		55
461	Hyacinthe,		56
462	Alétris,		59
463	Yuque,		60
464	Aloës,		*ibid.*
465	Agave,		62
466	Alstroémère,		63
467	Hémérocalle,		64
468	Acore,		*ibid.*
469	Oronce,		65
470	Rotang,		66
471	Jonc,		*ibid.*
472	Richarde,		70
473	Sapotillier,		71
474	Prinos,		72
475	Bursère,		*ibid.*
476	Épine-vinette,		73
477	Capure,		74
478	Loranthe,	II	74
479	Hille,		75
480	Canarine,		76
481	Frankène,		*ibid.*
482	Péplide,		77
483	Riz,		78
484	Atraphaxe,		79
485	Patience,		*ibid.*
486	Flagellaire,		85
487	Scheuchzère,		86
488	Troscart,		*ibid.*
489	Mélanthe,		87
490	Médéole,		88
491	Trillie,		*ibid.*
492	Colchique,		89
493	Hélonias,		90
494	Pétivère,		*ibid.*
495	Fluteau,		91
496	Trientale,		94
497	Disandre,		*ibid.*
498	Marronier,		95
499	Liméole,		96
500	Saurure,		97
501	Septas,		*ibid.*
502	Capucine,		104
503	Osbèckе,		105
504	Rhexie,		106
505	Onagre,		*ibid.*
506	Gaure,		108
507	Épilobe,		*ibid.*
508	Antichore,		110
509	Combret,		111
510	Grislée,		*ibid.*
511	Allophyle,		112
512	Mimusope,		*ibid.*
513	Jambolier,		113
514	Mélicoque,		*ibid.*
515	Gaurée,		114
516	Balsamier,		*ibid.*
517	Ximénie,		115
518	Fuchsie,		116
519	Chlore,		117
520	Dodonée,		*ibid.*
521	Lawsone,		118
522	Mémécylon,		119

		tome.	pag.
523	Airelle,	II	119
524	Bruyère,		122
525	Ophire,		131
526	Garou,		132
527	Dirca,		134
528	Gnide,		135
529	Stellère,		136
530	Passerine,		*ibid.*
531	Lachnée,		138
532	Bœckée,		*ibid.*
533	Schmidèle,		139
554	Galiène,		*ibid.*
135	Weinmanne,		*ibid.*
536	Moërhinge,		140
537	Renouée,		*ibid.*
538	Raisinier,		146
539	Paullinie,		147
540	Cardiosperme,		149
541	Savonnier,		150
542	Paris,		151
543	Moschatelline,		152
544	Élatine,		*ibid.*
545	Laurier,		155
546	Acajou,		158
547	Tinus,		159
548	Cassyte,		160
549	Rhubarbe,		*ibid.*
550	Butome,		162
551	Sophore,		171
552	Anagyre,		172
553	Gainier,		173
554	Bauhine,		174
555	Courbaril,		175
556	Parkinsonne,		176
557	Casse,		*ibid.*
558	Poincillade,		181
559	Bresillet,		182
560	Bonduc,		*ibid.*
561	Gaïac,		184
562	Cynomètre,		185
563	Codon,		*ibid.*
564	Dictamne,		186
565	Rue,		*ibid.*
566	Tolu,		188
567	Campêche,		189
568	Prosope,	II	189
569	Chalcas,		190
570	Murraie,		*ibid.*
571	Bergère,		191
572	Condori,		*ibid.*
573	Trichilie,		192
574	Turrée,		*ibid.*
575	Mahogon,		193
576	Mélie,		*ibid.*
577	Févier,		194
578	Cassie,		196
579	Fagone,		197
580	Tribule,		198
581	Thryallis,		*ibid.*
582	Limonellier,		199
583	Monotrope,		200
584	Dionée,		*ibid.*
585	Jussieue,		201
586	Heistère,		202
587	Quisqualis,		*ibid.*
588	Daïs,		203
589	Mélastome,		*ibid.*
590	Kalmie,		205
591	Lède,		206
592	Rosage,		*ibid.*
593	Andromède,		207
594	Épigée,		209
595	Gaulthère,		210
596	Arbousier,		211
597	Cléthra,		212
598	Pyrole,		213
599	Alibousier,		214
600	Samyde,		215
601	Copaïer,		216
602	Bucide,		217
603	Royène,		*ibid.*
604	Hydrangée,		218
605	Cunonie,		*ibid.*
606	Trianthème,		219
607	Dorine,		*ibid.*
608	Saxifrage,		220
609	Tiarelle,		227
610	Mitelle,		*ibid.*
611	Knavel,		228
612	Gypsophile,		229

		tome.	pag.
613	Saponaire,	II	231
614	Œillet,		233
615	Cucubale,		237
616	Cornillet,		240
617	Stellaire,		245
618	Sablière,		247
619	Cherlerie,		250
620	Garidèle,		251
621	Malpighie,		252
622	Banistère,		253
623	Hirée,		254
624	Trioptère,		*ibid.*
625	Érythroxyle,		255
626	Carambolier,		256
627	Monbin,		*ibid.*
628	Cotylier,		257
629	Orpin,		258
630	Penthore,		262
631	Bergie,		263
632	Suriane,		*ibid.*
633	Griel,		264
634	Surelle,		*ibid.*
635	Agrostème,		267
636	Lamprette,		268
637	Céraiste,		270
638	Spargoute,		273
639	Forskœhle,		274
640	Neurade,		*ibid.*
641	Phytolaque,		275
642	Cabaret,		280
643	Boccone,		281
644	Géthyllide,		*ibid.*
645	Illipée,		282
646	Palétuvier,		*ibid.*
647	Blakée,		283
648	Béfare,		284
649	Vatique,		*ibid.*
650	Mangoustan,		285
651	Halésie,		286
652	Décumare,		286
653	Winterane,		287
654	Cratève,		*ibid.*
655	Lappulier,		288
656	Pègane,		289
657	Hudsone,		290
658	Nitrare,	II	290
659	Pourpier,		291
660	Salicaire,		292
661	Ginore,		294
662	Héliocarpe,		294
663	Aigremoine,		295
664	Réséda,		296
665	Euphorbe,		299
666	Glinus,		311
667	Joubarbe,		312
668	Cacte,		318
669	Syringa,		322
670	Goyavier,		*ibid.*
671	Eugénie,		323
672	Myrte,		324
673	Grenadier,		327
674	Amandier,		328
675	Prunier,		330
676	Pline,		336
677	Chrysobolan,		337
678	Alisier,		*ibid.*
679	Sorbier,		339
680	Sésuve,		341
681	Néflier,		*ibid.*
682	Poirier,		343
683	Tétragone,		346
684	Ficoïde,		347
685	Aizoon,		353
686	Spirée,		354
687	Rosier,		357
688	Ronce,		361
689	Fraisier,		362
690	Potentille,		365
691	Tormentille,		371
692	Benoite,		372
693	Dryade,		374
694	Comaret,		*ibid.*
695	Calycanthe,		375
696	Marcgrave,		384
697	Trilix,		*ibid.*
698	Rhéède,		385
699	Caprier,		*ibid.*
700	Actée,		387
701	Sanguinaire,		388
702	Podophylle,		389

		tome.	pag.
703	Chélidoine,	II	389
704	Pavot,		391
705	Argemone,		395
706	Cambogier,		*ibid.*
707	Muntinge,		396
708	Sarracène,		*ibid.*
709	Nénuphar,		397
710	Rocou,		398
711	Sloane,		399
712	Trèwe,		*ibid.*
713	Mammée,		400
714	Ochnée,		401
715	Grias,		*ibid.*
716	Calophylle,		402
717	Tilleul,		*ibid.*
718	Laétie,		403
719	Éléocarpe,		404
720	Lécythe,		405
721	Délime,		*ibid.*
722	Vatère,		406
723	Mentzèle,		*ibid.*
724	Loose,		407
725	Lagerstroémie,		*ibid.*
726	Thé,		408
727	Géroflier,		409
728	Ciste,		410
729	Prockie,		417
730	Corchore,		418
731	Séguière,		419
732	Pivoine,		420
733	Curatelle,		421
734	Fothergille,		*ibid.*
735	Calligone,		422
736	Delphin,		423
737	Aconit,		425
738	Tétracère,		428
739	Caryocar,		*ibid.*
740	Cimifuge,		*ibid.*
741	Ancolie,		429
742	Nigelle,		431
743	Beaumure,		432
744	Stratiote,		433
745	Mélisse,		434
746	Badiane,		*ibid.*
747	Tulipier,		435
748	Magnolier,	II	436
749	Michelie,		437
750	Uvaire,		*ibid.*
751	Corossol,		438
752	Anemone,		439
753	Atragène,		444
754	Clématite,		445
755	Pigamon,		448
756	Adonis,		450
757	Renoncule,		451
758	Trolle,		462
759	Isopyre,		463
760	Hellébore,		464
761	Populage,		466
762	Hydraste,		467
763	Bugle,	*Tome* III.	10
764	Germandrée,		11
765	Sariette,		19
766	Thymbre,		20
767	Hyssope,		21
768	Cataire,		22
769	Lavande,		25
770	Crapaudine,		27
771	Menthe,		30
772	Pérille,		34
773	Gléchome,		*ibid.*
774	Lamie,		35
775	Galéopside,		37
776	Bétoine,		39
777	Stachyde,		40
778	Ballote,		43
779	Marrube,		44
780	Agripaume,		47
781	Phlomide,		48
782	Moluccelle,		51
783	Clinopode,		52
784	Origan,		53
785	Thym,		56
786	Melisse,		59
787	Dracocéphale,		61
788	Hormin,		64
789	Mélitte,		65
790	Basilic,		*ibid.*
791	Trichostème,		68
792	Toque,		69

		tome.	pag.
793	Prunelle,	III	71
794	Cléonie,		72
795	Prase,		73
796	Phryme,		74
797	Bartsie,		*ibid.*
798	Rhinanthe,		75
799	Euphraise,		77
800	Melampyre,		79
801	Clandestine,		81
802	Schwalbée,		82
803	Tozzie,		*ibid.*
804	Pédiculaire,		83
805	Gérarde,		86
806	Chélone,		87
807	Gesnère,		88
808	Mufflier,		89
809	Cymbaire,		97
810	Craniolaire,		98
811	Martyne,		*ibid.*
812	Torène,		99
813	Beslère,		100
814	Scrophulaire,		101
815	Celsie,		104
816	Digitale,		105
817	Bignone,		106
818	Guitarin,		109
819	Hallère,		110
820	Calebassier,		*ibid.*
821	Gmeline,		111
822	Pétrée,		*ibid.*
823	Andarèse,		112
824	Lantane,		*ibid.*
825	Cornutie,		114
826	Loësèle,		115
827	Capraire,		*ibid.*
828	Linderne,		116
829	Sélagine,		117
830	Manulèle,		118
831	Hébenstreitie,		119
832	Érine,		*ibid.*
833	Buchnère,		121
834	Browalle,		*ibid.*
835	Linnée,		122
836	Sibthorpe,		123
837	Limoselle,		124
838	Vandelle,	III	124
839	Stémode,		125
840	Obolaire,		*ibid.*
841	Orobanche,		126
842	Hyobanche,		128
843	Dodarte,		*ibid.*
844	Lippie,		129
845	Sésame,		*ibid.*
846	Mimule,		131
847	Ruelle,		*ibid.*
848	Barrelière,		133
849	Durante,		134
850	Oviède,		135
851	Volkamère,		136
852	Clérodendron,		*ibid.*
853	Gattilier,		137
854	Bontie,		139
855	Avicenne,		*ibid.*
856	Columnée,		140
857	Acanthe,		141
858	Pédalie,		142
859	Mélianthe,		143
860	Cameline,		148
861	Velle,		150
862	Anastatique,		*ibid.*
863	Subulaire,		151
864	Drave,		152
865	Passe-rage,		154
866	Thlaspi,		157
867	Cochléaria,		160
868	Ibéride,		163
869	Alysson,		165
870	Clypéole,		168
871	Peltaire,		169
872	Biscutelle,		170
873	Lunaire,		171
874	Ricotie,		172
875	Dentaire,		*ibid.*
876	Cardamine,		174
877	Sisymbre,		177
878	Vélar,		182
879	Giroflier,		183
880	Héliophile,		187
881	Julienne,		188
882	Arabète,		189

		tome.	pag.
883	Turrite,	III	191
884	Chou,		192
885	Moutarde,		197
886	Raifort,		199
887	Bunias,		201
888	Pastel,		202
889	Crambe,		203
890	Cléome,		204
. . .	Aphytée,		212
891	Lerchée,		*ibid.*
892	Walthère,		213
893	Hermanne,		*ibid.*
894	Mélochie,		215
895	Connare,		216
896	Hugone,		*ibid.*
897	Bec-de-Grue,		217
898	Browne,		230
899	Pentapète,		*ibid.*
900	Adansone,		231
901	Fromager,		232
902	Side,		233
903	Malachre,		236
904	Guimauve,		237
905	Alcée,		238
906	Mauve,		239
907	Lavatère,		244
908	Malope,		246
909	Urène,		247
910	Cotonnier,		*ibid.*
911	Hibisque,		249
912	Stewarte,		253
913	Gordone,		254
914	Camelle,		*ibid.*
915	Mésnée,		255
916	Morisone,		*ibid.*
917	Gustave,		256
918	Monnière,		265
919	Saraca,		*ibid.*
920	Fumeterre,		266
921	Polygale,		269
922	Sécuridaca,		275
923	Nissole,		*ibid.*
924	Abre,		276
925	Ptérocarpe,		277
926	Erythrine,		278
927	Piscidier	III	279
928	Bourbone,		*ibid.*
929	Spartie,		280
930	Genêt,		283
931	Aspalathe,		286
932	Ajonc,		290
933	Amorpha,		291
934	Crotalaire,		*ibid.*
935	Bugrane,		294
936	Vulnéraire,		298
937	Arachide,		301
938	Ebénier,		302
939	Lupin,		*ibid.*
940	Haricot,		304
941	Dolic,		307
942	Glycine,		311
943	Clitorie,		312
944	Pois,		313
945	Orobe,		315
946	Gesse,		317
947	Vesce,		322
948	Lentille,		326
949	Pois-chiche,		328
950	Lipare,		329
951	Cytise,		330
952	Geoffroie,		332
953	Robinier,		333
954	Bagnenaudier,		334
955	Réglisse,		335
956	Coronille,		337
957	Ornithope,		339
958	Hippocrépide,		341
959	Chenillette,		342
960	Nélitte,		343
961	Sainfoin,		345
962	Indigotier,		352
968	Galéga,		354
964	Phaque,		356
965	Astragale,		357
966	Bisserule,		365
967	Psorale,		365
968	Trèfle,		368
969	Lotier,		377
970	Trigonelle,		380
971	Luzerne,		383

		tome.	pag.
972	Cacaoyer,	III	390
973	Monsone,		391
974	Citronnier,		392
975	Glabrare,		393
976	Muenchhause,		394
977	Durio,		395
978	Mélaleuque,		*ibid.*
979	Hopée,		396
980	Symplocos,		*ibid.*
981	Mille-pertuis,		397
982	Ascyre,		403
983	Géropogone,		419
984	Salsifis,		*ibid.*
985	Scorsonère,		422
986	Picride,		424
987	Laitron,		425
988	Laitue,		428
989	Chondrille,		430
990	Prénanthe,		431
991	Dent-de-lion,		433
992	Épervière,		436
993	Crépide,		443
994	Andryale,		447
995	Hyosère,		448
996	Sériole,		450
997	Hypochéride,		451
998	Lapsane,		452
999	Cupidone,		454
1000	Chicorée,		455
1001	Scolyme,		457
1002	Bardane,		*ibid.*
1003	Sarrette,		459
1004	Chardon,		462
1005	Cnique,		468
1006	Onoporde,		470
1007	Artichaud,		471
1008	Carline,		472
1009	Atractyle,		474
1010	Carthame,		475
1011	Spilanthe,		477
1012	Bident,		479
1013	Cacalie,		481
1014	Éthulie,		484
1015	Eupatoire,		485
1016	Agérate,		488
1017	Ptérone,	III	489
1018	Stéhéline,		490
1019	Chrysocome,		491
1020	Tarchonanthe,		493
1021	Calée,		494
1022	Santoline,		495
1023	Athanasie,		496
1024	Tanaisie,		498
1025	Armoise,		500
1026	Immortelle,		507
1027	Xéranthème,		515
1028	Carpèse,		518
1029	Baccharis,		*ibid.*
1030	Conyse,		520
1031	Vergerette,		523
1032	Tussilage,		527
1033	Séneçon,		530
1034	Aster,		537
1035	Verge-d'or.		542
1036	Cinéraire,		545
1037	Inule,		548
1038	Arnique,		553
1039	Doronic,		555
1040	Perdice,		556
1041	Hélénie,		557
1042	Paqueretté,		558
1043	Bellie,		560
1044	Tagète,		560
1045	Leysère,		562
1046	Zinne,		*ibid.*
1047	Pectis,		563
1048	Chrysanthème,		564
1049	Matricaire,		569
1050	Cotule,		571
1051	Anacycle,		573
1052	Camomille,		574
1053	Achillée.		578
1054	Tridax,		583
1055	Amelle,		*ibid.*
1056	Éclipte,		584
1057	Sigesbecke,		585
1058	Verbésine,		586
1059	Buphtalme,		588
1060	Hélianthe,		590
1061	Rudbecke,		593
1062	Coréopse,		

		tome.	pag.
1062	Coréopse.	III	594
1063	Osmite,		596
1064	Gortère,		597
1065	Zoégée,		598
1066	Centaurée,		599
1067	Millère,		612
1068	Baltimore,		613
1069	Silphe,		614
1070	Polymnie,		615
1071	Chrysogone,		616
1072	Mélampode,		617
1073	Souci,		618
1074	Arctotide,		620
1075	Osteosperme,		622
1076	Othonne,		624
1077	Hippie,		625
1078	Ériocéphale,		626
1079	Cotonnière,		627
1080	Microp e,		629
1081	Eléphantope,		630
1082	Oédère,		631
1083	Sphéranthe,		632
1084	Boulette,		633
1085	Gundèle,		634
1086	Stébée,		634
1087	Armoselle,		635
1088	Strumphe,		636
1089	Corymbiole,		637
1090	Jasione,		*ibid.*
1091	Lobélie,		638
1092	Violette,		642
1093	Balsamine,		647
1094	Orchis,	*Tome* IV	5
1095	Satyrion,		12
1096	Ophrys,		14
1097	Helléborine,		19
1098	Limodore,		21
1099	Aréthuse,		22
1100	Sabot,		23
1101	Vanille,		24
1102	Gunnère,		28
1103	Bermudiane,		*ibid.*
1104	Ferrare,		29
1105	Salace,		*ibid.*
1106	Stilago,	IV.	30
1107	Bandure,		*ibid.*
1108	Ayénie,		31
1109	Glute,		*ibid.*
1110	Grenadille,		32
1111	Aristoloche,		36
1112	Pistie,		40
1113	Kleinhove,		41
1114	Hélictère,		42
1115	Hypoéiste,		43
1116	Xylope,		44
1117	Grèwe,		44
1118	Ambrosine,		45
1119	Gouet,		*ibid.*
1120	Draconte,		50
1121	Calle,		51
1122	Pothos,		52
1123	Zostère,		53
1124	Zannichellie,		68
1125	Cératocarpe,		*ibid.*
1126	Cynomore,		70
1127	Charagne,		71
1128	Élatère,		72
1129	Angurie,		*ibid.*
1130	Lemne,		73
1131	Massette,		74
1132	Rubanier,		76
1133	Mays,		77
1134	Tripsaque,		78
1135	Larmille,		79
1136	Olyre,		80
1137	Carex,		*ibid.*
1138	Axyris,		89
1139	Omphale,		90
1140	Tragie,		91
1141	Hernande,		92
1142	Phyllanthe,		93
1143	Centelle,		94
1144	Serpicule,		95
1145	Littorelle,		96
1146	Cicca,		*ibid.*
1147	Bouleau,		97
1148	Buis,		99
1149	Ortie,		100

		tom.	pag.
1150	Mûrier,	IV	104
1151	Néphèle,		106
1152	Glouteron,		*ibid.*
1153	Ambrosie,		108
1154	Parthène,		109
1155	Iva,		110
1156	Clibade,		111
1157	Amaranthe,		*ibid.*
1158	Léée,		115
1159	Zizane,		116
1160	Pharelle,		117
1161	Guettarde,		*ibid.*
1162	Cératophylle,		118
1163	Myriophylle,		119
1164	Sagittaire,		*ibid.*
1165	Bégone,		121
1166	Théligone,		122
1167	Potérie,		*ibid.*
1168	Chêne,		124
1169	Noyer,		127
1170	Hêtre,		129
1171	Charme,		131
1172	Noisetier,		133
1173	Platane,		134
1174	Liquidambar,		135
1175	Pin,		136
1176	Thuya,		140
1177	Cyprès,		141
1178	Plukenette,		143
1179	Daléchampe,		143
1180	Ricinelle,		*ibid.*
1181	Croton,		146
1182	Cupane,		150
1183	Jatropha,		*ibid.*
1184	Ricin,		152
1185	Sterculie,		153
1186	Mancenillier,		154
1187	Stillinge,		155
1188	Gnet,		156
1189	Sablier,		*ibid.*
1190	Anguine,		157
1191	Momordique,		158
1192	Courge,		160
1193	Concombre,		163
1194	Bryone,	IV	165
1195	Sicyos,		167
1196	Andrachnée,		168
1197	Agynéie,		169
1198	Naïade,		180
1199	Vallisnérie,		*ibid.*
1200	Coulekin,		182
1201	Saule,		*ibid.*
1202	Camarigne,		189
1203	Rouvet,		190
1204	Restio,		191
1205	Agalloche,		192
1296	Cature,		*ibid.*
1207	Trophis,		193
1208	Batis,		*ibid.*
1209	Gui,		194
1210	Argousier,		196
1211	Galé,		197
1212	Pistachier,		198
1213	Xantoxyle,		200
1214	Astronie,		201
1215	Canarium,		*ibid.*
1216	Antidesme,		202
1217	Irésine,		*ibid.*
1218	Épinard,		203
1219	Acnide,		204
1220	Chanvre,		205
1221	Houblon,		206
1222	Zanonie,		207
1223	Feuillée,		208
1224	Tame,		209
1225	Smilax,		210
1226	Rajanie,		212
1227	Igname,		213
1228	Peuplier,		215
1229	Rhodiole,		217
1230	Mercuriale,		218
1231	Morène,		220
1232	Carica,		221
1233	Kiggélaire,		222
1234	Mollé,		223
1235	Redoul,		224
1236	Euclée,		*ibid.*
1237	Cannabine,		225

		tome.	pag.
1238	Ménisperme,	IV	226
1239	Clifforte,		228
1240	Genevrier,		229
1241	If,		232
1242	Éphèdre,		233
1243	Cissampelos,		234
1244	Napée,		235
1245	Adèle,		236
1246	Fragon,		237
1277	Clutie,		239
1248	Bananier,		250
1249	Vératre,		251
1250	Spinifex,		253
1251	Barbon,		*ibid.*
1252	Houque,		257
1253	Aplude,		259
1254	Ischème,		260
1255	Racle,		*ibid.*
1256	Égilope,		262
1257	Manisuris,		263
1258	Vaillant,		264
1259	Pariétaire,		266
1260	Arroche,		268
1261	Badomier,		270
1262	Brabei,		271
1263	Clusie,		272
1264	Ophioxyle,		273
1265	Fusan,		274
1266	Érable,		*ibid.*
1267	Micocoulier,		277
1268	Gouane,		278
1269	Solandre,		279
1270	Hermas,		280
1271	Sensitive,		281
1272	Glitsche,		288
1273	Frêne,		289
1274	Plaqueminier,		290
1275	Nyssa,		292
1276	Anthosperme,		*ibid.*
1277	Stilbé,		293
1278	Arctope,		294
1279	Pisone,		295
1280	Gin-seng,		296
1281	Chrysite,		297
1282	Caroubier,	IV	298
1283	Figuier,		299
1284	Prêle,		308
1285	Cycas,		309
1286	Zamie,		310
1287	Onoclée,		311
1288	Ophioglosse,		*ibid.*
1289	Osmonde,		313
1290	Acrostich,		316
1291	Ptéride,		320
1292	Bléchne,		322
1293	Hémionite,		323
1294	Lonchite,		*ibid.*
1295	Doradille,		324
1296	Polypode,		328
1297	Capillaire,		338
1298	Trichomane,		341
1299	Marsile,		343
1300	Pillulaire,		344
1301	Isoëte		*ibid.*
1302	Lycopode,		345
1303	Porelle,		349
1304	Sphagne,		*ibid.*
1305	Phusque,		350
1306	Fontinale,		*ibid.*
1307	Baxbaume:		351
1308	Splachne,		352
1309	Polytrich,		*ibid.*
1310	Mnie,		353
1311	Bri,		356
1312	Hypne,		361
1313	Jungermanne,		368
1314	Targione,		372
1315	Hépatique,		*ibid.*
1316	Blasie,		374
1317	Riccie,		375
1318	Anthocère,		376
1319	Lichen,		377
1320	Tremelle,		394
1321	Varec,		395
1322	Ulve,		402
1323	Conferve,		404
1324	Bysse,		407
1325	Agaric,		409

		tome.	pag.
1326	Bolet,	IV	412
1327	Hydne,		414
1328	Morille,		415
1329	Clathre,		*ibid.*
1330	Helvelle.		416
1331	Pézize,		416
1332	Clavaire,		418
1333	Vesce-de-loup,		419
1334	Moisissure,		421
1335	Palmiste,		424
1336	Rondier,	IV	425
1337	Coryphe,		*ibid.*
1338	Cocotier,		426
1339	Dattier,		427
1340	Élaïs,		428
1341	Arec,		*ibid.*
1352	Élaté,		429
1343	Caryota,		430
.....	Ginkgo,		*ibid.*

Fin de la troisième Table.

TABLE QUATRIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE NOSOLOGIQUE (*).

Le premier chiffre indique le *Tome*, le second la *page du Tome*.

A.

Abcès.
Salicornia herbacea, L. I 9

Acreté alkaline des humeurs.
Rubus idæus, L. II 361

Acreté dartreuse, *Voy.* Dartres.

Acreté galeuse, *Voyez* Gâle.

Acrimonie.
Rhamnus Ziziphus, L. II 365

Accouchement difficile.
Aquilegia vulgaris, L. II 430
Cheiranthus Cheiri, L. III 184

(*) Nous croyons devoir prévenir nos Lecteurs que quoique nous ne soyons pas médecins, nous pouvons les assurer qu'ils peuvent accorder toute confiance aux propriétés et vertus des Plantes que nous avons énoncées dans le texte de notre Ouvrage après le signalement et la synonymie de chaque espèce médicinale ; vû que nous avons puisé nos assertions dans des Ouvrages publiés par de célèbres Praticiens. Mais comme nous sommes convaincus que les matières médicales des meilleurs Auteurs présentent des propriétés, souvent déduites ou de la doctrine des signatures, ou des qualités sensibles, ou des affinités naturelles, sans être étayées par l'observation clinique, nous avons cru sur-tout devoir consulter pour chaque article, l'Auteur des *Démonstrations élémentaires de Botanique*, Médecin et Botaniste qui, comme nous nous en sommes assurés depuis 15 ans, a toujours fait ses observations avec méthode et réflexion. La confiance dont il jouit depuis 30 ans dans une des villes les plus populeuses de France, lui a fourni toutes les occasions de vérifier les propriétés de la plupart des Plantes journellement prescrites.

Nous aurions même desiré pouvoir imiter en annonçant les propriétés des Plantes, la méthode adoptée par le Dr. *Gilibert*, savoir, d'indiquer rigoureusement les espèces et les variétés des maladies pour lesquelles la plante est prescrite. Mais nous supposons que nos Lecteurs médecins ont toutes les connoissances acquises sur les principes philosophiques de la thérapeutique, ou sur les véritables indications des remèdes dans les différens temps et dans les différentes circonstances des maladies. Nous n'avons pu, ayant adopté la méthode de *Linné* pour la matière médicale, indiquer le plus souvent comme lui, que les genres, renvoyant toujours pour les cas particuliers où chaque plante peut être appliquée, aux détails fournis par l'Auteur des *Démonstrations élémentaires de Botanique*, comme nous avons annoncé dans notre Préface, que pour les détails des descriptions et adombrations des espèces généralement cultivées dans les jardins, nous renvoyons constamment à cet Ouvrage, le regardant comme un supplément nécessaire au *Système des Plantes*.

	tom.	pag.
Origanum vulgare, L.	III	55
Lycopodium clavatum, L.	IV	345
Affections acrimonieuses, *Voy.* Acrimonie.		
Affections catarrales, *Voyez* Catarre.		
Affections catarrales des voies urinaires.		
Vaccinium Myrtillus, L.	II	120
Arbutus Uva ursi, L.	II	212
Solidago Virga-aurea, L.	III	544
Affections convulsives, *Voyez* Convulsions.		
Affections cutanées, *Voy.* Maladies de la peau.		
Affections hypocondriaques, *Voy.* Hypocondrie.		
Affections hystériques, *Voy.* Hystéricie.		
Affections nerveuses, *Voy.* Maladies des nerfs.		
Affections rhumatismales, *Voyez* Rhumatisme.		
Affections spasmodiques.		
Papaver somniferum, L.	II	393
Tilia Europæa, L.	II	403
Marrubium vulgare, L.	III	46
Dracocephalum Moldavica, L.	III	63
Cardamine pratensis, L.	III	176
Affections soporeuses.		
Peucedanum officinale, L.	I	459
Scilla maritima, L.	II	43
Asarum Europæum, L.	II	280
Tuca Bohea, L.	II	408
Mentha crispa, L.	III	31
Affections vaporeuses.		
Marrubium vulgare, L.	III	46
Affections vénériennes, *Voyez* Vérole.		
Affections vermineuses, *Voyez* Vers.		
Anasarques.		
Asclepias Vincetoxicum, L.	I	411
Teucrium Scordium, L.	III	16
Augine.		
Ribes nigrum, L.	I	379
Sambucus nigra, L.	I	504
Polygonum Bistorta, L.	II	141
Prunella vulgaris, L.	III	71
Malva rotundifolia, L.	III	241
Angine aqueuse.		
Pimpinella saxifraga, L.	I	494
Equisetum arvense, L.	IV	308
Angine catarreuse.		
Hyssopus officinalis, L.	III	22
Angine tonsillaire.		
Scabiosa Succisa, L.	I	169
Ankilose.		
Aconitum napellus, L.	IV	426
Anorexie.		
Costus Arabicus, L.	I	5
Laserpitium latifolium, L.	I	464
Angelica Archangelica, L.	I	469
Pimpinella Anisum, L.	I	495
Allium sativum, L.	II	26
Calamus aromaticus, L.	II	65
Laurus Cinnamomum, L.	II	155
Capparis spinosa, L.	II	385
Delphinium Staphysagria, L.	II	425
Hyssopus officinalis, L.	III	22
Mentha crispa, L.	III	31
Glechoma hederacea, L.	III	35
Molucella lævis, L.	III	51
Fumaria officinalis, L.	III	268
Santolina Chamæ-Cyparissus, L.	III	495
Tanacetum vulgare, L.	III	499

	tom.	pag.
Artemisia Absinthium, L.	III	505
Achillea Millefolium, L.	III	582
Centaurea benedicta, L.	III	608
Salix alba, L.	IV	189
Juniperus communis, L.	IV	231
Lichen pulmonarius, L.	IV	384
Aristolochia rotunda, L.	IV	39
Anthrax.		
Datura Stramonium, L.	I	334
Ferula Assa fœtida, L.	I	463
Cicuta virosa, L.	I	478
Paris quadrifolia, L.	II	151
Apoplexie.		
Costus Arabicus, L.	I	5
Rosmarinus officinalis, L.	I	45
Convallaria majalis, L.	II	53
Asarum Europæum, L.	II	280
Cheiranthus Cheiri, L.	III	184
Brassica Eruca, L.	III	196
Apoplexie séreuse.		
Teucrium Marum, L.	III	14
Aphthes.		
Daucus Carotta, L.	I	452
Polygonum Hydropiper, L.	II	142
Sempervivum tectorum, L.	II	312
Brassica rapa, L.	III	199
Ardeurs d'urine, *Voy.* Dysurie.		
Ascite. *Voyez* Hydropisie.		
Assoupissement. *Voy.* Affections soporeuses.		
Asthme.		
Kæmpferia rotunda, L.	I	8
Veronica officinalis, L.	I	25
Crocus sativus, L.	I	74
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Capsicum annuum, L.	I	349
Chenopodium Botrys, L.	I	417
Ferula Assa-fœtida, L.	I	463
Bubon Galbanum, L.	I	474
Phellandrium aquaticum, L.	I	478
Æthusa Meum, L.	I	480
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Amyris Opobalsamum, L.	II	115
Cambogia Gutta, L.	II	395
Aconitum Napellus, L.	II	426
Hyssopus officinalis, L.	III	22
Mentha crispa, L.	III	31
Cochlearia Armoracia, L.	III	162
Erysimum Alliaria, L.	III	183
Raphanus sativus, L.	III	200
Tragopogon pratense, L.	III	420
Tussilago Farfara, L.	III	529
Veratrum album, L.	IV	252
Ceratonia Siliqua, L.	IV	299
Asthme catarral.		
Crysimum officinale, L.	III	182
Asthme humide.		
Rosmarinus officinalis, L.	I	45
Convolvulus Scammonia, L.	I	202
Rhamnus catharticus, L.	I	362
—— *Frangula*, L.	I	364
Scilla maritima, L.	II	43
Colchicum autumnale, L.	II	89
Lepidium sativum, L.	III	155
Inula Helenium, L.	III	548
Arnica montana, L.	III	554
Aristolochia rotunda, L.	IV	39
Asthme pituiteux.		
Ruta graveolens, L.	II	187
Actæa spicata, L.	II	388
Helleborus niger, L.	II	465
Teucrium Marum, L.	III	14
Glechoma hederacea, L.	III	35
Marrubium vulgare, L.	III	46
Origanum vulgare, L.	III	55
Polygala vulgaris, L.	III	271
Santolina Chamæ-Cyparissus, L.	III	495
Tussilago Petasites, L.	III	530
Inula Helenium, L.	III	548
Arum maculatum, L.	IV	48
Polypodium vulgare, L.	IV	330

	tom.	pag.
Atonie, *Voy.* Foiblesse.		
Atonie des viscères, *Voyez* Foiblesse des viscères.		
Avortemens.		
Pyrus Cydonia, L.	II	346
Avortemens habituels.		
Papaver somniferum, L.	II	393
Atrophie.		
Hedera Helix, L.	I	382
Linum usitatissimum, L.	I	520

B.

Bile.		
Vitis vinifera, L.	I	383
Pyrus Cydonia, L.	II	346
Bouffissure.		
Fragaria vesca, L.	II	364
Lactuca virosa, L.	III	430
Aristolochia rotunda, L.	IV	39
Brûlure.		
Datura Stramonium, L.	I	334
Solanum nigrum, L.	I	346
Althæa officinalis, L.	III	238
Bubons. *Voy.* Anthrax.		

C.

Cachexie.		
Curcuma longa, L.	I	7
Veronica officinalis, L.	I	25
Rhamnus catharticus, L.	I	362
Scilla maritima, L.	II	43
Laurus Camphora, L.	II	156
Saponaria officinalis, L.	II	231
Fumaria officinalis, L.	III	268
Polygala vulgaris, L.	III	271
Ononis arvensis, L.	III	295
Arum maculatum, L.	IV	48
Smilax Salsaparilla, L.	IV	211
Asplenium Scolopendrium, L.	IV	325
Cachexie acrimonieuse.		
Cycas circinalis, L.	IV	309
Cachexie froide.		
Dorstenia Drakæna, L.	I	212
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Convolvulus Jalappa, L.	I	295
Cinchona officinalis, L.	I	318
Gentiana lutea, L.	I	431
—— *Centaurium*, L.	I	435
Laurus Sassafras, L.	II	158
Gambogia gutta, L.	II	395
Cochlearia officinalis, L.	III	161
—— *Armoracia*, L.	III	162
Brassica Eruca, L.	III	196
Sinapis nigra, L.	III	198
Tanacetum vulgare, L.	III	499
Centaurea benedicta, L.	III	608
Calcul.		
Cinchona officinalis, L.	I	318
Herniaria glabra, L.	I	414
Eryngium campestre, L.	I	439
Linum usitatissimum, L.	I	520
Ledum palustre, L.	II	212
Prunus spinosa, L.	II	336
Fragaria vesca, L.	II	364
Betula alba, L.	IV	98
Cancers.		
Galium verum, L.	I	182
Plumbago Europæa, L.	I	288
Cinchona officinalis, L.	I	318
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Atropa Belladona, L.	I	340
Solanum nigrum, L.	I	346
Herniaria glabra, L.	I	414
Daucus Carotta, L.	I	452
Conium maculatum, L.	I	455
Prunus Lauro-Cerasus, L.	II	331
Erysimum officinale, L.	III	182
Cancers aux lèvres.		
Clematis erecta, L.	II	447
Cancers ulcérés.		
Phytolacca decandra, L.	II	276
Carcinome.		
Datura Stramonium, L.	I	334
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Daphne Mezereum, L.	II	132

	tom.	pag.
Clematis erecta, L.	II	447
Cardialgie.		
Coffæa Arabica, L.	I	320
Strychnos Nux vomica, L.	I	350
Fagara octandra, L.	II	206
Achillea Millefolium, L.	III	582
Carie.		
Euphorbia officinarum, L.	II	300
—— *palustris*, L.	II	310
Clematis erecta, L.	II	447
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Carie des côtes.		
Aloë perfoliata, L.	I	61
Carie humide.		
Caryophyllus aromaticus, L.	IV	408
Carreaux des petis enfans.		
Cyclamen Europæum, L.	I	276
Catarre.		
Laurus Sassafras, L.	II	158
Styrax officinale, L.	II	215
Winterana Canella, L.	II	287
Papaver Rhœas, L.	II	392
Glechoma hederacea, L.	III	35
Marrubium vulgare, L.	III	46
Arnica montana, L.	III	554
Pistacia Lentiscus, L.	IV	200
Cataracte.		
Polygala vulgaris, L.	III	271
Cautère.		
Iris Florentina, L.	I	79
Céphalalgie.		
Verbena officinalis, L.	I	41
Fagara octandra, L.	I	206
Coffæa Arabica, L.	I	320
Angelica Archangelica, L.	I	469
Ruta graveolens, L.	II	187
Ledum palustre, L.	II	206
Cistus Creticus, L.	II	412
Magnolia glauca, L.	II	436
Mentha crispa, L.	III	31
Glechoma hederacea, L.	III	35
Betonica officinalis, L.	III	39
Artemisia Abrotanum, L.	III	505
Populus balsamifera, L.	IV	217
Ceratonia Siliqua, L.	IV	299
Chaleur d'entrailles.		
Vitis vinifera, L.	I	383
Chaleur fébrile.		
Ribes rubrum, L.	I	379
Rubus Idæus, L.	II	361
Chlorose.		
Rosmarinus officinalis, L.	I	45
Asclepias Vincetoxicum, L.	I	411
Gentiana lutea, L.	I	431
Laserpitium latifolium, L.	I	464
Angelica Archangelica, L.	I	469
Apium Petroselinum, L.	I	496
Ruta graveolens, L.	II	187
Sedum acre, L.	II	261
Chelidonium majus, L.	II	390
Teucrium Scordium,	III	16
Nepeta Cataria, L.	III	23
Melissa officinalis, L.	III	60
—— *Calamintha*, L.	III	61
Santolina Chamæ-cyparissus, L.	III	495
Inula Helenium, L.	III	548
Arnica montana, L.	III	554
Arum maculatum, L.	IV	49
Cucumis Colocynthis, L.	IV	163
Ruscus aculeatus, L.	IV	238
Chlorose avec atonie.		
Helleborus niger, L	II	464
Origanum vulgare, L.	III	55
Chlorose avec suppression de règles.		
Teucrium Marum, L.	III	14
Chûte.		
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Chûte de la luette.		
Piper nigrum, L.	I	54
Chûte du rectum.		
Atropa Belladona, L.	I	340
Mimosa Nilotica, L.	IV	286
Circoncision.		
Copaifera officinalis, L.	II	216

	tom.	pag.
Colique.		
Amomum Zingiber, L.	I	4
—— *Grana paradisi*, L.	I	4
Maranta Galanga, L.	I	6
Olea Europæa, L.	I	20
Ilex aquifolium, L.	I	223
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Strychnos Nux vomica, L.	I	350
Imperatoria Ostruthium, L.	I	485
Anethum gravæolens, L.	I	491
—— *Fœniculum*, L.	I	492
Rheum Rhabarbarum, L.	II	161
Cassia fistulosa, L.	II	178
Pyrus Cydonia, L.	II	346
Papaver somniferum, L.	II	393
Nigella sativa, L.	II	432
Malva rotundifolia, L.	III	124
Trifolium Melilotus officinale, L.	III	369
Matricaria Chamomilla, L.	III	570
Achillea Millefolium, L.	III	582
Atriplex hortensis, L.	IV	269
Ficus Carica, L.	IV	300
Polypodium vulgare, L.	IV	330
Colique avec diarrhées.		
Ulmus campestris, L.	I	426
Colique calculeuse.		
Cassine Peragua, L.	I	503
Colique lochiale.		
Crocus sativus, L.	I	74
Colique menstruelle.		
Crocus sativus, L.	I	74
Colique néphrétique.		
Olea Europæa, L.	I	20
Lithospermum officinale, L.	I	252
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Physalis Alkekengi, L.	I	342
Linum usitatissimum, L.	I	520
Cassia fistulosa, L.	II	178
Guilandina Moringa, L.	II	183
Papaver somniferum, L.	II	393
Glechoma hederacea, L.	III	35
Ononis arvensis, L.	III	295
Glycyrrhiza glabra, L.	III	336
Ricinus communis, L.	IV	153
Colique des peintres.		
Allamanda cathartica, L.	I	397
Linum usitatissimum, L.	I	520
Ricinus communis, L.	IV	153
Colique des petits enfans.		
Iris Florentina, L.	I	79
Plumbago Europæa, L.	I	288
Anethum Fœniculum, L.	I	492
Matricaria Parthenium, L.	III	569
Viscum album, L.	IV	195
Coliques spasmodiques.		
Carum Carvi, L.	I	493
Papaver Rhœas, L.	II	392
—— *somniferum*, L.	II	393
Althæa officinalis, L.	III	238
Matricaria Parthenium, L.	III	569
Colique venteuse.		
Costus Arabicus, L.	I	5
Chenopodium Botrys, L.	I	417
Cuminum Cyminum, L.	I	475
Carum Carvi, L.	I	493
Pimpinella Anisum, L.	I	495
Allium sativum, L.	II	26
Mentha crispa, L.	III	31
Matricaria Parthenium, L.	III	569
Consomption.		
Allium Porrum, L.	II	24
Theobroma Cacao, L.	III	391
Orchys bifolia, L.	IV	6
—— *Morio*, L.	IV	8
Contusions.		
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Apium Petroselinum, L.	I	496
Polygala vulgaris, L.	III	271
Pinus sylvestris, L.	IV	137

	tom.	pag.
Contusions avec échimose.		
Arnica montana, L.	III	554
Constipation.		
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Linum usitatissimum, L.	I	520
Aloë perfoliata, L.	II	61
Cassia fistulosa, L.	II	178
—— *Senna*, L.	II	179
Theobroma Cacao, L.	III	390
Convulsions.		
Valeriana officinalis, L.	I	64
Galium verum, L.	I	182
Datura Stramonium, L.	I	334
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Atropa Belladona, L.	I	340
Chenopodium Vulvaria, L.	I	418
Paris quadrifolia, L.	II	151
Thea Bohea, L.	II	408
Papaver somniferum, L.	II	393
Citrus Aurantium, L.	III	393
Viscum album, L.	IV	195
Convulsions des petits enfans.		
Pœonia officinalis, L.	II	420
Coqueluche.		
Paris quadrifolia, L.	II	152
Papaver Rhœas, L.	II	392
Ficus Carica, L.	IV	300
Lichen Islandicus, L.	IV	383
—— *pyxidatus*, L.	IV	389
—— *plicatus*, L.	IV	392
Coqueluche des petits enfans.		
Convolvulus Jalappa, L.	I	295
Cors.		
Sedum Anacampseros, L.	II	259
Sempervivum tectorum, L.	II	312
Coryza.		
Capsicum annuum, L.	I	349
Coups, *Voyez* Contusions.		
Crachement de sang, *Voyez* Hémoptysie.		
Crampe.		
Linum usitatissimum, L.	I	520

D.

	tom.	pag.
DANSE de St. Vite *ou* St. Weit, *ou* de St. Guy.		
Pœonia officinalis, L.	II	420
Cardamine pratensis, L.	III	176
Arnica montana, L.	III	554
Viscum album, L.	IV	195
Dartres.		
Maranta Galanga, L.	I	6
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Ribes rubrum, L.	I	379
Gentiana lutea, L.	I	431
—— *Centaurium*, L.	I	435
Laserpitium latifolium, L.	I	464
Angelica Archangelica, L.	I	469
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Sambucus Ebulus, L.	I	503
Linum usitatissimum, L.	I	520
Linum catharticum, L.	I	523
Allium Cepa, L.	II	29
Asparagus officinalis, L.	II	50
Rumex aquaticus, L.	II	82
Cassia Senna, L.	II	179
Saponaria officinalis, L.	II	231
Asarum Europæum, L.	II	289
Prunus Lauro-Cerasus, L.	II	331
Fragaria vesca, L.	II	364
Chelidonium majus, L.	II	390
Aconitum Napellus, L.	II	426
Helleborus niger, L.	II	465
Althæa officinalis, L.	III	238
Fumaria officinalis, L.	III	268
Astragalus Tragacantha, L.	III	364
Trigonella Fœnum-Græcum, L.	III	382
Leontodum Taraxacum, L.	III	434

	tom.	pag.
Cichorium intybus, L.	III	456
Arctium Lappa, L.	III	458
Eupatorium cannabinum, L.	III	467
Inula Helenium, L.	III	548
Calendula officinalis, L.	III	619
Buxus sempervirens, L.	IV	100
Xanthium Strumarium, L.	IV	106
Pinus sylvestris, L.	IV	137
Momordica Elaterium, L.	IV	160
Bryonia alba, L.	IV	166
Cannabis sativa, L.	IV	205
Smilax Salsaparilla, L.	IV	211
Ruscus aculeatus, L.	IV	234
Mimosa Nilotica, L.	IV	286
Polypodium vulgare, L.	IV	330
Dartres laiteuses.		
Lepidium sativum, L.	III	155
Débilité senile, *Voy.* Foiblesse senile.		
Défaillance.		
Lavandula Spica, L.	III	26
Démangeaisons.		
Imperatoria Ostruthium, L.	I	485
Sesamum Orientale, L.	III	130
Dépôts laiteux.		
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Papaver somniferum, L.	II	393
Marchantia polymorpha, L.	IV	373
Diarrhée.		
Amomum Zingiber, L.	I	4
——*Grana paradisi*, L.	I	4
Rasmarinus officinalis, L.	I	45
Scabiosa Succisa, L.	I	169
Trapa natans, L.	I	211
Symphytum officinale, L.	I	258
Lysimachia Nummularia, L.	I	282
Vinca minor, L.	I	398
Rhus Coriaria, L.	I	498
Oryza sativa, L.	II	78
Vaccinium Myrtillus, L.	II	119
Polygonum Bistorta, L.	II	141
—— *aviculare*, L.	II	144
Laurus Cassia, L.	II	156
Rheum Rhaponticum, L.	II	161
—— *Rhabarbarum*, L.	II	161
Pyrola rotundifolia, L.	II	213
Copaïfera officinalis, L.	II	216
Lythrum Salicaria, L.	II	293
Myrtus communis, L.	II	325
Cratægus Aria, L.	II	338
Sorbus aucuparia, L.	II	340
Mespilus Germanica, L.	II	342
Pyrus Cydonia, L.	II	346
Fragaria vesca, L.	II	364
Tormentilla erecta, L.	II	371
Nymphæa alba et lutea, L.	II	397
Delphinium Staphysagria, L.	II	425
Magnolia glauca, L.	II	436
Mentha crispa, L.	III	31
Fumaria officinalis, L.	III	268
Pterocarpus Draco, L.	III	277
Tanacetum vulgare, L.	III	500
Tussilago Petasites, L.	III	530
Achillea Millefolium, L.	III	582
Viola Ipecacuanha, L.	III	646
Fagus Castanea, L.	IV	130
Cucumis Colocynthis, L.	IV	163
Populus nigra, L.	IV	216
Atriplex hortensis, L.	IV	269
Lichen pulmonarius, L.	IV	384
Diarrhée bilieuse.		
Tamarindus Indica, L.	I	68
Vitis vinifera, L.	I	383
Astragalus Tragacantha, L.	III	364
Croton Cascarilla, L.	IV	147
Diarrhée chronique avec atonie.		
Prunus spinosa, L.	II	336
Potentilla Anserina, L.	II	365
Geum urbanum, L.	II	373

	tom.	pag.
Salix alba, L.	IV	189
Juniperus communis, L.	IV	231
Cytinus Hypocistis, L.	IV	43
Artemisia Absinthium, L.	III	505
Bryonia alba, L.	IV	465
Diathèse alkalescente.		
Hordeum distychon, L.	I	143
Fragaria vesca, L.	II	364
Difficulté de respirer, *Voyez* Dypsnée.		
Digestion laborieuse.		
Vinca minor, L.	I	398
Thea Bohea, L.	II	408
Magnolia glauca, L.	II	436
Satureia hortensis, L.	III	20
Cochlearia Armoracia, L.	III	162
Douleurs.		
Fagara octandra, L.	I	206
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Papaver somniferum, L.	II	393
Sesamum Orientale, L.	III	180
Cheiranthus Cheiri, L.	III	184
Populus balsamifera, L.	IV	216
Douleurs astéoscopes.		
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Smilax Salsaparilla, L.	IV	211
Douleurs des dents, *Voy.* Odontalgie.		
Douleurs d'estomac, *Voy.* Cardialgie.		
Douleurs des mamelles.		
Conium maculatum, L.	I	455
Douleurs de tête, *Voy.* Céphalalgie.		
Douleurs hémorrhoïdales, *Voyez* Hémorrhoïdes.		
Douleurs sciatiques.		
Aconitum Napellus, L.	II	426

	tom.	pag.
Dypsnée.		
Chenopodium Botrys, L.	I	417
Pimpinella Saxifraga, L.	I	494
Dyssenterie.		
Olea Europæa, L.	I	20
Crocus sativus, L.	I	74
Plantago Psylium, L.	I	198
—— *Cynops*, L.	I	199
Alchemilla vulgaris, L.	I	218
Cynoglossum officinale, L.	I	255
Symphytum officinale, L.	I	258
Plumbago Europæa, L.	I	288
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Atropa Belladona, L.	I	340
Strychnos Nux-vomica, L.	I	351
Heracleum Sphondylium, L.	I	466
Rhus Coriaria, L.	I	498
Linum usitatissimum, L.	I	520
Oryza sativa, L.	II	78
Vaccinium Myrtillus, L.	II	119
Polygonum Bistorta, L.	II	141
—— *aviculare*, L.	II	144
Rheum Rhabarbarum, L.	II	161
Sempervivum tectorum, L.	II	312
Potentilla Anserina, L.	II	365
Tormentilla erecta, L.	II	371
Geum urbanum, L.	II	372
Papaver Rhœas, L.	II	392
Magnolia glauca, L.	II	436
Geranium moschatum, L.	III	223
Althæa officinalis, L.	III	237
Malva rotundifolia, L.	III	241
Pterocarpus-Draco, L.	III	277
Trifolium Melilotus officinale, L.	III	369
Tragopogon pratense, L.	III	420
Artemisia Abrotanum, L.	III	505
Inula dysenterica, L.	III	549
Viola Ipecacuanha, L.	III	646
Orchys bifolia, L.	IV	6
—— *Morio*, L.	IV	8
Cynomorium coccineum, L.	IV	70

	tom.	pag.
Phyllanthus Emblica, L.	IV	94
Croton Cascarilla, L.	IV	147
Bryonia alba, L.	IV	166
Populus nigra, L.	IV	216
Rhodiola rosea, L.	IV	218
Parietaria officinalis, L.	IV	267
Ficus Carica, L.	IV	300
Dyssenterie chronique.		
Lythrum Salicaria, L.	II	293
Dyssenterie épidémique.		
Tamarindus Indica, L.	I	68
Dysurie.		
Ilex Aquifolium, L.	I	223
Physalis Alkekengi, L.	I	342
Ulmus campestris, L.	I	426
Apium Petroselinum, L.	I	496
Linum usitatissimum, L.	I	520
Berberis vulgaris, L.	II	73
Nymphæa lutea et alba, L.	II	397
Althæa officinalis, L.	III	238
Malva rotundifolia, L.	III	241
Glycyrrhiza glabra, L.	III	336
Astragalus Tragacantha, L.	III	364
Trifolium Melilotus officinale, L.	III	369
Tragopogon pratense, L.	III	420
Cissampelos Pareira, L.	IV	235
Atriplex hortensis, L.	IV	269
Dysurie spasmodique.		
Matricaria Chamomilla, L.	III	570
Dysurie hémorrhoïdale.		
Crocus sativus, L.	I	74

E.

	tom.	pag.
ÉCHIMOSE.		
Crocus sativus, L.	I	74
Hyssopus officinalis, L.	III	22
Éclampsie des enfans, *Voy.* Convulsions des enfans.		
Écoulemens blancs, *Voyez* Fleurs blanches.		
Écrouelles, *Voy.* Scrophules.		
Embonpoint excessif, *Voyez* Obésité.		
Empâtemens du foie, *Voyez* Obstructions du foie.		
—— de la rate, *V.* Obstructions de la rate.		
—— du mésentère, *Voyez* Obstructions du mésentère.		
—— des viscères, *Voy.* Obstructions des viscères.		
Engorgemens glanduleux.		
Ononis arvensis, L.	III	295
Engorgemens laiteux des mamelles.		
Bubon Macedonicum, L.	I	474
Engorgemens du foie, *Voyez* Obstructions du foie.		
—— de la rate, *Voyez* Obstructions de la rate.		
—— du mésentère, *Voyez* Obstructions du mésentère.		
—— des viscères, *Voy.* Obstructions des viscères.		
Enrouement.		
Saccharum officinarum, L.	I	102
Erysimum officinale, L.	III	182
Glycyrriza glabra, L.	III	335
Astragalus Tragacantha, L.	III	364

	tom.	pag.
Ceratonia Siliqua, L.	IV	229
Entérite, *Voy.* Inflammations des intestins.		
Épaississement de la lymphe.		
Bubon Macedonicum, L.	I	474
Saponaria officinalis, L.	II	231
Smilax Salsaparilla, L.	IV	211
Épaississemens cachectiques froids, *Voyez* Écrouelles ou Scrophules.		
Épilepsie.		
Valeriana officinalis, L.	I	64
Datura Stramonium, L.	I	334
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Atropa Belladona, L.	I	340
Sambucus Ebulus, L.	I	503
Lilium candidum, L.	II	31
Convallaria majalis, L.	II	53
Laurus Camphora, L.	II	156
Dictamnus albus, L.	II	186
Ruta graveolens, L.	II	187
Papaver somniferum, L.	II	393
Tilia Europœa, L.	II	403
Poeonia officinalis, L.	II	420
Veratrum album, L.	IV	252
Épizootie.		
Helleborus niger, L.	II	464
Érisipèle.		
Betula alba, L.	IV	97
Esquinancie, *Voy.* Angine.		
Esquinancie catarrale, *Voyez* Angine catarrale.		
Exostoses fausses.		
Daphne Mezereum, L.	II	132
—— *Laureola*, L.	II	133
Exanthème.		
Asperula odorata, L.	I	178
Galium verum, L.	I	182
Guilandina Moringa, L.	II	183
Aquilegia vulgaris, L.	II	430
Viola odorata, L.	III	643

F.

	tom.	pag.
Fièvres.		
Alchemilla vulgaris, L.	I	218
Æsculus Hippocastanum, L.	II	95
Punica Granatum, L.	II	328
Pyrus Malus, L.	II	345
Rubus-Chamæ-Morus, L.	II	363
Fragaria vesca, L.	II	364
Malva rotundifolia, L.	III	241
Viola Ipecacuanha, L.	III	646
Fièvres ardentes.		
Portulaca oleracea, L.	II	291
Fièvres bilieuses.		
Tamarindus Indica, L.	I	68
Berberis vulgaris, L.	II	73
Morus nigra, L.	IV	105
Ricinus communis, L.	IV	153
Fièvres catarrales.		
Citrus Aurantium, L.	III	393
Artemisia glacialis, L.	III	504
Fièvres exanthématiques.		
Dorstenia Drakœna, L.	I	212
Ribes nigrum, L.	I	379
Ledum palustre, L.	II	206
Aristolochia Serpentaria, L.	IV	39
Fièvres hémitritées.		
Angelica Archangelica, L.	I	469
Fièvres hectiques des enfans.		
Rheum Rhabarbarum, L.	II	161
Copaïfera officinalis, L.	II	216
Fièvres inflammatoires.		
Tamarindus Indica, L.	I	68
Ribes rubrum, L.	I	379

	tom.	pag.
Berberis vulgaris, L.	II	73
Vaccinium Vitis-idæa, L.	II	121
Papaver somniferum, L.	II	393
Morus nigra, L.	IV	105
Fièvres intermittentes.		
Maranta Galanga, L.	I	6
Curcuma longa, L.	I	7
Rosmarinus officinalis, L.	I	45
Cuscuta Europæa, L.	I	221
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Cinchona officinalis, L.	I	318
Capsicum annuum, L.	I	349
Strychnos Nux vomica, L.	I	351
Ulmus campestris, L.	I	426
Gentiana lutea, L.	I	431
Angelica Archangelica, L.	I	469
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Imperatoria Struthium, L.	I	485
Apium graveolens, L.	I	497
Linum usitatissimum, L.	I	523
Allium sativum, L.	II	26
Quassia amara, L.	II	196
Prunus spinosa, L.	II	336
Tormentilla erecta, L.	II	371
Geum urbanum, L.	II	372
Papaver somniferum, L.	II	393
Magnolia glauca, L.	II	436
Anemone Pulsatilla, L.	II	441
Teucrium Scordium, L.	III	16
Teucrium Chamædris, L.	III	16
Genista tinctoria, L.	III	285
Citrus medica, L.	III	392
Tanacetum vulgare, L.	III	499
Artemisia glacialis, L.	III	504
— *Absinthium*, L.	III	505
Arnica montana, L.	III	554
Matricaria Parthenium, L.	III	569
— *Chamomilla*, L.	III	570
Anthemis Cotula, L.	III	576
— *Pyrethrum*,	III	577
Aristolochia rotunda, L.	IV	39
Arum maculatum, L.	IV	48
Buxus sempervirens, L.	IV	100
Salix alba, L.	IV	188
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Fièvres intermittentes rebelles.		
Aloë perfoliata, L.	I	61
Geum rivale, L.	II	373
Fièvres intermittentes vernales.		
Carum Carvi, L.	I	493
Fièvres intermittentes quartes.		
Maranta Galanga, L.	I	6
Cuscuta Europæa, L.	I	221
Convolvulus Scammonia, L.	I	202
Strychnos colubrina, L.	I	351
Rhamnus Frangula, L.	I	364
Gentiana Centaurium, L.	I	435
Eryngium campestre, L.	I	439
Chelidonium majus, L.	II	390
Cambogia Gutta, L.	II	395
Helleborus niger, L.	II	464
Teucrium Chamædrys, L.	III	16
Cochlearia Armoracia, L.	III	162
Citrus medica, L.	III	392
Leontodum Taraxacum, L.	III	434
Centaurea Calcitrapa, L.	III	609
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Veratrum album, L.	IV	252
Fièvres intermittentes quartes automnales.		
Mirabilis dichotoma, L.	I	329
Centaurea benedicta, L.	III	608
Fièvres intermittentes tierces.		
Piper nigrum, L.	I	54
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Gentiana Centaurium, L.	I	435
Ferula Assa-fœtida, L.	I	463
Laserpitium latifolium, L.	I	464
Æthusa Meum, L.	I	480
Imperatoria Ostruthium, L.	I	485
Pastinaca sativa, L.	I	489

	tom.	pag.
Anethum Fœniculum, L.	I	492
Fumaria bulbosa, L.	III	267
Citrus mediva, L.	III	392
Leontodon Taraxacum, L.	III	434
Centaurea benedicta, L.	III	608
— *Calcitrapa*, L.	III	609
Croton Cascarilla, L.	IV	147
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Fièvres intermittentes doubles tierces.		
Centaurea Calcitrapa, L.	III	609
Fièvres lentes.		
Dorstenia Drakæna, L.	I	212
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Fièvres malignes.		
Dorstenia Drakæna, L.	I	212
Calamus aromaticus, L.	II	65
Dianthus Caryophyllus, L.	II	235
Arum maculatum, L.	IV	48
Fièvres miliaires.		
Tussilago Petasites, L.	III	530
Fièvres nerveuses.		
Dorstenia Drakæna, L.	I	212
Epidendrum Vanilla, L.	IV	24
Fièvres putrides.		
Tamarindus Indica, L.	I	68
Avena sativa, L.	I	135
Ophiorrhiza Mungos, L.	I	285
Ribes rubrum, L.	I	379
Berberis vulgaris, L.	II	73
Vaccinium Vitis-Idæa, L.	II	121
Teucrium Scordium, L.	III	16
Arnica montana, L.	III	554
Morus nigra, L.	IV	105
Fièvres remittentes.		
Cinchona officinalis, L.	I	318
Vaccinium Vitis-Idæa, L.	II	121
Punica Granatum, L.	II	326
Tussilago Petasites, L.	III	530
Arnica montana, L.	III	554
Centaurea benedicta, L.	III	608
Aristolochia Serpentaria, L.	IV	39
Fièvres remittentes avec redoublement.		
Croton Cascarilla, L.	IV	146
Fièvres scarlatines.		
Tussilago Petasites,	III	531
Fièvres soporeuses.		
Centaurea benedicta, L.	III	608
Fièvres synoques inflammatoires.		
Punica Granatum, L.	II	326
Parietaria officinalis, L.	IV	267
Fistule.		
Atropa Belladona, L.	I	340
Flaccidité des seins.		
Alchemilla vulgaris, L.	I	218
Flatuosités.		
Imperatoria Ostruthium, L.	I	435
Achillea Mill folium, L.	III	532
Fleurs blanches.		
Rosmarinus officinalis, L.	I	45
Scabiosa Succisa, L.	I	169
Alchemilla vulgaris, L.	I	218
Lysimachia Nummularia, L.	I	281
Conium maculatum, L.	I	455
Æthusa Meum, L.	I	480
Sambucus Ebulus, L.	I	503
Tamarix Gallica, L.	I	507
Laurus Cinnamonum, L.	II	153
Rheum Rhabarbarum, L.	II	161
— *Rhaponticum*, L.	II	161
Guaiacum officinale, L.	II	184
Quassia amara, L.	II	196
Copaifera officinalis, L.	II	216
Saponaria officinalis, L.	II	231
Myrtus communis, L.	II	325
Prunus spinosa, L.	II	336
Rosa centifolia, L.	II	359
Fragaria vesca, L.	II	364
Potentilla Anserina, L.	II	363
Bixa Orellana, L.	II	398
Mentha crispa, L.	III	31

	tom.	pag.
Sisymbrium Sophia, L.	III	180
Pterocarpus Draco, L.	III	277
Spilanthus Acmella, L.	III	478
Santolina-Chamæ-Cyparissus, L.	III	495
Viola Ipecacuanha, L.	III	646
Cytinus Hypocistis, L.	IV	43
Momordica Elaterium, L.	IV	160
Rhodiola rosea, L.	IV	218
Equisetum arvense, L.	IV	308
Lichen pulmonarius, L.	IV	384
Fluxion catarrale.		
Pinus sylvestris, L.	IV	137
Fluxion pituiteuse.		
Santalum album, L.	I	214
Foiblesse.		
Gentiana lutea, L.	I	431
Statice Limonium, L.	I	517
Laurus Cinnamomum, L.	II	155
Caryophyllus aromaticus, L.	II	409
Foiblesse d'estomac.		
Quassia amara, L.	II	196
Mentha crispa, L.	III	
Inula Helenium, L.	III	
Foiblesse de mémoire.		
Melissa officinalis, L.	III	
Foiblesse habituelle.		
Andropogon Nardus, L.	IV	
Foiblesse dans les convalescences.		
Salvia officinalis, L.	I	46
Foiblesse de la vue.		
Valeriana officinalis, L.	I	64
Euphrasia officinalis, L.	III	
Foiblesse des viscères.		
Salvia officinalis, L.	I	46
Anchusa tinctoria, L.	I	254
Foiblesse sénile.		
Cinchona officinalis, L.	I	318
Folie.		
Datura Stramonium, L.	I	334
Paris quadrifolia, L.	II	152
Fureur utérine.		
Salvia officinalis, L.		

G.

	tom.	pag.
GALE.		
Curcuma longa, L.	I	7
Salicornia herbacea, L.	I	9
Asperula odorata, L.	I	178
Galium verum, L.	I	182
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Rhamnus catharticus, L.	I	362
—— *Frangula*, L.	I	364
Ribes rubrum, L.	I	379
Ulmus campestris, L.	I	426
Gentiana lutea, L.	I	431
—— *Centaurium*, L.	I	435
Conium maculatum, L.	I	455
Sambucus Ebulus, L.	I	503
Rumex aquaticus, L.	II	82
Laurus Sassafras, L.	II	158
Guilandina Moringa, L.	II	183
Guaïacum officinale, L.	II	184
Ruta graveolens, L.	II	187
Ledum palustre, L.	II	206
Saponaria officinalis, L.	II	231
Asarum Europæum, L.	II	280
Fragaria vesca, L.	II	364
Actæa spicata, L.	II	388
Aquilegia vulgaris, L.	II	430
Clematis erecta, L.	II	447
Scrophularia nodosa, L.	III	101
Linnæa Borealis, L.	III	123
Fumaria officinalis, L.	III	268
Lupinus albus, L.	III	303
Astragalus Tragacantha, L.	III	364
Leontodon Taraxacum, L.	III	434
Arctium Lappa, L.	III	458
Carlina acaulis, L.	III	473
Inula Helenium, L.	III	548
—— *dysenterica*, L.	III	550

	tom.	pag.
Buxus sempervirens, L.	IV	100
Xanthium Strumarium, L.	IV	107
Pinus sylvestris, L.	IV	137
Myrica Gale, L.	IV	197
Cannabis sativa, L.	IV	205
Smilax Salsaparilla, L.	IV	211
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Ruscus aculeatus, L.	IV	234
Veratrum album, L.	IV	252
Mimosa Nilotica, L.	IV	286
Gâle rebelle.		
Convolvulus Scammonia, L.	I	292
Gâle répercutée.		
Betula alba, L.	IV	
Gangrène.		
Cinchona officinalis, L.	I	318
Ferula Assa-fœtida, L.	I	463
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Chærophyllum sylvestre, L.	I	484
Laurus Camphora, L.	II	156
Quassia amara, L.	II	196
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Gonorrhée.		
Strychnos Nux vomica, L.	I	350
Conium maculatum, L.	I	455
Amyris Opobalsamum, L.	II	115
Laurus Camphora, L.	II	156
Rheum Rhabarbarum, L.	II	161
Toluifera Balsamum, L.	II	188
Copaïfera officinalis, L.	II	216
Nymphæa lutea et alba, L.	II	397
Althæa officinalis, L.	III	237
Malva rotundifolia, L.	III	241
Ricinus communis, L.	IV	153
Cucumis Colocynthis,	IV	163
Pistacia vera, L.	IV	199
Cissampelos Pareira, L.	IV	235
Equisetum arvense, L.	IV	308
Gonorrhée chronique.		
Pterocarpus Draco, L.	I	350
Momordica Elaterium, L.	IV	160

	tom.	pag.
Goutte.		
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Convolvulus Scammonia, L.	I	292
Physalis Alkekengi, L.	I	342
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Rhamnus catharticus, L.	I	362
Linum usitatissimum, L.	I	520
Laurus Sassafras, L.	II	158
Guaïacum officinale, L.	II	184
Quassia amara, L.	II	196
Saponaria officinalis, L.	II	231
Rubus Chamæ-Morus, L.	II	363
Fragaria vesca, L.	II	364
Aconitum Napellus, L.	II	426
Clematis erecta, L.	II	
Teucrium Chamædris, L.	III	16
Digitalis purpurea, L.	III	105
Cochlearia Armoracia, L.	III	162
Arctium Lappa, L.	III	458
Spilanthus Acmella, L.	III	478
Tanacetum vulgare, L.	III	499
Artemisia Absinthium, L.	III	503
Morus nigra, L.	IV	105
Pinus sylvestris, L.	IV	137
Viscum album, L.	IV	195
Pistacia Lentiscus, L.	IV	200
Smilax Salsaparilla, L.	IV	211
Populus nigra, L.	IV	216
Polypodium vulgare, L.	IV	330
— *Filix mas*, L.	IV	334
Goutte sereine.		
Iris tuberosa, L.	I	82
Euphorbia officinarum, L.	II	300
— *palustris*,	II	310
Aconitum Napellus, L.	II	426
Ocymum Basilicum, L.	III	67
Arnica montana, L.	III	554
Aristolochia rotunda,	IV	39
Gravelle.		
Daucus Carota, L.	I	452
Athamanta Cretensis, L.	I	458

	tom.	pag.
H.		
HÉMOPTYSIE.		
Valeriana officinalis, L.	I	64
Pulmonaria officinalis, L.	I	257
Symphytum officinale, L.	I	258
Verbascum Thapsus, L.	I	331
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Ulmus campestris, L.	I	426
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Vaccinium Myrtillus, L.	II	120
Nymphæa lutea et alba, L.	II	397
Urtica dioïca, L.	IV	102
Mimosa Nilotica, L.	IV	286
Lichen Islandicus, L.	IV	383
—— *Pulmonarius*, L.	IV	384
Hémorrhagie.		
Trapa natans, L.	I	211
Verbascum Thapsus, L.	I	331
Tormentilla erecta, L.	II	371
Geum rivale, L.	II	373
Dixa Orellana, L.	II	398
Geranium Robertianum, L.	III	227
Achillea Millefolium, L.	III	582
Urtica dioïca, L.	IV	102
Equisetum arvense, L.	IV	308
Lycoperdon Bovista, L.	IV	420
Hémorrhagie avec atonie.		
Potentilla Anserina, L.	II	365
Hémorrhagie du nez.		
Statice Limonium, L.	I	517
Hémorrhagie habituelle.		
Lysimachia Nummularia, L.	I	281
Hémorrhagie par section des vaisseaux.		
Boletus igniarius, L.	IV	413
Hémorrhagie utérine.		
Geum urbanum, L.	II	372
Viola Ipecacuanha, L.	III	646
Hémorrhoïdes.		
Verbascum Thapsus, L.	I	331
Datura Stramonium, L.	I	334
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Solanum nigrum, L.	I	346
Rhamnus Catharticus, L.	I	362
—— *Frangula*, L.	I	364
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Sempervivum tectorum, L.	II	312
Pyrus Cydonia, L.	II	346
Helleborus niger, L.	II	465
Scrophularia nodosa, L.	III	101
Althæa officinalis, L.	III	238
Theobroma Cacao, L.	III	390
Antirrhinum Linaria, L.	III	95
Cynomorium coccineum, L.	IV	70
Ricinus communis, L.	IV	152
Atriplex hortensis, L.	IV	269
Hernie.		
Herniaria glabra, L.	I	414
Hernie étranglée.		
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Linum usitatissimum, L.	I	520
Hoquet.		
Maranta Galanga, L.	I	6
Anethum graveolens, L.	I	491
Ruta graveolens, L.	II	187
Humeurs visqueuses.		
Amomum Zingiber, L.	I	4
——*Grana paradisi*, L.	I	4
Hydrophobie, *Voyez* Rage.		
Hydropisie.		
Curcuma Longa, L.	I	7
Gratiola officinalis, L.	I	35
Iris Florentina, L.	I	79
— *fœtidissima*, L.	I	80
Saccharum officinarum, L.	I	102
Convolvulus Scammonia, L.	I	292
—— *Turpethum*, L.	I	294
—— *Jalapa*, L.	I	295

	tom.	pag.
Convolvulus Pes capræ, L.	I	298
Mirabilis dichotoma, L.	I	329
Physalis Alkekengi, L.	I	342
Rhamnus catharticus, L.	I	362
——— *Frangula*, L.	I	364
Asclepias Vincetoxicum, L.	I	411
Herniaria glabra, L.	I	414
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Sambucus Ebulus, L.	I	503
Allium sativum, L.	II	26
——— *Cepa*, L.	II	29
Scilla maritima, L.	II	43
Colchicum autumnale, L.	II	89
Polygonum Hydropiper, L.	II	143
Laurus Sassafras, L.	II	158
Asarum Europæum, L.	II	280
Euphorbia officinarum, L.	II	300
——— *Lathyris*, L.	II	305
——— *Palustris*, L.	II	310
Chelidonium majus, L.	II	390
Cambogia Gutta, L.	II	393
Antirrhinum Linaria, L.	III	95
Lepidium sativum, L.	III	155
Cochlearia officinalis, L.	III	161
Sinapis nigra, L.	III	198
Genista tinctoria, L.	III	285
Spilanthus Acmella, L.	III	478
Tanacetum vulgare, L.	III	499
Artemisia Absinthium, L.	III	503
Momordica Elaterium, L.	IV	160
Bryonia alba, L.	IV	166
Juniperus communis, L.	IV	231
Cissampelos Pareira, L.	IV	235
Ruscus aculeatus, L.	IV	238
Hydropysie ascite.		
Olea Europæa, L.	I	20
Tamarindus Indica, L.	I	68
Ulmus campestris, L.	I	426
Hydropisie de poitrine.		
Cochlearia Armoracia, L.	III	162
Hypocondrie.		
Borrago officinalis, L.	I	261
Gentiana Centaurium, L.	I	435
Eryngium campestre, L.	I	439
Carum Carvi, L.	I	493
Pimpinella Anisum, L.	I	495
Tamarix Gallica, L.	I	507
Aloë perfoliata, L.	II	61
Rheum Rhabarbarum, L.	II	161
Quassia amara, L.	II	196
Capparis spinosa, L.	II	385
Tilia Europæa, L.	II	403
Helleborus niger, L.	II	465
Teucrium Marum, L.	III	14
Mentha crispa, L.	III	31
Molucella lævis, L.	III	51
Melissa officinalis, L.	III	60
Cochlearia officinalis, L.	III	161
Fumaria officinalis, L.	III	268
Theobroma Cacao, L.	III	390
Tragopogon pratense, L.	III	420
Scorsonera humilis, L.	III	423
Lactuca virosa, L.	III	430
Cichorium intybus, L.	III	456
Artemisia Abrotanum, L.	III	502
——— *Absinthium*, L.	III	503
Inula Helenium, L.	III	548
Arnica montana, L.	III	554
Anthemis nobilis, L.	III	576
Achillea Millefolium, L.	III	582
Hydrocèle.		
Ononis arvensis, L.	III	295
Hystéricie.		
Amomum Zingiber, L.	I	4
———*Grana paradisi*, L.	I	4
Kempferia rotunda, L.	I	7
Rosmarinus officinalis, L.	I	45
Valeriana officinalis, L.	I	64
——— *Celtica*, L.	I	65
Iris fœtidissima, L.	I	80
Fagara octandra, L.	I	206
Cinchona officinalis, L.	I	318
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Chenopodium Botrys, L.	I	417
——— *Vulvaria*, L.	I	418
Ferula Assa fœtida, L.	I	463
Ligusticum Levisticum, L.	I	468
Bubon Galbanum, L.	I	474

	tom.	pag.
Cuminum Cyminum, L.	I	475
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Imperatoria Ostruthium, L.	I	485
Carum Carvi, L.	I	493
Pimpinella Saxifraga, L.	I	494
——— *Anisum*, L.	I	495
Allium sativum, L.	II	26
Laurus Camphora, L.	II	156
Ruta graveolens, L.	II	187
Tilia Europæa, L.	II	403
Nepeta Cataria, L.	III	23
Mentha crispa, L.	III	31
Betonica officinalis, L.	III	39
Marrubium vulgare, L.	III	46
Melissa officinalis, L.	III	60
Carlina acaulis, L.	III	473
Tanacetum vulgare, L.	III	499
——— *Balsamita*, L.	III	500
Matricaria Parthenium, L.	III	569
Anthemis Cotula, L.	III	576
——— *nobilis*, L.	III	576
Achillea Millefolium, L.	III	582
Populus balsamifera, L.	IV	216
Rhodiola rosea, L.	IV	217
Asplenium Scolopendrium, L.	IV	325
Hypersarcose.		
Salicornia herbacea, L.	I	9

I.

Ictère, *Voy.* Jaunisse.		
Ictère chronique.		
Chelidonium majus, L.	II	390
Impuissance.		
Allium Porrum, L.	II	24
Inappétance.		
Cinchona officinalis, L.	I	318
Capsicum annuum, L.	I	349
Laurus nobilis, L.	II	157
Satureia hortensis, L.	III	20
Matricaria Parthenium, L.	III	570
Inflammations.		
Avena sativa, L.	I	135
Papaver somniferum, L.	II	393
Malva rotundifolia, L.	III	241
Parietaria officinalis, L.	IV	267
Inflammation des amygdales.		
Malva rotundifolia, L.	III	239
Inflammation des bourses.		
Paris quadrifolia, L.	II	151
Inflammation de l'estomac.		
Linum usitatissimum, L.	I	520
Inflammation des voies urinaires.		
Mimosa Nilotica, L.	III	286
Inflammation de la gorge.		
Linum usitatissimum, L.	I	520
Agrimonia Eupatoria, L.	II	296
Inflammation des intestins.		
Olea Europæa, L.	I	20
Linum usitatissimum, L.	I	520
Trifolium Melitotus officinale, L.	III	368
Inflammation des reins et de la vessie.		
Parietaria officinalis, L.	IV	267
Inflammation des yeux, *Voyez* Ophthalmie.		
Inflammation laiteuse des mamelles.		
Atropa Belladona, L.	I	340
Insomnie.		
Anethum graveolens, L.	I	491

	tom.	pag.
Papaver somniferum, L.	II	393
—— *Rhœas*, L.	II	392
Ischurie.		
Linum usitatissimum, L.	I	520
Raphanus sativus, L.	III	200
Spilanthus Acmella, L.	III	478

J.

Jaunisse.		
Curcuma longa, L.	I	7
Tamarindus Indica, L.	I	68
Crocus sativus, L.	I	74
Asperula odorata, L.	I	178
Galium verum, L.	I	182
Rubia Tinctorum, L.	I	186
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Gentiana Centaurium, L.	I	435
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Apium Petroselinum, L.	I	496
Scilla maritima, L.	II	43
Asparagus officinalis, L.	II	50
Aloë perfoliata, L.	II	61
Rheum Rhabarbarum, L.	II	161
Saponaria officinalis, L.	II	231
Sedum acre, L.	II	261
Actæa spicata, L.	II	388
Cambogia Gutta, L.	II	396
Matrubium vulgare, L.	III	46
Antirrhinum Linaria, L.	III	95
Polygala vulgaris, L.	III	271
Lactuca virosa, L.	III	430
Leontodon Taraxacum, L.	III	434
Cichorium intybus, L.	III	456
Santolina Chamæ-Cyparissus, L.	III	495
Arnica montana, L.	III	554
Centaurea benedicta, L.	III	608
Calendula officinalis, L.	III	619
Cissampelos Pareira, L.	IV	235
Marchantia polymorpha, L.	IV	373

L.

Larmoiement.		
Convallaria majalis, L.	II	52
Laxités.		
Punica Granatum, L.	II	326
Rosa canina, L.	II	360
Lèpre.		
Ledum palustre, L.	II	206
Digitalis purpurea, L.	III	105
Leontodon Taraxacum, L.	III	434
Léthargie.		
Sinapis nigra, L.	III	198
Leucophlegmatie.		
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Mirabilis dichotoma, L.	I	329
Allium Cepa, L.	II	29
Colchicum autumnale, L.	II	89
Teucrium Scordium, L.	III	16
Mentha crispa, L.	III	31
Thymus vulgaris, L.	III	57
Eupatorium cannabinum, L.	III	487
Santolina Chamæ-Cyparissus, L.	III	495
Artemisia Absinthium, L.	III	505
Juniperus communis, L.	IV	231
Ruscus aculeatus, L.	IV	238
Lienterie.		
Rheum Rhabarbarum, L.	II	161
Capparis spinosa, L.	II	385
Artemisia Abrotanum, L.	III	505
Lochies supprimées.		
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Artemisia vulgaris, L.	III	506
Matricaria Parthenium, L.	III	569

M.

Mal de tête.		
Verbena officinalis, L.	I	41
Maladies acrimonieuses.		
Avena sativa, L.	I	135
Daphne Mezereum, L.	I	132
—— *Laureola*, L.	I	133
Phaseolus vulgaris, L.	III	305

	tom.	pag.
Maladies aiguës.		
Avena sativa, L.	I	135
Hordeum distychon, L.	I	143
Angelica Archangelica, L.	I	469
Vaccinium Vitis-Idæa, L.	II	121
Cassia fistulosa, L.	II	178
Prunus domestica, L.	II	334
Pyrus Malus, L.	II	345
Teucrium Scordium, L.	III	16
Citrus medica, L.	III	392
Maladies ardentes.		
Avena sativa, L.	I	135
Maladies articulaires.		
Iris tuberosa, L.	I	82
Maladies bilieuses, *Voyez* Bile.		
Maladies chroniques.		
Convolvulus Scammonia, L.	I	292
——— *Turpethum*, L.	I	294
Angelica Archangelica, L.	I	469
Pœonia officinalis, L.	II	420
Teucrium Scordium, L.	III	16
Juniperus communis, L.	IV	231
Maladies contagieuses.		
Costus Arabicus, L.	I	5
Laurus Camphora, L.	II	156
Dianthus Caryophyllus, L.	II	235
Hibiscus Abelmoschus, L.	III	252
Maladies convulsives.		
Datura Stramonium, L.	I	334
Citrus medica, *Aurantium*, L.	III	393
Maladies de la peau.		
Scabiosa Succisa, L.	I	169
Gentiana lutea, L.	I	431
Ulmus campestris, L.	I	426
Eryngium campestre, L.	I	439
Imperatoria Struthium, L.	I	485
Allium sativum, L.	II	26
Aloë perfoliata, L.	II	61
Laurus Sassafras, L.	II	158
Asarum Europæum, L.	II	280
Fumaria officinalis, L.	III	268
Betula alba, L.	IV	98
Cannabis sativa, L.	IV	206
Humulus Lupulus, L.	IV	206
Populus nigra, L.	IV	216
Polypodium vulgare, L.	IV	330
Maladies inflammatoires, *Voyez* Inflammations.		
Maladies nerveuses.		
Chenopodium Vulvaria, L.	I	418
Nepeta Cataria, L.	III	23
Maladies pétéchiales.		
Hibiscus Abelmoschus, L.	III	252
Maladies putrides, *Voy.* Fièvres putrides.		
Manie.		
Datura Stramonium, L.	I	334
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Paris quadrifolia, L.	II	151
Laurus Camphora, L.	II	156
Papaver somniferum, L.	II	393
Veratrum album, L.	IV	252
Marasme.		
Hordeum distychon, L.	I	143
Sesamum Orientale, L.	III	130
Cicas circinnalis, L.	IV	310
Mélancolie.		
Anchusa officinalis, L.	I	254
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Anagallis arvensis, L.	I	283
Laurus Camphora, L.	II	156
Asarum Europæum, L.	II	280
Helleborus niger, L.	II	464
Carlina acaulis, L.	III	473
Tanacetum Balsamita, L.	III	499
Epidendrum Vanilla, L.	IV	24
Cucumis Colocynthis, L.	IV	163
Polypodium Filix mas, L.	IV	334
Meurtrissures.		
Phellandrium aquaticum, L.	I	477

	tom.	pag.
Migraine.		
Valeriana officinalis, L.	I	64
Vinca minor, L.	I	398
Peucedanum officinale, L.	I	459
Matricaria Parthenium, L.	III	569
Anthemis nobilis, L.	III	576
Miséréré.		
Linum usitatissimum, L.	I	520
Ricinus communis, L.	IV	153
Menstruation difficile, *Voy.* Règles difficiles.		
Mois retenus, *Voyez* Règles retenues.		
Morsure des animaux enragés.		
Olea Europæa, L.	I	20
Morsures des animaux venimeux.		
Olea Europæa, L.	I	20
Ophiorrhiza Mungos, L.	I	385
Strychnos colubrina, L.	I	351
Ribes nigrum, L.	I	379
Linum usitatissimum, L.	I	520
Polygala Senega, L.	III	273
Aristolochia Serpentaria, L.	IV	39

N.

Nausées.		
Kæmpferia rotunda, L.	I	8
Pyrus Cydonia, L.	II	346
Néphrétique, *Voy.* Colique néphrétique.		
Néphrétique graveleuse.		
Arbutus Uva-ursi, L.	II	212
Nouûre, *Voyez* Rachitis.		

O.

Obésité.		
Coffæa Arabica, L.	I	320
Thea Bohea, L.	II	408
Betula alba, L.	IV	97
Obstructions.		
Aloë perfoliata, L.	II	61
Capparis spinosa, L.	II	385
Sisymbrium Nasturtium, L.	III	177
Ononis arvensis, L.	III	294
Buxus sempervirens, L.	IV	100
Obstructions commençantes.		
Helleborus niger, L.	II	464
Cissampelos Pareira, L.	IV	235
Obstructions du foie.		
Vitis vinifera, L.	I	383
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Cicuta virosa, L.	I	478
Asarum Europæum, L.	II	280
Calendula officinalis, L.	IV	618
Obstructions de la rate.		
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Cicuta virosa, L.	I	478
Asarum Europæum, L.	II	280
Calendula officinalis,	IV	618
Obstructions du Mésentère.		
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Asarum Europæum, L.	II	280
Chelidonium majus, L.	II	390
Obstructions des viscères.		
Triticum repens, L.	I	147
Cuscuta Europæa, L.	I	221
Anchusa officinalis, L.	I	255
Cyclamen Europæum, L.	I	276
Gentiana lutea, L.	I	431
Eryngium campestre, L.	I	439
Colchicum autumnale, L.	II	89
Saponaria officinalis, L.	II	231
Sedum acre, L.	II	265
Euphorbia Officinarum, L.	II	309
—— *palustris*, L.	II	310

	tom.	pag.
Pœonia officinalis, L.	II	420
Marrubium vulgare, L.	III	46
Leontodon Taraxacum, L.	III	434
Santolina Chamœ-Cyparissus,	III	495
Tanacetum vulgare, L.	III	498
Matricaria Chamomilla, L.	III	570
Centaurea benedicta, L.	IV	608
Mercurialis annua, L.	IV	219
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Polypodium Filix fœmina, L.	IV	334
Adianthum Capillus Veneris, L.	IV	339
Obstructions des viscères avec atonie.		
Lichen Islandicus, L.	IV	383
Odontalgie.		
Plumbago Europæa, L.	I	288
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Guaiacum officinale, L.	II	184
Piper nigrum, L.	I	54
Fagara octandra, L.	I	206
Polygonum Hydropiper, L.	II	142
Capparis spinosa, L.	II	385
Caryophyllus aromaticus, L.	II	409
Magnolia glauca, L.	II	436
Populus balsamifera, L.	IV	217
Œdématie.		
Cinchona officinalis, L.	I	338
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Apium Petroselinum, L.	I	496
Sambucus nigra, L.	I	504
Allium Cepa, L.	II	29
Asparagus officinalis, L.	II	50
Arnica montana, L.	III	554
Opacité des yeux.		
Chelidonium majus, L.	II	390
Ophthalmie.		
Verbena officinalis, L.	I	41
Crocus sativus, L.	I	74
Plantago Psylium, L.	I	198
—— *Cynops*, L.	I	199
Herniaria glabra, L.	I	414
Ulmus campestris, L.	I	426
Paris quadrifolia, L.	II	151
Laurus Camphora, L.	II	156
Ruta graveolens, L.	II	187
Pyrus Cydonia, L.	II	346
Hyssopus officinalis, L.	III	22
Antirrhinum Linaria, L.	III	95
Astragalus Tragacantha, L.	III	365
Trigonella Fœnum-Græcum, L.	III	382
Mimosa Nilotica, L.	IV	286
Ceratonia Siliqua, L.	IV	299
Ophthalmie chronique.		
Chelidonium majus, L.	II	390
Ophthalmie chronique avec relâchement.		
Euphrasia officinalis, L.	III	78
Ozène.		
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Hedera Helix, L.	I	382
Pimpinella Saxifraga, L.	I	494
Convallaria majalis, L.	II	53
Nigella sativa, L.	II	432

P.

	tome.	pag.
Pales couleurs.		
Ruta graveolens, L.	II	187
Helleborus niger, L.	II	465
Nepeta Cataria, L.	III	23
Palpitations.		
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Melissa officinalis, L.	III	
Asplenium Scolopendrium, L.	IV	325
Panaris.		
Datura Stramonium, L.	I	334
Solanum nigrum, L.	I	346

	tom.	pag.
Ferula Assa-fœtida, L.	I	463
Sedum Anacampseros, L.	II	259
Paralysie.		
Costus Arabicus, L.	I	5
Rosmarinus officinalis, L.	I	45
Valeriana Celtica, L.	I	65
Vinca minor, L.	I	398
Angelica Archangelica, L.	I	469
Imperatoria Ostruthium, L.	I	485
Asarum Europæum, L.	II	280
Euphorbia officinarum, L.	II	300
—— *palustris*, L.	II	310
Capparis spinosa, L.	II	385
Caryophyllus aromaticus, L.	II	409
Aconitum Napellus, L.	II	426
Helleborus niger, L.	II	465
Teucrium Marum, L.	III	14
Lavandula Spica, L.	III	26
Mentha Crispa, L.	III	31
Melissa officinalis, L.	III	60
Ocymum Basilicum, L.	III	67
Citrus Aurantium, L.	III	393
Arnica montana, L.	III	554
Aristolochia rotunda, L.	IV	39
Bryonia alba, L.	IV	166
Paralysie nerveuse.		
Santolina Chamæ-Cyparissus, L.	III	495
Paralysie de la langue.		
Marantha Galanga, L.	I	6
Winterana Canella, L.	II	287
Brassica Eruca, L.	III	196
Paraphimosis.		
Conium maculatum, L.	I	455
Paraphimosis inflammatoire.		
Papaver somniferum, L.	II	
Passion iliaque.		
Linum usitatissimum, L.	I	520
Berberis vulgaris, L.	II	73
Pyrus Cydonia, L.	II	346
Péripneumonie.		
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Sambucus nigra, L.	I	504
Linum usitatissimum, L.	I	520
Polygala vulgaris, L.	III	271
Centaurea benedicta, L.	III	608
Parietaria officinalis, L.	IV	267
Péripneumonie catarrale.		
Viola odorata, L.	III	643
Pertes.		
Ulmus campestris, L.	I	426
Pertes blanches.		
Polygonum Bistorta,	II	141
Lythrum Salicaria, L.	II	293
Perte de l'odorat.		
Ocymum Basilicum, L.	III	
Pertes de sang		
Geum urbanum, L.	II	
Perte de semence.		
Lamium album, L.	III	
Pertes rouges.		
Urtica dioïca, L.	IV	
Pertes utérines.		
Mimosa Nilotica, L.	IV	
Peste.		
Ruta graveolens, L.	II	187
Petite vérole.		
Dorstenia Drakæna, L.	I	212
Ilex aquifolium, L.	I	223
Cinchona officinalis, L.	I	318
Asclepias Vincetoxicum, L.	I	411
Babon Macedonicum, L.	I	474
Geum urbanum, L.	II	372
Geranium moscatum, L.	III	223
Tragopogon pratense, L.	III	420
Arum maculatum, L.	IV	48
Petite vérole confluente.		
Aristolochia Serpentaria, L.		

	tom.	pag.
Phimosis.		
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Conium maculatum, L.	I	455
Phimosis inflammatoire.		
Papaver somniferum, L.	II	
Phlegmon.		
Solanum nigrum, L.	I	346
Brassica Rapa, L.	III	194
Malva rotundifolia, L.	III	241
Atriplex hortensis, L.	IV	269
Ficus Carica, L.	IV	300
Phrénésie.		
Papaver somniferum, L.	II	393
Piqûre des abeilles.		
Apium Petroselinum, L.	I	496
Piqûres des tendons.		
Toluifera Balsamum, L.	II	188
Euphorbia officinarum, L.	II	300
—— *palustris.*	II	310
Pissement de sang.		
Urtica dioïca, L.	IV	102
Equisetum arvense, L.		
Plaies.		
Lysimachia Nummularia, L.	I	282
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Toluifera Balsamum, L.	II	188
Pyrola rotundifolia, L.	II	213
Sedum Anacampseros, L.	II	259
Agrimonia Eupatoria, L.	II	296
Papaver somniferum, L.	II	393
Prunella vulgaris,	III	71
Scrophularia nodosa, L.	III	101
—— *aquatica*, L.	III	102
Sisymbrium Sophia, L.	III	180
Geranium Robertianum, L.	III	227
Hypericum perforatum, L.	III	400
Pinus sylvestris, L.	IV	137
Populus nigra, L.	IV	216
Plaies des tendons.		
Papaver somniferum, L.	II	393
Plica Polonica.		
Lycopodium clavatum, L.	IV	346
Phthisie.		
Menyantes trifoliata, L.	I	277
Cinchona officinalis, L.	I	318
Verbascum Thapsus, L.	I	331
Chenopodium Botrys, L.	I	417
Daucus Carotta, L.	I	452
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Amyris Opobalsamum, L.	II	115
Toluifera Balsamum, L.	II	188
Copaïfera officinalis, L.	II	216
Prunus Lauro-Cerasus, L.	II	331
Rubus Chamæ-Morus, L.	II	363
Fragaria vesca, L.	II	364
Tormentilla erecta, L.	II	371
Glechoma hederacea, L.	III	35
Marrubium vulgare, L.	III	46
Origanum vulgare, L.	III	55
Sisymbrium Nasturtium, L.	III	177
Erysimum officinale, L.	III	182
Brassica Rapa, L.	III	194
Glycyrrhiza glabra, L.	III	336
Tussilago Farfara, L.	III	529
Equisetum arvense, L.	IV	308
Cycas circinnalis, L.	IV	310
Lichen Islandicus, L.	IV	383
—— *pulmonarius*, L.	IV	384
—— *pyxidatus*, L.	II	389
Phthisie avec atonie.		
Pistacia vera, L.		
Phthisie commençante.		
Urtica dioica, L.		
Phthisie pulmonaire.		
Eryngium campestre, L.	I	439
Pleurésie.		
Olea Europæa, L.	I	20

	tom.	pag.
Verbena officinalis, L.	I	41
Ilex aquifolium, L.	I	223
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Linum usitatissimum, L.	I	520
Paris quadrifolia, L.	II	151
Papaver Rhœas, L.	II	392
Spilanthus Acmella, L.	III	478
Centaurea benedicta, L.	III	608
Poison.		
Olea Europæa, L.	I	20
Plumbago Europæa, L.	I	288
Tanacetum Balsamita, L.	III	500
Pous.		
Piper nigrum, L.	I	54
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Evonymus Europæus, L.	I	371
Laurus nobilis, L.	II	157
Delphinium Staphysagria, L.	II	425
Myrica Gale, L.	IV	197
Menispermum Cocculus, L.	IV	227
Veratrum album, L.	IV	253

R.

	tom.	pag.
Rachitis.		
Galium verum, L.	I	182
Rubia Tinctorum, L.	I	186
Hedera Helix, L.	I	382
Rheum Rhabarbarum, L.	II	161
Digitalis purpurea, L.	III	105
Cochlearia officinalis, L.	III	161
—— *Armoracia*, L.	III	162
Salix alba, L.	IV	189
Asplenium Scolopendrium, L.	IV	325
Polypodium vulgare, L.	IV	330
—— *Filix mas*, L.	IV	334
Rage.		
Anagallis arvensis, L.	I	282
Ophiorrhiza Mungos, L.	I	285
Ribes nigrum, L.	I	379
Nigella sativa, L.	II	432
Règles.		
Matricaria Chamomilla, L.	III	579
Règles difficiles, retenues, *Voyez* Suppression des règles.		
Relâchement des bourses.		
Alchemilla vulgaris, L.	I	218
Retention d'urine.		
Sisymbrium Sophia, L.	III	180
Rhumatisme.		
Olea Europæa, L.	I	20
Iris tuberosa, L.	I	82
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Ribes nigrum, L.	I	379
Angelica Archangelica, L.	I	469
Sambucus nigra, L.	I	504
Linum usitatissimum, L.	I	520
Asparagus officinalis, L.	II	50
Amyris Opobalsamum, L.	II	115
Laurus Camphora, L.	II	156
—— *Sassafras*, L.	II	158
Guaiacum officinale, L.	II	184
Saponaria officinalis, L.	II	231
Prunus Lauro-Cerasus, L.	II	331
Aconitum Napellus, L.	II	426
Marrubium vulgare, L.	III	46
Linnæa Borealis, L.	III	123
Malva rotundifolia, L.	III	241
Arctium Lappa, L.	III	458
Eupatorium cannabinum, L.	III	467
Tanacetum vulgare, L.	III	499
Artemisia glacialis, L.	III	504
Tussilago Petasites, L.	III	530
Matricaria Chamomilla, L.	III	570
Achillea Millefolium, L.	III	582

	tom.	pag.
Pistacia Lentiscus, L.	IV	200
Humulus Lupulus, L.	IV	206
Rhumatisme aigu.		
Althæa officinalis, L.	III	237
Rhumatisme chronique.		
Conium maculatum, L.	I	455
Allium Cepa, L.	II	29
Helleborus niger, L.	II	465
Teucrium Scordium, L.	III	16
Althæa officinalis, L.	III	237
Artemisia Absinthium, L.	III	505
Arnica montana, L.	III	554
Buxus sempervirens, L.	IV	100
Juglans regia, L.	IV	128
Pinus sylvestris, L.	IV	137
Cannabis sativa, L.	IV	205
Rhumes.		
Brassica Rapa, L.	III	194
Viola odorata, L.	III	643
Rhumes invétérés.		
Glechoma hederacea, L.	III	35
Pinus sylvestris, L.	IV	137
Rhumes opiniâtres.		
Polypodium vulgare, L.	IV	330

S.

	tom.	pag.
SATYRIASIS.		
Nymphæa lutea et alba, L.	II	397
Sciatique.		
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Scorbut.		
Salicornia herbacea, L.	I	9
Hordeum distychon, L.	I	143
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Eryngium campestre, L.	I	439
Tropæolum majus, L.	II	104
Vaccinium Myrtillus, L.	II	120
Polygonum Bistorta, L.	II	141
——— *Hydropiper*, L.	II	142
Ruta graveolens, L.	II	187
Copaïfera officinalis, L.	II	216
Portulaca oleracea, L.	II	291
Tormentilla erecta, L.	II	371
Aquilegia vulgaris, L.	II	430
Lepidium sativum, L.	III	155
Cochlearia officinalis, L.	III	161
——— *Armoracia*, L.	III	162
Cardamine pratensis, L.	III	176
Sisymbrium Nasturtium, L.	III	177
——— *Sophia*, L.	III	180
Sinapis nigra, L.	III	198
Raphanus sativus, L.	III	200
Fumaria officinalis, L.	III	268
Astragalus Tragacantha, L.	III	364
Citrus medica, L.	III	392
Cynomorium coccineum, L.	IV	70
Morus nigra, L.	IV	105
Pinus sylvestris, L.	IV	137
—— *Abies*, L.	IV	140
Pistacia Lentiscus, L.	IV	200
Mimosa Nilotica, L.	IV	286
Polypodium Filix mas, L.	IV	334
Scrophules.		
Iris fœtidissima, L.	I	80
Cyclamen Europæum, L.	I	276
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Cinchona officinalis, L.	I	318
Asclepias Vincetoxicum, L.	I	411
Gentiana Centaurium, L.	I	435
Daucus Carotta, L.	I	452
Conium maculatum, L.	I	455
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Allium Porrum, L.	II	24
Laurus Cinnamomum, L.	II	155
Actæa spicata, L.	II	388
Lamium album, L.	III	37
Scrophularia nodosa, L.	III	101
Digitalis purpurea, L.	III	105
Cochlearia officinalis, L.	III	161

	tom.	pag.
Cochlearia Armoracia, L.	III	162
Fumaria officinalis, L.	III	268
Eupatorium cannabinum, L.	III	487
Anthemis nobilis, L.	III	576
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Seins douleureux, *Voy.* Douleurs des mamelles.		
Soif.		
Rubus Idæus, L.	II	361
Soif immodérée.		
Ribes rubrum, L.	I	379
Somnolence.		
Coffæa Arabica, L.	I	320
Spasme.		
Atriplex hortensis, L.	IV	269
Spasme hystérique, *Voy.* Hystéricie.		
Spasme de l'œsophage.		
Laurus Camphora, L.	II	156
Sphacèle, *Voyez* Gangrène.		
Squirrhe.		
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Solanum nigrum, L.	I	346
Conium maculatum, L.	I	455
Cicuta virosa, L.	I	478
Aconitum Napellus, L.	II	426
Stérilité.		
Triticum repens, L.	I	146
Ammi majus, L.	I	473
Imperatoria Ostruthium, L.	I	485
Satureia hortensis, L.	III	20
Brassica Eruca, L.	III	196
Orchis bifolia, L.	IV	6
—— *Morio*, L.	IV	8
Lycoperdon Tuber, L.	IV	419
Strangurie.		
Anchusa tinctoria, L.	I	254
Cordia Myxa, L.	I	355
Rhamnus Zizyphus, L.	I	365
Daucus Carotta, L.	I	452
Glycyrrhiza glabra, L.	III	336
Tragopogon pratense, L.	III	420
Submersion.		
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Sueurs colliquatives.		
Cinchona officinalis, L.	I	318
Suppression de la transpiration.		
Laurus nobilis, L.	I	157
Suppression des règles.		
Valeriana Celtica, L.	I	65
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Asclepias Vincetoxicum, L.	I	411
Laserpitium latifolium, L.	I	464
Ligusticum Levisticum, L.	I	468
Angelica Archangelica, L.	I	469
Laurus nobilis, L.	II	157
Ruta graveolens, L.	II	187
Capparis spinosa, L.	II	385
Pœonia officinalis, L.	II	420
Helleborus niger, L.	II	485
Nepeta Cataria, L.	III	23
Mentha crispa, L.	III	31
Thymus vulgaris, L.	III	57
Melissa Calamintha, L.	III	60
Fumaria bulbosa, L.	III	267
Artemisia vulgaris, L.	III	506
Matricaria Parthenium, L.	III	560
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Suppression des règles avec atonie.		
Marrubium vulgare, L.	III	46
Calendula officinalis, L.	IV	619
Ruscus aculeatus, L.	IV	258
Suppression d'urines, *Voy.* Strangurie.		

	tom.	pag.
Surdité.		
Allium sativum, L.	II	26
Veratrum album, L.	IV	252
Syncope.		
Rosmarinus officinalis, L.	I	45

T.

TÆNIA, *ou* VER SOLITAIRE.		
Strychnos Nux vomica, L.	I	351
Hedera Helix, L.	I	382
Allium sativum, L.	II	26
Euphorbia officinarum, L.	II	300
——— *palustris*, L.	II	310
Cambogia Gutta, L.	II	395
Artemisia Absinthium, L.	III	505
Momordica Elaterium, L.	IV	160
Polypodium Filix mas, L.	IV	334
Teigne.		
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Hedera Helix, L.	I	382
Allium Cepa, L.	II	29
Ledum palustre, L.	II	206
Euphorbia Lathyris, L.	II	305
Sinapis nigra, L.	III	198
Hibiscus Abelmoschus, L.	III	252
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Tenesme.		
Olea Europæa, L.	I	20
Ulmus campestris, L.	I	426
Malva rotundifolia, L.	III	241
Tragopogon pratense, L.	III	420
Tenesme dyssentérique.		
Portulaca oleracea, L.	II	291
Tétanos.		
Papaver somniferum, L.	II	393
Toux.		
Olea Europæa, L.	I	20
Veronica officinalis, L.	I	25
Crocus sativus, L.	I	74
Iris Florentina, L.	I	79
Saccharum officinarum, L.	I	102
Cynoglossum officinale, L.	I	255
Cinchona officinalis, L.	I	318
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Nicotiana Tabacum, L.	I	338
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Cordia Myxa, L.	I	355
Rhamnus Zizyphus, L.	I	365
Athamantha Cretensis, L.	I	458
Bubon Galbanum, L.	I	474
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Pimpinella Anisum, L.	I	495
Allium sativum, L.	II	26
Styrax officinale, L.	II	215
Copaïfera officinalis, L.	II	216
Illicium anisatum, L.	II	435
Hyssopus officinalis, L.	III	22
Glechoma hederacea, L.	III	35
Origanum vulgare, L.	III	55
Sinapis nigra, L.	III	198
Althæa officinalis, L.	III	237
Glycyrrhiza glabra, L.	III	335
Astragalus Tragacantha, L.	III	364
Theobroma Cacao, L.	III	391
Tragopogon pratense, L.	III	420
Tussilago Farfara, L.	III	529
Viola odorata, L.	III	643
Urtica dioïca, L.	IV	102
Pistacia Lentiscus, L.	IV	200
Ceratonia Siliqua, L.	IV	299
Ficus Carica, L.	IV	300
Polypodium vulgare, L.	IV	330
Adianthum Capillus Veneris, L.	IV	339
Toux catarrale.		
Inula Helenium, L.	III	549
Lichen Islandicus, L.	IV	383
Toux chronique.		
Rubia Tinctorum, L.	I	186
Toux convulsive.		
Cinchona officinalis, L.	I	318

	tom.	pag.
Chenopodium Botrys, L.	I	417
Ledum palustre, L.	II	206
Papaver Rhœas, L.	II	392
Pœonia officinalis, L.	II	420
Mentha crispa, L.	III	31
Toux humorale.		
Scilla maritima, L.	II	43
Toux stomacale.		
Amomum Zingiber, L.	I	4
—— *Grana paradisi*, L.	I	4
Tranchées.		
Geranium moschatum, L.	III	223
Tranchées des enfans nouveaux-nés.		
Pimpinella Anisum, L.	I	495
Tranchées des femmes en couche.		
Laserpitium Siler, L.	I	465
Tremblemens.		
Lavandula Spica, L.	III	26
Tremblemens paralytiques.		
Valeriana Celtica, L.	I	65
Tumeurs.		
Lamium album, L.	III	36
Tumeurs douloureuses.		
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Heracleum Sphondylium, L.	I	466
Papaver somniferum, L.	II	393
Trousse-galant.		
Linum usitatissimum, L.	I	520
Tuméfactions laiteuses des mamelles.		
Nymphæa alba, L.	II	398
Tumeurs douloureuses des mamelles.		
Cuminum Cyminum, L.	I	475
Scandix cerefolium, L.	I	482
Tumeurs froides.		
Bubon Galbanum, L.	I	474
Cuminum Cyminum, L.	I	475
Laurus nobilis, L.	II	157
Anagyris fœtida, L.	II	173
Euphorbia officinarum, L.	II	300
——— *palustris*, L.	II	310
Digitalis purpurea, L.	III	105
Eupatorium cannabinum, L.	III	467
Cannabis sativa, L.	IV	205
Tumeurs froides vénériennes.		
Daphne Mezereum, L.	I	132
—— *Laureola*, L.	I	133
Tumeurs inflammatoires.		
Cicuta virosa, L.	I	478
Lilium candidum, L.	II	31
Trifolium Melilotus officinale, L.	III	369
Tumeurs squirrheuses.		
Bubon Galbanum, L.	I	474
Tympanite.		
Ferula Assa-fœtida, L.	I	463
Cuminum Cyminum, L.	I	475
Laurus Cinnamomum, L.	II	153

U.

	tom.	pag.
Ulcères.		
Nicotiana Tabacum, L.	I	336
Peucedanum officinale, L.	I	459
Aloë perfoliata, L.	II	61
Styrax officinale, L.	II	215
Sedum Anacampseros, L.	II	259
Agrimonia Eupatoria, L.	II	296
Tormentilla erecta, L.	II	371
Lamium album, L.	III	36
Prunella vulgaris, L.	III	71
Brassica Rapa, L.	III	194
Hypericum perforatum, L.	III	400
Tragopogon pratense, L.	III	420

	tom.	pag.
Achillea Millefolium, L.	III	582
Juglans regia, L.	IV	128
Populus nigra, L.	IV	216
Ulcères baveux.		
Pyrola rotundifolia, L.	II	213
Eupatorium cannabinum, L.	III	467
Ulcères cacoétiques.		
Sedum acre, L.	II	261
Phytolacca decandra, L.	II	276
Sisymbrium Sophia, L.	III	180
Ulcères carcinomateux.		
Phytolacca decandra, L.	II	276
Clematis erecta, L.	II	447
Ulcères avec carie.		
Ferula Assa-fœtida, L.	I	463
Ulcères douloureux.		
Solanum nigrum, L.	I	346
Ulcères externes.		
Toluifera Balsamum, L.	II	188
Cichorium Intybus, L.	III	456
Pinus Abies, L.	IV	140
Pistacia vera, L.	IV	199
Ulcères fongueux.		
Clematis erecta, L.	II	447
Ulcères gangreneux.		
Erysimum Alliaria, L.	III	183
Ulcères internes.		
Valeriana officinalis, L.	I	64
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Lysimachia Nummularia, L.	I	281
Allium Porrum, L.	II	24
Toluifera Balsamum, L.	II	188
Styrax officinale, L.	II	215
Glechoma hederacea, L.	III	35
Antirrhinum Linaria, L.	III	95
Cichorium Intybus, L.	III	456
Pinus Abies, L.	IV	140
Pistacia vera, L.	IV	199
Ulcères invétérés.		
Bryonia alba, L.	IV	166
Ulcères malins.		
Atropa Belladona, L.	I	340
Conium maculatum, L.	I	455
Rumex aquaticus, L.	II	82
Cynomorium coccineum, L.	IV	70
Ulcères de la matrice.		
Cyperus longus, L.	I	90
Symphytum officinale, L.	I	258
Ulcères des poumons.		
Symphytum officinale, L.	I	258
Ulcères putrides.		
Cinchona officinalis, L.	I	318
Gentiana lutea, L.	I	431
Daphne Mezereum, L.	II	132
—— *Laureola*, L.	II	133
Polygonum Hydropiper, L.	II	142
Artemisia Absinthium, L.	III	505
Solidago Virga-aurea, L.	III	545
Aristolochia rotunda, L.	IV	39
Ulcères des reins.		
Symphytum officinale, L.	I	258
Ulcères de l'urètre.		
Clematis erecta, L.	II	447
Ulcères de la vessie.		
Cyperus longus, L.	I	6
Symphytum officinale, L.	I	258
Malva rotundifolia, L.	III	241
Ulcères sanieux.		
Lycoperdon Bovista, L.	IV	420
Ulcères sordides.		
Sedum acre, L.	II	261
Erysimum Alliaria, L.	III	183
Aristolochia rotunda, L.	IV	39
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Ulcères vénériens.		
Aconitum Napellus, L.	II	426

	tome.	pag.
Ulcères scrophuleux.		
Gentiana lutea, L.	I	431
Chelidonium majus, L.	II	390
Aconitum Napellus, L.	II	426

V.

VARIOLE, *Voy.* PETITE VÉROLE.		
Variole confluente, *Voy.* Petite vérole confluente.		
Venin.		
Olea Europæa, L.	I	20
Ophiorrhiza Mungos, L.	I	285
Vents.		
Athamanta Cretensis, L.	I	458
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Laurus Sassafras, L.	II	158
Vérole.		
Coris Monspeliensis, L.	I	330
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Rhamnus catharticus, L.	I	362
Anethum Fœniculum, L.	I	492
Pimpinella Saxifraga, L.	I	494
Laurus Camphora, L.	II	156
——— *Sassafras*, L.	II	158
Smilax Salsaparilla, L.	II	4
Guaïcum officinale, L.	II	184
Saponaria officinalis, L.	II	231
Prunus Lauro-cerasus, L.	II	331
Papaver somniferum, L.	II	393
Aconitum Napellus, L.	II	426
Lobelia siphilitica, L.	III	640
Buxus sempervirens, L.	IV	100
Xanthium Strumarium, L.	IV	107
Smilax Salsaparilla, L.	IV	211
Juniperus communis, L.	IV	231
Verrues.		
Euphorbia Lathyris, L.	II	305
Vers.		
Kæmpferia rotunda, L.	I	8
Gratiola officinalis, L.	I	35
Spigelia anthelmia, L.	I	284
Convolvulus Jalappa, L.	I	295
Cinchona officinalis, L.	I	318
Mirabilis dichotoma, L.	I	329
Gentiana lutea, L.	I	431
Daucus Carotta, L.	I	452
Aloë perfoliata, L.	II	61
Dictamnus albus, L.	II	186
Ruta graveolens, L.	II	187
Saponaria officinalis, L.	II	231
Delphinium Staphysagria, L.	II	425
Helleborus niger, L.	II	465
Cochlearia Armoracia, L.	III	162
Sisymbrium Sophia, L.	III	180
Citrus médica, L.	III	392
Santolina Chamæ-Cyparissus, L.	III	495
Tanacetum vulgare, L.	III	499
——— *Balsamita*, L.	III	450
Artemisia Abrotanum, L.	III	502
——— *Absinthium*, L.	III	505
Matricaria Parthenium, L.	III	569
——— *Chamomilla*, L.	III	570
Juniperus Sabina, L.	IV	230
Vertige.		
Maranta Galanga, L.	I	6
Herniaria glabra, L.	I	414
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Calamus aromaticus, L.	II	65
Tilia Europæa, L.	II	403
Lavandula Spica, L.	III	26
Vieillesse.		
Salvia officinalis, L.	I	46
Theobroma Cacao, L.	III	390
Viscosité des humeurs.		
Guaïacum officinale, L.	II	184
Vomissement.		
Fagara octandra, L.	I	206
Anethum graveolens, L.	I	491
—— *Fœniculum*, L.	I	492

	tom.	pag.
Pyrus Cydonia, L.	II	346
Mentha crispa, L.	III	31
Vomissement habituel.		
Laurus Cinnamomum, L.	II	155
Populus balsamifera, L.	IV	216
Vomissement spasmodique.		
Crocus sativus, L.	I	74
Papaver somniferum, L.	II	393
Vomissement de sang.		
Nymphæa lutea et alba, L.	II	397
Vomissement des femmes grosses.		
Matricaria Chamomilla, L.	III	570
Vomissement des navigateurs.		
Maranta Galanga, L.	I	6

Fin de la quatrième Table.

TABLE CINQUIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE PHARMACEUTIQUE.

Le premier chiffre indique le *Tome*, le second la *page du Tome*.

A.

Absinthe, *Artemisia Absinthium*, L.	III	505
Acacia d'Égypte, — vrai, } *Mimosa Nilotica*, L.	IV	286
Acanthe, *Acanthus mollis*, L.	III	141
Ache des marais, *Apium graveolens*, L.	I	497
— des montagnes, *Ligusticum Levisticum*, L.	I	468
Acmelle, *Spilanthus Acmella*, L.	III	478
Aconit salutaire, *Aconitum Anthora*, L.	II	427
Acore des Indes, *Acorus Calamus*, L.	II	65
Agaric de chêne, *Agaricus igniarius*, L.	IV	413
Agnus-castus, *Vitex Agnus-castus*, L.	III	138
Agrimoine, *Agrimonia Eupatoria*, L.	II	296
Agripaume, *Leonurus Cardiaca*, L.	III	47
Aigremoine, *Agrimonia Eupatoria*, L.	II	296
Ail, *Allium sativum*, L.	II	25
Airelle, *Vaccinium Myrtyllus*, L.	II	119
Alkekenge, *Physalis Alkekengi*, L.	I	342
Alisier, *Cratægus Aria*, L.	II	338
Alleluia, *Oxalis Acetosella*, L.	II	265
Alliaire, *Erysimum Alliaria*, L.	III	183
Aloës caballin, — hépatique, — succotrin, } *Aloë perfoliata*, L.	II	61
Alpiste, *Phalaris Canariensis*, L.	I	103
Aluyre, *Artemisia Absinthium*, L.	III	505
Amadou, *Agaricus igniarius*, L.	IV	413
Amandes douces, *Amygdalus communis*, L.	II	330
Ambrette, *Hibiscus Abelmoscus*, L.	III	252
Ammi, *Sison Ammi*, L.	I	473
Ammi de Candie, *Lagoëcia Cuminoïdes*, L.	I	385

	tome.	pag.
Anacarde des Isles, *Anacardium Occidentale*, L.	II	159
Anagyre puante, *Anagyris fœtida*, L.	II	173
Ananas, *Bromelia Ananas*, L.	II	7
Ancolie, *Aquilegia vulgaris*, L.	II	430
Anemone des bois, *Anemone nemorosa*, L.	II	443
Aneth, *Anethum graveolens*, L.	I	492
Angélique cultivée, *Angelica Archangelica*, L.	I	469
Anis, *Pimpinella Anisum*, L.	I	495
Anthore, *Aconitum Anthora*, L.	II	427
— doux, *Anethum Fœniculum*, L.	I	492
— de la Chine, — étoilé, *Illicium anisatum*, L.	II	435
Arbre de la sagesse, *Betula alba*, L.	IV	98
Argentine des Herboristes, *Potentilla Anserina*, L.	II	365
Aristoloche Clématite, *Aristolochia Clematitis*, L.	IV	40
— à feuilles de Lierre, *Aristolochia triloba*, L.	IV	37
— ronde, *Aristolochia rotunda*, L.	IV	39
Armoise, *Artemisia vulgaris*, L.	III	506
Arnique, *Arnica montana*, L.	III	554
Arrête-Bœuf épineux, *Ononis arvensis*, L.	III	294
Arroche puante, *Chenopodium Vulvaria*, L.	I	418
Asperge, *Asparagus officinalis*, L.	II	50
Aspic, *Lavandula Spica*, L.	III	26
Assa-fœtida, *Ferula Assa-Fœtida*, L.	I	463
Avoine, *Avœna sativa*, L.	I	135
Aubifoin, *Centaurea Cyanus*, L.	III	603
Augusture, *Magnolia glauca*, L.	II	436
Aunée, Aulnée, *Inula Helenium*, L.	III	548
Aurone, *Artemisia Abrotanum*, L.	III	502
— des champs, *Artemisia campestris*, L.	III	503

B.

BADIANE, *Illicium anisatum*, L.	II	435
Balauste, *Punica granatum*, L.	II	328
Barbe de bouc, *Tragopogon pratense*, L.	III	420
Barbot, *Centaurea Cyanus*, L.	III	603
Barbotine, *Artemisia Contra*, L.	III	502

		tom.	pag.
Bardane,	*Arctium Lappa*, L.	III	458
— (petite),	*Xanthium Strumarium*, L.	IV	107
Basilic,	*Ocymum Basilicum*, L.	III	
Baume d'Amérique, / — de Carthagène,	*Toluifera Balsamum*, L.	II	188
— de Copahu, / — de Copau,	*Copaïfera officinalis*, L.	II	216
— (grand)	*Tanacetum Balsamita*, L.	III	500
— de Judée, / — de la Mecque,	*Amyris Opobalsamum*, L.	II	115
— de Tolu,	*Toluifera Balsamum*, L.	II	188
Bec-de-grue musqué,	*Geranium moschatum*, L.	III	223
Béhen rouge,	*Statice Limonium*, L.	I	517
Belladone, / Belle-dame,	*Atropa Belladona*, L.	I	340
Benoîte,	*Geum urbanum*, L.	II	372
— aquatique,	*Geum rivale*, L.	II	373
Berce,	*Heracleum Sphondylium*, L.	I	466
Bétoine,	*Betonica officinalis*, L.	II	39
— d'eau,	*Scrophularia aquatica*, L.	III	102
— des montagnes,	*Arnica montana*, L.	III	554
Bistorte, / — (grande),	*Polygonum Bistorta*, L.	II	141
Blé noir,	*Polygonum Fagopyrum*, L.	II	145
Bleu de Hollande,	*Croton Tinctorum*, L.	IV	147
Bluet,	*Centaurea Cyanus*, L.	III	602
Bois de Cassie,	*Quassia amara*, L.	II	196
— de Chypre,	*Genista Canariensis*, L.	III	284
— de clou de Para,	*Myrtus Caryophyllata*, L.	II	327
— couleuvre, / — de couleuvre,	*Strychnos colubrina*, L.	I	351
— de Crave,	*Myrthus caryophyllata*, L.	II	327
— Gentil,	*Daphne Mezereum*, L.	II	132
— de girofle,	*Myrtus caryophyllata*, L.	II	327
— néphrétique,	*Guilandina Moringa*, L.	II	183
— de Rhodes, / — de rose,	*Genista Canariensis* L.	III	284
— saint,	*Guaïacum officinale*, L.	II	184
— de Surinam,	*Quassia amara*, L.	II	196
Bonne-dame,	*Atriplex hortensis*, L.	IV	269

		tom.	pag.
Bonnette,	*Prunella vulgaris*, L.	III	71
Botrys,	*Chenopodium Botrys*, L.	I	417
Boucage, (petite)	*Pimpinella Saxifraga*, L.	I	494
Boucard,	*Salicornia herbacea*, L.	I	9
Bouillon-blanc,	*Verbascum Thapsus*, L.	I	331
Bouleau commun,	*Betula alba*, L.	IV	98
Bourdaine, Bourgène,	*Rhamnus Frangula*, L.	I	364
Bourrache,	*Borrago officinalis*, L.	I	261
Bouis,	*Buxus sempervirens*, L.	IV	100
Brancursine, Branc-ursine,	*Acanthus mollis*, L.	III	141
Brunelle,	*Prunella vulgaris*, L.	III	71
Buglosse,	*Anchusa officinalis*, L.	I	253
Buis,	*Buxus sempervirens*, L.	IV	100
— piquant,	*Ruscus aculeatus*, L.	IV	238
Branc-ursine, (fausse) Branche-ursine, (fausse)	*Heracleum Sphondylium*, L.	I	468
Busserole,	*Arbutus Uva-ursi*, L.	II	212

B.

		tom.	pag.
CABARET,	*Asarum Europæum*, L.	II	280
Cacao,	*Theobroma Cacao*, L.	III	390
Café,	*Coffea Arabica*, L.	I	319
Caille-lait jaune, — (vrai),	*Galium verum*, L.	I	182
Cajeput,	*Melaleuca Leucadendra*, L.	III	396
Calament des montagnes;	*Melissa Calaminta*, L.	III	61
Caméléon blanc,	*Carlina acaulis*, L.	III	374
Camomille commune, — ordinaire,	*Matricaria Chamomilla*, L.	III	570
— puante,	*Anthemis Cotula*, L.	III	576
— Romaine,	*Anthemis nobilis*, L.	III	*ibid.*
Camphre,	*Laurus Camphora*, L.	II	156
Camphrée,	*Camphorosma Monspeliaca*, L.	I	217
Canamelle,	*Saccharum officinarum*, L.	I	102
Canelle fine, — grossière, — moyenne, — ordinaire,	*Laurus Cinnamomum*, L.	II	155

		tom.	pag.
Canelle giroflée ou geroflée, — noire,	*Myrtus caryophyllata*, L.	II	327
— en bois,	*Laurus Cassia*, L.	II	156
— blanche,	*Winteranna Canella*, L.	II	287
Canellier,	*Laurus Cinnamomum*, L.	II	155
Canne à sucre,	*Saccharum officinarum*, L.	I	102
Capelet,	*Myrthus caryophyllata*, L.	II	327
Capillaire, — de Montpellier,	*Adiantum Capillus Veneris*, L.	IV	339
Câpre, Câprier,	*Capparis spinosa*, L.	II	386
Capucine,	*Tropæolum majus*, L.	II	104
Caramelle,	*Saccharum officinarum*, L.	I	102
Cardamine,	*Cardamine pratensis*, L.	III	176
Cardamone,	*Amomum Cardamomum*, L.	I	4
— (grand),	*Amomum Grana paradisi*, L.	I	4
Cardiaque,	*Leonurus Cardiaca*, L.	III	47
Carline,	*Carlina acaulis*, L.	III	473
Carvi,	*Carum Carvi*, L.	I	493
Carotte, — cultivée, — sauvage,	*Daucus Carotta*, L.	I	452
Caroubier, Carouge,	*Ceratonia Siliqua*, L.	IV	299
Cascarille,	*Croton Cascarilla*, L.	IV	146
Casse, — solutive, — en bâton,	*Cassia fistulosa*, L.	II	178
Casse-lunette,	*Centaurea Cyanus*, L.	III	603
Casse-pierre,	*Parietaria officinalis*, L.	IV	167
Cassis,	*Ribes nigrum*, L.	I	379
Catapuce,	*Euphorbia Lathyris*, L.	II	305
Cataire,	*Nepeta Cataria*, L.	III	23
Céleri des marais,	*Apium graveolens*, L.	I	497
Cerfeuil,	*Scandix Cerefolium*, L.	I	482
Cerises noires, — rouges,	*Prunus Cerasus*, L.	II	332
Cétérach,	*Asplenium Ceterach*, L.	IV	325
Chacrille,	*Croton Cascarilla*, L.	IV	146
Chamaras,	*Teucrium Scordium*, L.	III	16

	tom.	pag.
Chamæ-Morus, *Rubus Chamæ-Morus*, L.	II	363
Chamédrys, *Teucrium Chamædrys*, L.	III	17
Champignon de Malte, *Cynomorium coccineum*, L.	IV	71
Chanvre, *Cannabis sativa*, L.	IV	206
Chardon à cent têtes, *Eryngium campestre*, L.	I	439
— bénit, *Centaurea benedicta*, L.	III	608
— étoilé, *Centaurea Calcitrapa*, L.	III	609
— Marie, *Carduus Marianus*, L.	III	466
— Roland, *Eryngium campestre*, L.	I	439
Châtaigne, Châtaignier ordinaire, *Fagus Castanea*, L.	IV	130
— d'eau, *Trapa natans*, L.	I	211
Chausse-trape, *Centaurea Calcitrapa*, L.	III	609
Chélidoine, *Chelidonium majus*, L.	II	390
— petite, *Ranunculus Ficaria*, L.	II	454
Cheveu de Vénus, *Cuscuta Europæa*, L.	I	221
Chicorée sauvage, *Cichorium Intybus*, L.	III	456
Chien-dent des boutiques, *Triticum repens*, L.	I	146
Choux marin, *Convolvulus Soldanella*, L.	I	298
Ciguë aquatique, *Phellandrium aquaticum*, L.	I	477
Ciguë aquatique, *Cicuta virosa*, L.	I	478
— (grande), — ordinaire, *Conium maculatum*, L.	I	455
— petite, *Æthusa Cynapium*, L.	I	479
— vireuse, *Cicuta virosa*, L.	I	478
Citron, *Citrus medica*, L.	III	392
Citronelle, *Melissa officinalis*, L.	III	60
Clou de girofle ou gérofle, *Caryophyllus aromaticus*, L.	II	409
Clématite droite, *Clematis erecta*, L.	II	447
Cochléaria, *Cochlearia officinalis*, L.	III	161
Coing, *Pyrus Cydonia*, L.	II	346
Colchique, *Colchicum autumnale*, L.	II	89
Coloquinte, *Cucumis Colocynthis*, L.	IV	163
Cocombre d'âne, — sauvage, *Momordica Elaterium*, L.	IV	160
Consoude, (grande) *Symphytum majus*, L.	I	258
Contrayerva, *Dorstenia Contrayerva*, L.	I	211
Coq des jardins, *Tanacetum Balsamita*, L.	I	500

	tom.	pag.
Coquelicot, *Papaver Rhœas*, L.	II	392
Coquelourde, *Anemone Pulsatilla*, L.	II	441
Coqueret, *Physalis Alkekengi*, L.	I	342
Coque du Levant, *Menispermum Cocculus*, L.	IV	227
Corail des jardins, *Capsicum annuum*, L.	I	349
Coriandre, *Coriandrum sativum*, L.	I	481
Coris, *Coris Monspeliensis*, L.	I	330
Coste, *Costus Arabicus*, L.	I	5
Coulevrée, Couleuvrée, *Bryonia alba*,	IV	166
Cran, *Cochlearia Armoracia*, L.	III	162
Cresson Alenois, *Lepidium sativum*. L.	III	155
— élégant, *Cardamine pratensis*, L.	III	176
— de fontaine, *Sisymbrium Nasturtium*, L.	III	177
— d'Inde, *Tropæolum majus*, L.	II	104
Cumin, *Cuminum Cyminum*, L,	I	475
Cuscute, *Cuscuta Europæa*, L.	I	221
— Epithym, *Cuscuta Europæa*, L. var.	I	222
Cynoglosse plus grand, — vulgaire, *Cynoglossum officinale*, L.	I	255

D.

Daucus de Candie, — de Crète, *Athamanta Cretensis*, L.	I	458
Dentelaire, *Plumbago Europæa*, L.	I	288
Dent-de-lion, *Leontodon Taraxacum*, L.	III	434
Dictamne, *Dictamnus albus*, L.	II	186
— de Crète, *Origanum Dictamnus*, L.	III	54
Digitale, *Digitalis purpurea*, L.	III	105
Double-feuille, *Orchis bifolia*, L.	IV	6
Douce-amère, *Solanum Dulcamara*, L.	I	344
Doigtier *Digitalis purpurea*, L.	III	105
Dompte-venin, *Asclepias vincetoricum*, L.	I	411

E.

Éclaire, *Chelidonium majus*, L.	II	390
Écorce de Cascarille, — de Chacrille, *Croton Cascarilla*, L.	IV	147

	tom.	pag.
Écorce de Girofle, *Myrtus caryophyllata*, L.	II	327
— de Grenade, *Punica granatum*, L.	II	328
— du Pérou, *Cinchona officinalis*, L.	I	318
— de Winter, *Winterana Canella*, L.	II	287
Églantier de chien, *Rosa canina*, L.	II	360
Ellébore noir, *Helleborus niger*, L.	II	464
Encens, *Juniperus Lycia*, L.	IV	240
Endormie, *Datura Stramonium*, L.	I	334
Épine-vinette, *Berberis vulgaris*, L.	II	73
Épurge, *Euphorbia Lathyris*, L.	II	305
Ers, *Ervum Ervilia*, L.	III	327
Esquine, *Smilax China*, L.	IV	212
Étrangle-loup, *Paris quadrifolia*, L.	II	151
Eufraise, Euphraise, *Euphrasia officinalis*, L.	II	78
Eupatoire d'Avicenne, *Eupatorium cannabinum*, L.	III	487
Euphorbe, *Euphorbia officinarum*, L.	II	300

F.

Faux-acore, *Iris Pseudo-Acorus*, L.	IV	80
Feuille d'Orient, *Cassia Senna*, L.	II	179
Fenouil, *Anethum Fœniculum*, L.	I	492
— de porc, *Peucedanum officinale*, L.	I	459
— puant, *Anethum graveolens*, L.	I	491
Fenu-Grec, *Trigonella Fœnum-Græcum*, L.	III	382
Fève, *Vicia Faba*, L.	III	325
Fiel de terre, *Fumaria officinalis*, L.	III	268
Figues, *Ficus Carica*, L.	IV	300
Flambe, *Iris Germanica*, L.	IV	79
Flammule, *Clematis erecta*, L.	II	447
Fraise, Fraisier, *Fragaria vesca*, L.	II	364
Framboise ordinaire, *Rubus Idæus*, L.	II	361
Fraxinelle, *Dictamnus albus*, L.	II	186
Frêne noir, — Orme, *Fraxinus Ornus*, L.	II	290
Froment d'hiver, *Triticum hibernum*, L.	I	145
Fougère mâle, *Polypodium Filix mas*, L.	IV	334

	tom.	pag.
Fumeterre bulbeuse, *Fumaria bulbosa*, L.	III	267
— ordinaire, *Fumaria officinalis*, L.	III	268

G.

	tom.	pag.
GAÏAC, *Guaïacum officinale*, L.	II	184
Galanga, *Maranta Galanga*, L.	I	6
Galbanum, *Bubon Galbanum*, L.	I	474
Galé, *Myrica Gale*, L.	IV	197
Galega, *Galega officinalis*, L.	III	355
Galiote, *Geum urbanum*, L.	II	372
Gans de Notre-Dame, *Digitalis purpurea*, L.	III	105
Garance, *Rubia Tinctorum*, L.	I	186
Garde-robe, *Artemisia campestris*, L. / *Chamæ-Cyparissus*, L.	III	503
Gariot, *Geum urbanum*, L.	II	372
Garou, *Daphne Mezereum*, L.	II	132
Genet des Teinturiers, *Genista tinctoria*, L.	III	285
Genèvre, Genevrier, — ordinaire, *Juniperus communis*, L.	IV	231
Gentiane, — (grande) *Gentiana lutea*, L.	I	431
Germandrée d'eau, *Teucrium Scordium*, L.	II	16
Géroflé, *Caryophyllus aromaticus*, L.	II	409
Géroflier de muraille, *Cheiranthus Cheiri*, L.	III	184
Gingembre, *Amomum Zingiber*, L.	I	4
Glayeul, *Iris Germanica*, L.	I	79
— puant, *Iris fœtidissima*, L.	I	81
Glouteron, *Arctium Lappa*, L.	III	458
— (petit), *Xanthium Strumarium*, L.	IV	107
Gomme Adragant, *Astragalus Tragacantha*, L.	III	364
— Arabique, *Mimosa Nilotica*, L.	IV	286
— Gutte, *Cambogia Gutta*, L.	II	395
— Taquamaque, *Populus balsamifera*, L.	IV	216
— Tragacant, *Astragalus Tragacantha*, L.	III	364
— Tacamahaca, *Fagara octandra*, L.	I	206
Graine des Canaries, *Phalaris Canariensis*, L.	I	103
— de musc, *Hibiscus Abelmoschus*, L.	III	252

	tom.	pag.
Graine de paradis, *Amomum Grana paradisi*, L.	I	4
Grains de Grenade, *Punica Granatum*, L.	II	328
Grande lavande.		
Grapèles, *Xanthium Strumarium*, L.	IV	107
Gratte-cul, *Rosa canina*, L.	II	360
Gremil, *Lithospermum officinale*, L.	I	252
Grenade, *Punica Granatum*, L.	II	328
Groseillier rouge, *Ribes rubrum*, L.	I	378
Gui de chêne, mâle, femelle, *Viscum album*, L.	IV	195
Guimauve, *Althæa officinalis*, L.	III	237

H.

HARICOT, *Phaseolus vulgaris*, L.	III	305
Hellébore blanc, *Veratrum album*, L.	IV	252
— noir, *Helleborus niger*, L.	II	464
Hépatique, *Anemone Hepatica*, L.	II	440
Herbe à éternuer, *Achillea Ptarmica*, L.	III	581
— à Paris, *Paris quadrifolia*, L.	II	151
— à Robert, *Geranium Robertianum*, L.	III	227
— au chantre, *Erysimum officinale*, L.	III	182
— au vent, *Anemone Pulsatilla*, L.	II	441
— aux chats, *Nepeta Cataria*, L.	III	23
— aux cuillers, *Cochlearia officinalis*, L.	III	161
— aux écus, *Lysimachia Nummularia*, L.	I	281
— aux hémorrhoïdes, *Ranunculus Ficaria*, L.	II	454
— aux gueux, *Clematis Vitalba*, L.	II	447
— aux perles, *Lithospermum officinale*, L.	I	252
— aux puces, *Plantago Psyllium*, L.	I	198
— aux puces, (grande) *Plantago Cynops*, L.	I	199
— aux teigneux, *Tussilago Petasites*, L.	III	530
— de Benoît, *Geum urbanum*, L.	II	372
— de St. Christophe, *Actæa spicata*, L.	II	388
— de St. Roch, *Inula dysscnterica*, L.	III	549
— de la Trinité, *Anemone hepatica*, L.	II	440
— du bœuf, *Oxalis acetosella*, L.	II	265
— du siége, *Scrophularia aquatica*, L.	III	102
Hermodates, *Iris tuberosa*, L.	I	82
Hernière, *Herniaria glabra*, L.	I	414

		tom.	pag.
Houblon,	*Humulus Lupulus*, L.	IV	206
Houx,	*Ilex Aquifolium*, L.	IV	223
— Frelon, — (petit),	*Ruscus aculeatus*, L.	IV	238
Hypociste,	*Cytinus Hypocistis*, L.	IV	43
Hyssope,	*Hyssopus officinalis*, L.	III	22

I.

IMPÉRATOIRE,	*Imperatoria Ostruthium*, L.	I	485
Iris,	*Iris Germanica*, L.	I	79
— de Florence,	*Iris Florentina*, L.	I	79
— gigot,	*Iris fœtidissima*, L.	I	80
— des marais,	*Iris Pseudo-Acorus*, L.	I	80

J.

JALAP,	*Convolvulus Jalappa*, L.	I	295
Joubarbe, — (grande)	*Sempervivum tectorum*, L.	II	312
— des vignes,	*Sedum Telephium*, L.	II	259
Jugoline,	*Sesamum Orientale*, L.	III	130
Jujubes,	*Rhamnus Zizyphus*, L.	I	365
Jusquiame,	*Hyoscyamus niger*, L.	I	336

K.

KARAPAT,	*Ricinus communis*, L.	IV	153
Kynorrhodon,	*Rosa canina*, L.	II	360

L.

LABDANUM, Ladanum,	*Cistus Creticus*, L.	II	412
Laitue vireuse,	*Lactuca virosa*, L.	III	430
Langue de chien,	*Cynoglossum officinale*, L.	I	255
Lavande, — grande, — commune, — femelle,	*Lavandula Spica*, L.	III	26
Lauréole,	*Daphne Laureola*, L.	II	133

	tom.	pag.
Laurier, — franc, *Laurus nobilis*, L.	II	157
— Cerise, *Prunus Lauro-Cerasus*, L.	II	331
Lentille, *Ervum Lens*, L.	III	326
Lentisque, *Pistacia Lentiscus*, L.	IV	200
Lichen boitier, — pixide, *Lichen pyxidatus*, L.	IV	389
— de chêne, *Lichen plicatus*, L.	IV	392
Lierre à cautère, *Hedera Helix*, L.	I	382
— terrestre, Lierret, *Glechoma hederacea*, L.	III	35
Lin, *Linum usitatissimum*, L.	I	520
— purgatif, *Linum catharticum*, L.	I	523
— sauvage, *Antirrhinum Linaria*, L.	III	95
Linaire, — commune, *Antirrhinum Linaria*, L.	III	95
Linnée, *Linnæa Borealis*, L.	III	123
Lis, *Lilium candidum*, L.	II	31
Livêche, *Ligusticum Levisticum*, L.	I	468
Lobélie, *Lobelia Siphilitica*, L.	III	640
Luettière, *Ruscus hypoglossum*, L.	IV	238
Lupin, *Lupinus albus*, L.	III	303
Lycopode commun, *Lycopodium clavatum*, L.	IV	345

M.

MACLOU, *Aconitum Anthora*, L.	II	427
Macre, *Trapa natans*, L.	I	211
Mandragore, *Atropa Mandragora*, L.	I	339
Manne de Calabre, — en larmes, *Fraxinus Ornus*, L.	IV	290
Marjolaine, *Origanum Majorana*, L.	III	56
Marronnier, *Æsculus Hippocastanum*, L.	II	95
Maroute, *Anthemis Cotula*, L.	III	576
Marrube blanc, *Marrubium vulgare*, L.	III	46
Marum vrai, *Teucrium Marum*, L.	III	14
Mastic, *Pistacia Lentiscus*, L.	IV	200
Mauve en arbre, *Alcea rosea*, L.	III	239

	tom.	pa
Mauve (petite), *Malva rotundifolia*, L.	III	24
Matricaire, *Matricaria Parthenium*, L.	III	569
Mélèze, *Pinus Larix*, L.	IV	139
Mélisse, *Melissa officinalis*, L.	III	66
— Moldavique, *Dracocephalum Moldavica*, L.	III	63
Melilot, *Trifolium Melilotus officinale*, L.	III	369
Menthe aquatique, *Mentha Pulegium*, L.	III	33
— coq, *Tanacetum Balsamita*, L.	III	506
— crépue des jardins, — frisée, *Mentha crispa*, L.	III	31
— poivrée, *Mentha piperita*, L.	III	32
— Pouliot, *Mentha Pulegium*, L.	III	33
— sauvage, *Mentha sylvestris*, L.	III	36
Ményanthe, *Menyanthes trifoliata*, L.	I	277
Mercuriale, — ordinaire, *Mercurialis annua*, L.	IV	219
Meum, *Æthusa Meum*, L.	I	486
Mézéréon, *Daphne Mezereum*, L.	II	132
Millefeuille, *Achillea Millefolium*, L.	III	502
Mille-pertuis ordinaire, *Hypericum perforatum*, L.	III	400
Mirobolans, *Phyllanthus Emblica*, L.	III	94
Molène, *Verbascum Thapsus*, L.	I	331
Monnoyère, *Thlaspi arvense*, L.	III	158
Morèle, *Solanum nigrum*, L.	I	346
Mors-diable, *Scabiosa Succisa*, L.	I	169
— chien, *Colchicum autumnale*, L.	II	89
Mousse de chêne, *Lichen plicatus*, L.	IV	392
— d'Islande, *Lichen Islandicus*, L.	IV	383
— terrestre, *Lycopodium clavatum*, L.	IV	345
Moutarde, *Sinapis nigra*, L.	III	198
Muguet, *Asperula odorata*, L.	I	178
— des Parisiens, *Convallaria majalis*, L.	II	53
Mûrier noir, *Morus nigra*, L.	IV	105
Myrobolans, *Phyllanthus Emblica*, L.	III	94
Myrte, *Myrtus communis*, L.	II	324
— bâtard, *Myrica Gale*, L.	IV	197
Myrtille, *Vaccinium Myrtillus*, L.	II	119

N.

	tom.	pag.
NAPEL, *Aconitum Napellus*, L.	II	426
Navet, *Brassica Napus*, L.	III	193
—— du diable, *Bryonia alba*, L.	IV	166
Nard celtique, *Valeriana Celtica*, L.	I	65
Nard celtique, *Andropogon Nardus*, L.	IV	256
—— Indien, *Andropogon Nardus*, L.	IV	256
Nasitor, *Lepidium sativum*, L.	III	155
Néflier, *Mespilus Germanica*, L.	II	342
Nénuphar blanc, *Nymphæa alba*, L.	II	397
—— jaune, *Nymphæa lutea*, L.	II	398
Nerprun, *Rhamnus catharticus*, L.	I	362
Nielle, *Nigella sativa*, L.	II	432
Noirprun, *Rhamnus catharticus*, L.	I	362
Noix vomique, *Strychnos Nux vomica*, L.	I	350
Noyer, *Juglans Regia*, L.	IV	128
Nummulaire, *Lysimachia Nummularia*, L.	I	282

O.

	tom.	pag.
ŒILLET rouge, *Dianthus Caryophyllus*, L.	II	234
Oliban, *Juniperus Lycia*, L.	IV	232
Olivier, *Olea Europæa*, L.	I	20
Orange, *Citrus Aurantium*, L.	III	393
Orcanette, *Anchusa tinctoria*, L.	I	254
Orchis à deux feuilles, *Orchis bifolia*, L.	IV	6
—— Morio, *Orchis Morio*, L.	IV	8
—— singe, *Orchis Morio*, L.	IV	8
Oreille d'homme, *Asarum Europæum*, L.	II	280
—— de rat, *Hieracium Pilosella*, L.	III	438
Orge, *Hordeum distychon*, L.	I	143
—— de mars, *Hordeum distychon*, L.	I	143
Origan, *Origanum sylvestre*, L.	III	55
Orleana terra, *Bixa Orellana*, L.	II	399
Orme, *Ulmus campestris*, L.	I	426
Ormeau, *Ulmus campestris*, L.	I	426
Orobe des Herboristes, *Ervum Ervilia*, L.	III	327
Orpin, *Sedum Telephium*, L.	II	259

		tom.	pag.
Orpin à odeur de rose, — rose,	*Rhodiola rosea*, L.	IV	217
Ortie blanche, *Lamium album*, L.		III	37
— (grande,) *Urtica dioica*, L.		IV	100
— morte, *Lamium album*, L.		III	37
Oseille ordinaire, *Rumex Acetosa*, L.		II	84
Oxalide, *Oxalis Acetosella*, L.		II	265

P.

PALME DE CHRIST, *Ricinus communis*, L.		IV	153
Pain de coucou, *Oxalis Acetosella*, L.		II	265
— de pourceau, *Cyclamen Europæum*, L.		I	276
— d'oiseau, *Sedum acre*, L.		II	261
Panais cultivé, *Pastinaca sativa*, L.		I	489
Panicaud, *Eryngium campestre*, L.		I	439
Pariétaire, *Parietaria officinalis*, L.		IV	167
Parisette, *Paris quadrifolia*, L.		II	151
Pas-d'âne, *Tussilago Farfara*, L.		III	529
Passerage (petite,) *Lepidium Iberis*, L.		III	157
Passerine, *Gypsophila struthium*; L.		II	230
Patience aquatique, *Rumex aquaticus*, L.		II	82
Pavot blanc, — des jardins, — noir,	*Papaver somniferum*, L.	II	392
— rouge, *Papaver Rhœas*, L.		II	392
Pêcher, Pêches,	*Amygdalus Persica*, L.	II	329
Petit chêne, *Teucrium Chamædrys*, L.		III	16
— poivre, *Vitex Agnus-castus*, L.		III	138
Petite Centaurée, *Gentiana Centaurium*, L.		I	435
— Ivette, *Teucrium Chamæpithys*, L.		III	12
Péragua, *Cassine Peragua*, L.		I	503
Persil, *Apium Petroselinum*, L.		I	496
— d'âne, *Chærophyllum sylvestre*, L.		I	484
— de Macédoine, *Bubon Macedonicum*, L.		I	474
— des marais, *Apium graveolens*, L.		I	497

		tom.	pag.
Pervenche,	*Vinca minor*, L.	I	398
Petasite,	*Tussilago Petasites*, L.	III	530
Peuplier noir,	*Populus nigra*, L.	IV	216
Phytolaque,	*Phytolaca decandra*, L.	II	276
Pied d'alouette,	*Delphinium Consolida*, L.	II	423
—— de chat,	*Gnaphalium dioïcum*, L.	III	514
—— de loup,	*Lycopodium clavatum*, L.	IV	345
—— de lion,	*Alchemilla vulgaris*, L.	I	218
—— de veau,	*Arum maculatum*, L.	IV	48
Piloselle,	*Hieracium Pilosella*, L.	III	438
Piment,	*Capsicum annuum*, L.	I	349
—— royal,	*Myrica Gale*, L.	IV	197
Pimprenelle d'Italie, —— des montagnes,	*Sanguisorba officinalis*, L.	I	201
Pin cultivé,	*Pinus pinea*, L.	IV	138
—— d'Écosse, —— de Genève, —— sauvage, —— suffis,	*Pinus sylvestris*, L.	IV	137
Pissenlit,	*Leontodon Taraxacum*, L.	III	433
Pistachier,	*Pistacia vera*, L.	IV	199
Pivoine,	*Poeonia officinalis*, L.	II	420
Plantain ordinaire,	*Plantago major*, L.	I	195
—— des Alpes,	*Arnica montana*, L.	III	554
Poireau,	*Allium Porrum*, L.	II	24
Poivre blanc, —— noir,	*Piper nigrum*, L.	I	54
—— sauvage,	*Vitex Agnus castus*, L.	III	138
Polygale,	*Polygala vulgaris*, L.	III	271
—— de Virginie,	*Polygala Senega*, L.	III	273
Polypode de chêne, —— ordinaire,	*Polypodium vulgare*, L.	IV	330
Pomme épineuse,	*Datura Stramonium*, L.	I	334
—— de reinette,	*Pyrus Malus*, L.	II	345
Pommier ordinaire,	*Pyrus Malus*, L.	II	345
Porreau,	*Allium Porrum*, L.	II	24
Pourpier,	*Portulacca oleracea*, L.	II	291
Prêle,	*Equisetum arvense*, L.	IV	308

	tom.	pag.
Prunes de Damas, — de France, } *Prunus domestica*, L.	II	334
Prunelle, { *Prunus spinosa*, L. / *Prunella vulgaris*, L.	II / III	336 / 72
Prunellier, *Prunus spinosa*, L.	II	336
Pulmonaire, *Pulmonaria officinalis*, L.	I	257
— de chêne, *Lichen pulmonarius*, L.	IV	384
Pulsatille, *Anemone Pulsatilla*, L.	II	441
Pyrèthre, *Anthemis Pyrethrum*, L.	III	577
Pyrole, *Pyrola rotundifolia*, L.	II	213

Q.

QUEUE DE CHEVAL, *Equisetum arvense*, L.	IV	308
— de pourceau, *Peucedanum officinale*, L.	IV	459
Quinquina, *Cinchona officinalis*, L.	I	318

R.

RACINE DE DRAK, *Dorstenia Drakæna*, L.	I	212
Radis, *Raphanus sativus*, L.	III	200
Raifort, — sauvage, } *Cochlearia Armoracia*, L.	III	162
— des Parisiens, *Raphanus sativus*, L.	III	200
Raisin, *Vitis vinifera*, L.	I	383
— d'Amérique, *Phytolaca decandra*, L.	II	276
— d'ours, *Arbutus Uva-ursi*, L.	II	212
— de renard, *Paris quadrifolia*, L.	II	151
Rapontic, *Rumex Alpinus*, L.	II	83
Rave, *Brassica Rapa*, L.	III	194
Recise, *Geum urbanum*, L.	II	372
Réglisse, *Glycyrrhiza glabra*, L.	III	336
Reine des bois, *Asperula odorata*, L.	I	178
Remords, *Scabiosa Succisa*, L.	I	169
Renouée, *Polygonum aviculare*, L.	II	144
Reprise. *Sedum Telephium*, L.	IV	259
Resine d'Euphorbe, *Euphorbia officinarum*, L.	II	300

	tom.	pag.
Rhapontic, *Rheum Rhaponticum*, L.	II	161
Rhodiole, *Rhodiola rosea*, L.	IV	218
Rhubarbe, *Rheum palmatum*, L.	II	161
— des moines, *Rumex Alpinus*, L.	I	83
— vraie, *Rheum palmatum*,	II	161
Ricin, *Ricinus communis*, L.	IV	153
Riz, *Oryza sativa*, L.	I	78
Romarin, *Rosmarinus officinalis*, L.	I	45
— sauvage, *Ledum palustre*, L.	II	206
Roquette, *Brassica Eruca*, L.	III	196
Rose à cent feuilles, *Rosa centifolia*, L.	II	359
— blanche, — musquée, } *Rosa alba*, L.	II	360
— de provins, *Rosa centifolia*, L.	II	359
— tremière, *Alcæa rosea*, L.	III	239
Roseau des Indes, *Acorus Calamus*, L.	II	65
Rosier sauvage, *Rosa canina*, L.	II	360
Romarin, *Rosmarinus officinalis*, L.	I	45
Rue des jardins, *Ruta graveolens*, L.	II	187

S.

SABINE, *Juniperus Sabina*, L.	IV	230
Safran oriental, *Crocus sativus*, L.	I	73
— des Indes, *Curcuma longa*, L.	I	7
Salicaire, *Lythrum Salicaria*, L.	II	293
Salicor, *Salicornia herbacea*, L.	I	9
Salsepareille, *Smilax Salsaparilla*, L.	IV	211
Salsifi, *Tragopogon pratense*,	III	420
— des marais, *Scorzonera humilis*, L.	III	423
Sang-dragon, *Pterocarpus Draco*, L.	III	277
Santal blanc, — citrin, } *Santalum album*, L.	I	214
Santoline, *Artemisia Contra*, L.	III	502
Sapin, *Pinus Abies*, L.	IV	140
Saponaire, *Saponaria officinalis*, L.	II	231
Sarrasin, *Polygonum Fagopyrum*, L.	II	145

		tom.	pag.
Sariette, — sarriette,	*Satureia hortensis*, L.	III	20
Sarsepareille, *Smilax Sarsaparilla*, L.		IV	211
Sassafras, *Laurus Sassafras*, L.		II	158
Savinier, *Juniperus Sabina*, L.		IV	231
Savonnière, *Saponaria officinalis*, L.		II	231
Sauge des jardins, *Salvia officinalis*, L.		I	46
Saule blanc, *Salix alba*, L.		IV	189
Saxifrage (petite), *Pimpinella Saxifraga*, L.		I	494
Scammonée d'Alep, — de Smyrne,	*Convolvulus Scammonia*, L.	I	292
Sceau de Salomon, — (grand),	*Convallaria Polygonatum*, L.	II	54
Scille, — blanche, — rouge,	*Scilla maritima*, L.	II	43
Scordium, *Teucrium Scordium*, L.		III	16
Scorzonère, *Scorzonera humilis*, L.		III	423
Scrophulaire aquatique, — plus grande,	*Scrophularia aquatica*, L.	III	102
Semencine, Semen-contra,	*Artemisia Contra*, L.	III	502
Senné d'Italie, — du Levant,	*Cassia Senna*, L.	II	179
Sénevé blanc, — noir,	*Sinapis nigra*, L.	III	198
Sermontaine, *Ligusticum Levisticum*, L.		I	468
Serpentaire de Virginie, *Arum Serpentaria*, L.		IV	39
Serpolet, *Thymus Serpillum*, L.		III	57
Sésame, *Sesamum Orientale*, L.		III	130
Séseli des boutiques, *Laserpitium Siler*, L.		I	465
— des montagnes, *Ligusticum Levisticum*, L.		I	468
Soldanelle, *Convolvulus Soldanella*, L.		I	298
Sorbier Cormier, *Cratægus Aria*, L.		II	338
— des oiseaux, — des oiseleurs,	*Sorbus aucuparia*, L.	II	340
Souci des jardins, *Calendula officinalis*, L.		III	617
Souchet odorant, *Cyperus longus*, L.		I	90

	tom.	pag.
Souchet rond, *Cyperus rotundus*, L.	I	*ibid.*
Soude, *Salicornia herbacea*, L.	I	9
Sphondyle, *Heracleum Sphondylium*, L.	I	466
Spic, *Lavandula Spica*, L.	III	26
Spica-Nard, *Andropogon Nardus*, L.	IV	256
Squine, *Smilax China*, L.	IV	211
Staphysaigre, *Delphinium Staphysagria*, L.	II	425
Stæchas, —— d'Arabie, } *Lavandula Stœchas*, L.	III	26
Storax, Styrax, —— Calamite, —— en larmes, } *Styrax officinale*, L.	II	215
Sucre, *Saccharum officinarum*, L.	I	102
Sumac, *Rhus Coriaria*, L.	I	498
Sureau, *Sambucus nigra*, L.	I	504
—— (petit), *Sambucus Ebulus*, L.	I	*ibid.*

T.

TABAC, *Nicotiana Tabacum*, L.	I	338
Tacamahaca, *Populus balsamifera*, L.	IV	216
Talictron, *Sisymbrium Sophia*, L.	III	180
Tamarin, *Tamarindus Indica*, L.	I	68
Tamarix, *Tamarix Gallica*, E.	I	507
Tanésie, Taneisie, } *Tanacetum vulgare*, L.	III	499
Tapsie, *Laserpitium latifolium*, L.	I	464
Térébinthe de Chypre, *Pistacia Terebinthus*, L.	IV	199
—— de Venise, *Pinus Larix*, L.	IV	139
Terre-mérite, *Curcuma longa*, L.	I	7
Testicule de chien, *Orchis Morio*, L.	IV	8
Thé bout, —— roux, } *Thea Bohea*, L.	II	408
—— d'Europe, *Veronica officinalis*, L.	I	25
Thym, *Thymus Serpillum*, L.	III	57
Thymelée, *Daphne Mezereum*, L.	II	132

	tom.	pag.
Tilleul, *Tilia Europæa*, L.	II	403
Torche-pin, *Pinus sylvestris*, L.	IV	137
Tormentille, *Tormentilla erecta*, L.	II	371
Tortelle, *Erysimum officinale*, L.	III	182
Tournesol, *Croton Tinctorum*, L.	IV	147
Traînasse, *Polygonum aviculare*, L.	II	144
Trèfle aigre, *Oxalis Acetosella*, L.	II	265
Trintanel, *Daphne Mezereum*, L.	II	132
Truffe, *Lycorperdon Tuber*, L.	IV	419
Tue-chien, *Colchicum autumnale*, L.	II	89
Tulipier glauque, *Magnolia glauca*, L.	II	436
Turbith, *Convolvulus Turpethum*, L.	I	294
— bâtard, — des montagnes, *Lasserpitium latifolium*, L.	I	464
Turnep, *Brassica Rapa*, L.	III	194
Turquette, *Herniaria glabra*, L.	I	414
Tussilage, *Tussilago Farfara*, L.	III	529

V.

Valériane des boutiques, *Valeriana officinalis*, L.	I	64
Vanille, *Epidendrum Vanilla*, L.	IV	24
Vélar, *Erysimum officinale*, L.	III	182
Verge-d'or, — dorée, *Solidago Virga-aurea*, L.	III	544
Vermiculaire brûlante, *Sedum acre*, L.	II	261
Véronique mâle, *Veronica officinalis*, L.	I	25
Verveine, *Verbena officinalis*, L.	I	41
Vesse-de-loup, *Lycoperdon Bovista*, L.	IV	420
Vigne, *Vitis vinifera*, L.	I	382
— blanche, *Bryonia alba*, L.	IV	166
— de Judée, — vierge, *Solanum dulcamara*, L.	I	344
— sauvage, *Solanum Dulcamara*, L.	I	344
— *Cissampelos Pareira*, L.	IV	235
Violette odorante, *Viola odorata*, L.	IV	643

	tom.	pag.
Violier jaune, *Cheiranthus Cheiri*, L.	III	184
Viorne, *Clematis Vitalba*, L.	II	447
Vulvaire, *Chenopodium Vulvaria*, L.	I	418

Y.

YÈBLE, *Sambucus Ebulus*, L.	I	504

Z.

ZÉDOAIRE longue, *Kæmpferia rotunda*, L.	I	8

Fin de la cinquième Table.

TABLE SIXIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE LATINE

DES PLANTES qui peuvent servir de nourriture au Cheval, au Bœuf, au Mouton, au Cochon, à la Chèvre, au Coq, au Dindon, au Canard, à l'Oie.

Le premier chiffre indique le *Tome*, le second la *page du Tome*.

A.

ACHILLEA Ptarmica, L. III 580
—— *Millefolium*, L. III 582
Aconitum Lycoctonum, L. II 426
Actæa spicata, L. II 388
Adoxa Moschatellina, L. II 152
Ægopodium Podagraria, L. I 498
Æsculus hippocastanum, L. II 95
Æthusa Cynapium, L. I 479
Agrimonia Eupatoria, L. II 296
Agrostema Githago, L. II 268
Agrostis spica venti, L. I 113
—— *rubra*, L. I 114
—— *stolonifera*, L. I *ibid.*
Aira aquatica, L. I 116
—— *cæspitosa*, L. I 117
—— *flexuosa*, L. I *ibid.*
—— *Alpina*, L. I *ibid.*
—— *canescens*, L. I *ibid.*
Ajuga pyramidalis, L. III 10
Alchemilla vulgaris, L. I 218
Allium oleraceum, L. II 28
—— *ursinum*, L. II 29
—— *Schœnoprasum*, L. II 30
Alisma Plantago, L. II 91
Alopecurus geniculatus, L. I 111
Alsine media, L. I 511
Alyssum incanum, L. III 166
Anagallis arvensis, L. I 282
Anchusa officinalis, L. I 254
Andromeda polifolia, L. II 208
Androsace Septentrionalis, L. I 270
Anemone Pulsatilla, L. II 441
—— *nemorosa*, L. II 443
Angelica sylvestris, L. I 470
Anthemis arvensis, L. III 576
Anthericum ramosum, L. II 47
—— *ossifragum*, L. II 48
Anthoxanthum odoratum, L. I 53
Anthyllis Vulneraria, L. III 299
Antirrhinum minus, L. III 94
Apium graveolens, L. I 497
Aquilegia vulgaris, L. II 430
Arbutus Uva ursi, L. II 212
Arctium Lappa, L. III 458
Arenaria serpillifolia, L. II 248
Arnica montana, L. III 554
Artemisia rupestris, L. III 504
—— *maritima*, L. III 503
—— *Absinthium*, L. III 505
—— *vulgaris*, L. III 506
Arundo Phragmites, L. I 138

	tome.	pag.
Asarum Europæum, L.	II	280
Asclepias Vincetoxicum, L.	I	411
Asparagus officinalis, L.	II	50
Asperugo procumbens, L.	I	262
Asperula odorata, L.	I	178
—— *tinctoria*, L.	I	178
Aster Tripolium, L.	III	539
Astragalus glyciphyllos, L.	III	360
—— *Alpinus*, L.	III	362

	tom.	pag.
Athamantha Oreoselinum, L.	I	458
—— *Libanotis*, L.	I	458
Atriplex laciniata, L.	IV	270
—— *hastata*, L.	IV	270
—— *patula*, L.	IV	270
—— *portulacoïdes*, L.	IV	270
Avena sativa, L.	I	135
—— *fatua*, L.	I	136
—— *pratensis*, L.	I	136

B.

Barrsia Alpina, L.	III	75
Berberis vulgaris, L.	II	73
Betonica officinalis, L.	III	39
Betula alba, L.	IV	98
—— *nana*, L.	IV	98
—— *Alnus*, L.	IV	99
Bidens tripartita, L.	III	479
Brassica campestris, L.	III	193
Briza media, L.	I	123
Bromus secalinus, L.	I	130
—— *arvensis*, L.	I	131
—— *tectorum*, L.	I	*ibid.*
—— *giganteus*, L.	I	*ibid.*
—— *pinnatus*, L.	I	*ibid.*
Bryonia alba, L.	IV	166

C.

Calendula officinalis, L.	III	619
Calla palustris, L.	IV	52
Callitriche verna, L.	I	11
—— *autumnalis*, L.	I	12
Caltha palustris, L.	II	466
Campanula rotundifolia, L.	I	304
—— *persicifolia*, L.	I	305
—— *latifolia*, L.	I	306
—— *Trachelium*, L.	I	*ibid.*
Cardamine pratensis, L.	III	176
Carduus nutans, L.	III	463
—— *crispus*, L.	III	*ibid.*
—— *palustris*, L.	III	*ibid.*
—— *heterophyllus*, L.	III	467
Carex vulpina, L.	IV	83
—— *muricata*, L.	IV	*ibid.*
—— *digitata*, L.	IV	85
—— *globularis*, L.	IV	*ibid.*
—— *filiformis*, L.	IV	*ibid.*
—— *capillaris*, L.	IV	86
—— *panicea*, L.	IV	87
—— *Pseudo-Cyperus*, L.	IV	*ibid.*
—— *cæspitosa*, L.	IV	*ibid.*
—— *acuta*, L.	IV	88
Carum Carvi, L.	I	493
Centaurea Cyanus, L.	III	603
—— *Scabiosa*, L.	III	604
Cerastium viscosum, L.	II	271
—— *Alpinum*, L.	II	272
Chenopodium urbicum, L.	I	416
—— *rubrum*, L.	I	*ibid.*
—— *album*, L.	I	417
—— *hybridum*, L.	I	*ibid.*
—— *viride*, L.	I	*ibid.*
—— *glaucum*, L.	I	418
—— *Vulvaria*, L.	I	*ibid.*
—— *polyspermum*, L.	I	*ibid.*
Chrysanthemum Leucanthemum, L.	III	566
Cicuta virosa, L.	I	478

	tom.	pag.
Circæa Lutetiana, L.	I	23
—— *Alpina*, L.	I	24
Cistus Helianthemum, L.	II	416
Clinopodium vulgare, L.	III	53
Cnicus oleraceus, L.	III	468
Cochlearia officinalis, L.	III	161
Cómarum palustre, L.	II	375
Convallaria maialis, L.	II	53
—— *multiflora*, L.	II	54
—— *bifolia*, L.	II	55
Convolvulus arvensis, L.	I	291
—— *sepium*, L.	I	292
Cornus sanguinea, L.	I	204
Crambe maritima, L.	III	204
Cratægus Aria, L.	II	338
—— *Oxyacantha*, L.	II	339
Crepis tectorum, L.	III	446
Cucubalus Behen, L.	II	238
——		
Cuscuta Europæa, L.	I	221
Cypripedium Calceolus, L.	IV	23
Cynoglossum officinale, L.	I	255
Cynosurus cristatus, L.	I	125

D.

Dactylis glomerata, L.	I	125
Daphne Mezereum, L.	II	132
Daucus Carotta, L.	I	432
Delphinium Consolida, L.	II	423
Dianthus Armeria, L.	II	234
—— *delthoïdes*, L.	II	235
—— *arenarius*, L.	II	236
Draba verna, L.	III	153
—— *incana*, L.	III	154

E.

Elymus arenarius, L.	I	141
Epilobium angustifolium, L.	II	109
—— *hirsutum*, L.	II	*ibid.*
—— *montanum*, L.	II	110
—— *palustre*, L.	II	*ibid.*
Equisetum fluviatile, L.	IV	309
Erica vulgaris, L.	II	122
—— *Tetralix*, L.	II	125
Erigeron uniflorum, L.	III	526
Eriophorum polystachium, L.	I	98
Ervum tetraspermum, L.	III	327
—— *hirsutum*, L.	III	*ibid.*
Erysimum officinale, L.	III	182
—— *Barbarea*, L.	III	*ibid.*
—— *Alliaria*, L.	III	183
—— *cheiranthoïdes*, L.	III	*ibid.*
Euphrasia officinalis, L.	III	78
—— *Odontites*, L.	III	*ibid.*
Euphorbia Heliosco-pia, L.	II	307
—— *palustris*, L.	II	309

F.

Fagus sylvatica, L.	IV	131
Festuca fluitans, L.	I	129
—— *elatior*, L.	I	*ibid.*
—— *rubra*, L.	I	127
—— *ovina*, L.	I	*ibid.*
Filago montana, L.	III	627
Fragaria vesca, L.	II	364
Fumaria officinalis, L.	III	268
—— *bulbosa*, L.	III	267

G.

Galeopsis Tetrahit, L.	III	38
—— *Ladanum*, L.	III	*ibid.*
Galium palustre, L.	I	181
—— *uliginosum*, L.	I	182

	tom.	pag.
Galium verum, L.	I	182
—— *Mollugo*, L.	I	183
—— *Boreale*, L.	I	184
Genista tinctoria, L.	III	285
—— *pilosa*, L.	III	*ibid.*
Gentiana Amarella, L.	I	436
Geranium cicutarium, L.	III	223
—— *sylvaticum*, L.	III	226
—— *pratense*, L.	III	*ibid.*
Geranium Robertianum, L.	III	227
—— *rotundifolium*, L.	III	228
—— *columbinum*, L.	III	*ibid.*
—— *molle*, L.	III	*ibid.*
—— *sanguineum*, L.	III	229
Glaux maritima, L.	I	392
Glechoma hederacea, L.	III	35
Gnaphalium sylvaticum, L.	III	514

H.

Hedera Helix, L.	I	382
Hedysarum coronarium, L.	III	350
—— *Onobrychis*, L.	III	351
Heracleum Sphondylium, L.	I	466
Herniaria glabra, L.	I	414
Hieracium Pilosella, L.	III	438
—— *Auricula*, L.	III	*ibid.*
—— *præmosum*, L.	III	439
—— *murorum*, L.	III	441
—— *umbellatum*, L.	III	443
Hippocrepis unisiliquosa, L.	III	341
—— *multisiliquosa*, L.	III	342
—— *comosa*, L.	III	342
Hippophaë rhamnoïdes, L.	IV	196
Hippuris vulgaris, L.	I	10
Humulus Lupulus, L.	IV	206
Hyoscyamus niger, L.	I	336
Hypericum quadrangulare, L.	III	400
—— *perforatum*, L.	III	400
—— *hirsutum*, L.	III	402
Hypochæris maculata, L.	III	451

J.

Juncus conglomeratus, L.	II	67
—— *effusus*, L.	II	*ibid.*
—— *squarrosus*, L.	II	68
—— *bulbosus*, L.	II	*ibid.*
—— *pilosus*, L.	II	69

I.

Impatiens Noli tangere, L.	III	648
Inula pulicaria, L.	III	550
—— *Helenium*, L.	III	548
—— *salicina*, L.	III	551
Iris Pseudo-Acorus, L.	I	80
Isatis tinctoria, L.	III	203

L.

Lamium album, L.	III	36
—— *purpureum*, L.	III	37
—— *amplexicaule*, L.	III	*ibid.*
Lapsana communis, L.	III	453
Laserpitium latifolium, L.	I	464
Lathræa Squamaria, L.	III	82
Lathyrus pratensis, L.	III	320
—— *sylvestris*, L.	III	321
—— *heterophyllus*, L.	III	*ibid.*
—— *palustris*, L.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
Ledum palustre, L.	II	206
Leontodum Taraxacum, L.	III	435
—— *autumnale*, L.	III	*ibid.*
Leonurus Cardiaca, L.	III	47
Lepidium latifolium, L.	III	156
—— *ruderale*, L.	III	*ibid.*
Ligusticum scoticum, L.	I	468
Ligustrum vulgare, L.	I	19
Linnæa Borealis, L.	III	123
Linum catharticum, L.	I	523
Lithospermum officinale, L.	I	252
—— *arvense*, L.	I	*ibid.*
Lolium perenne, L.	I	140
Lonicera Periclymenum, L.	I	322
—— *Xylosteum*, L.	I	323
Lotus corniculatus, L.	III	380
Lychnis Flos-cuculi, L.	II	269
—— *viscaria*, L.	II	*ibid.*
—— *dioïca*, L.	II	270
Lycopsis arvensis, L.	I	263
Lysimachia vulgaris, L.	I	280
—— *thyrsiflora*, L.	I	281
—— *Nummularia*, L.	I	*ibid.*
Lythrum Salicaria, L.	II	293

M.

Malva rotundifolia, L.	III	241
—— *sylvestris*, L.	III	242
—— *Alcœa*, L.	III	243
—— *moschata*, L.	III	*ibid.*
Matricaria suaveolens, L.	III	570
—— *Chamomilla*, L.	III	*ibid.*
Medicago falcata, L.	III	384
—— *sativa*, L.	III	*ibid.*
—— *lupulina*, L.	III	*ibid.*
Melampyrum cristatum, L.	III	80
—— *arvense*, L.	III	*ibid.*
—— *pratense*, L.	III	80
—— *sylvaticum*, L.	III	*ibid.*
Melica ciliata, L.	I	118
—— *nutans*, L.	I	*ibid.*
—— *cærulea*, L.	I	*ibid.*
Mentha arvensis, L.	III	32
—— *aquatica*, L.	III	*ibid.*
Menyanthes trifoliata, L.	I	277
Mercurialis perennis, L.	IV	219
Milium effusum, L.	I	112
Myrica Gale, L.	IV	147

N.

Nepeta Cataria, L.	III	23
Nymphæa lutea, L.	II	397

O.

Œnanthe crocata, L.	I	476
Ononis arvensis, L. var. *mitis*.	III	195
—— *arvensis*, L. var. *spinosa*,	III	*ibid.*
Origanum vulgare, L.	III	55
Ornithogalum luteum, L.	II	40
—— *minimum*, L.	II	*ibid.*
Orobus vernus, L.	III	316
Orobus tuberosus, L.	III	316
—— *niger*, L.	III	317
Ophrys ovata, L.	IV	16
Orchis Morio, L.	IV	8
—— *conopsea*, L.	IV	11
—— *latifolia*, L.	IV	10
—— *maculata*, L.	IV	11
Oxalis acetosella, L.	II	265

P.

	tom.	pag.
Papaver dubium, L.	II	393
—— *Rhœas*, L.	II	392
Paris quadrifolia, L.	II	151
Pedicularis palustris, L.	III	84
—— *Sceptrum Carolinianum*,	III	*ibid.*
—— *Lapponica*, L.	III	85
Phalaris arundinacea, L.	I	104
Phellandrium aquaticum, L.	I	477
Phleum pratense, L.	I	110
Pimpinella Saxifraga, L.	I	494
Pinus Abies, L.	IV	140
Pisum arvense, L.	III	314
—— *maritimum*, L.	III	315
Plantago major, L.	I	195
—— *media*, L.	I	*ibid.*
—— *lanceolata*, L.	I	196
—— *coronopus*, L.	I	198
—— *maritima*, L.	I	197
Poa aquatica, L.	I	119
—— *annua*, L.	I	120
—— *pratensis*, L.	I	*ibid.*
—— *angustifolia*, L.	I	*ibid.*
—— *trivialis*, L.	I	*ibid.*
—— *Alpina*, L.	I	*ibid.*
—— *compressa*, L.	I	122
Polemonium cæruleum, L.	I	302
Polygala vulgaris, L.	III	271
Polygonum Bistorta, L.	II	141
Polygonum viviparum, L.	II	141
—— *amphibium*, L.	II	142
—— *Persicaria*, L.	II	143
—— *maritimum*, L.	II	*ibid.*
—— *aviculare*, L.	II	144
—— *Fagopyrum*, L.	II	145
—— *Convolvulus*, L.	II	146
Polypodium Filix mas, L.	IV	334
—— *fragile*, L.	IV	336
Populus alba, L.	IV	215
—— *Tremula*, L.	IV	216
—— *nigra*, L.	IV	*ibid.*
Potamogeton natans, L.	I	224
Potentilla Anserina, L.	II	365
—— *fruticosa*, L.	II	*ibid.*
—— *rupestris*, L.	II	366
—— *argentea*, L.	II	367
—— *reptans*, L.	II	369
—— *verna*, L.	II	368
—— *Norwegica*, L.	II	370
Primula Farinosa, L.	I	272
Prunella vulgaris, L.	III	71
Prunus Padus, L.	II	331
—— *spinosa*, L.	II	336
Pulmonaria officinalis, L.	I	257
Pyrola rotundifolia, L.	II	213
—— *secunda*, L.	II	214
—— *uniflora*, L.	II	*ibid.*
Pyrus communis, L.	II	343
—— *Malus*, L.	II	344

R.

Ranunculus reptans, L.	II	453
—— *auricomus*, L.	II	455
—— *sceleratus*, L.	II	456
—— *acris*, L.	II	459
—— *repens*, L.	II	*ibid.*
Raphanus Raphanistrum, L.	III	200
Reseda Luteola, L.	II	297
Rhamnus catharticus, L.	I	362
—— *Frangula*, L.	I	364
Rhinanthus Crista galli, L.	III	77
Rhodiola rosea, L.	IV	217
Ribes Uva-crispa, L.	I	379
—— *rubrum*, L.	I	378
—— *nigrum*, L.	I	379
—— *Alpinum*, L.	I	*ibid.*
Rosa canina, L.	II	360
—— *spinosissima*, L.	II	358
Rubus Idæus, L.	II	361

	tom.	pag.
Rubus fruticosus, L.	II	362
—— *cæsius*, L.	II	*ibid.*
—— *saxatilis*, L.	II	363
—— *Chamæ-Morus*, L.	II	*ibid.*
Rumex crispus, L.	II	80
—— *digynus*, L.	II	83
—— *Acetosa*, L.	II	84
—— *Acetosella*, L.	II	*ibid.*

S.

Sagina procumbens, L.	I	227
Salicornia herbacea, L.	I	9
Salix pentandra, L.	IV	183
—— *amygdalina*, L.	IV	184
—— *fragilis*, L.	IV	185
—— *cinerea*, L.	IV	188
—— *Caprea*, L.	IV	*ibid.*
—— *alba*, L.	IV	*ibid.*
—— *viminalis*, L.	IV	*ibid.*
Sambucus nigra, L.	I	504
Samolus valerandi, L.	I	314
Sanguisorba officinalis, L.	I	201
Saponaria Vaccaria, L.	II	232
Satyrium viride, L.	IV	13
Saxifraga granulata, L.	II	224
Scabiosa Succisa, L.	I	169
—— *arvensis*, L.	I	170
—— *columbaria*, L.	I	*ibid.*
Scandix Cerefolium, L.	I	482
Schœnus albus, L.	I	89
Scirpus palustris, L.	I	93
—— *sylvaticus*, L.	I	97
—— *maritimus*, L.	I	96
Scleranthus annuus, L.	II	228
Scorzonera humilis, L.	III	423
Scrophularia nodosa, L.	III	101
Scutellaria galericulata, L.	III	70
Secale Cereale, L.	I	142
Sedum Telephium, L.	II	259
—— *album*, L.	II	261
—— *acre*, L.	II	*ibid.*
—— *sexangulare*, L.	II	*ibid.*
Selinum palustre, L.	I	456
Sempervivum tectorum, L.	II	312
Senecio vulgaris, L.	III	532
Serratula tinctoria, L.	III	459
—— *arvensis*, L.	III	461
Sherardia arvensis, L.	I	177
Silene nutans, L.	II	241
—— *rupestris*, L.	II	244
Sinapis arvensis, L.	III	198
Sisymbrium Sophia, L.	III	180
—— *Irio*, L.	III	181
Sium latifolium, L.	I	471
Solidago Virga aurea, L.	III	544
Solanum Dulcamara, L.	I	344
Sonchus arvensis, L.	III	426
Sorbus aucuparia, L.	II	340
Sparganium erectum, L.	IV	76
—— *natans*, L.	IV	77
Spergula arvensis, L.	II	273
Spiræa Filipendula, L.	II	336
—— *Ulmaria*, L.	II	*ibid.*
Stachys sylvatica, L.	III	41
—— *palustris*, L.	III	*ibid.*
Statice Armeria, L.	I	516
—— *Limonium*, L.	I	517
Stellaria graminea, L.	II	246
Symphytum officinale, L.	I	258

T.

Tanacetum vulgare, L.	III	499
Taxus baccata, L.	IV	233
Teucrium Scordium, L.	III	16
Thalictrum flavum, L.	II	449
—— *aquilegifolium*, L.	II	450
Thlaspi arvense, L.	III	158
—— *Bursa pastoris*, L.	III	160
Thymus Serpillum, L.	III	57
—— *acinos*, L.	III	58
Tormentilla erecta, L.	II	311
Tragopogon pratense, L.	III	420
Trientalis Europæa, L.	II	94

	tom.	pag.
Triglochin palustre, L.	II	86
—— *maritimum*, L.	II	87
Trifolium repens, L.	III	371
—— *pratense*, L.	III	372
—— *arvense*, L.	III	374
—— *montanum*, L.	III	375
—— *fragiferum*, L.	III	*ibid.*
—— *agrarium*, L.	III	376
Trifolium procumbens, L.	III	*ibid.*
—— *Melilotus officinale*, L.	III	369
Triticum repens, L.	I	146
Trollius Europæus, L.	II	462
Turritis glabra, L.	III	191
Tussilago Farfara, L.	III	529
—— *Petasites*, L.	III	530

U.

Ulmus campestris, L.	I	426
Utricularia vulgaris, L.	I	38

V.

Vaccinium Myrtillus, L.	II	119
—— *uliginosum*, L.	II	120
—— *Vitis-Idæa*, L.	II	121
—— *Oxyccocus*, L.	II	*ibid.*
Valeriana officinalis, L.	I	64
—— *Locusta*, L.	I	66
Verbascum nigrum, L.	I	332
Verbena officinalis, L.	I	41
Veronica maritima, L.	I	25
—— *spicata*, L.	I	*ibid.*
—— *officinalis*, L.	I	*ibid.*
—— *Alpina*, L.	I	26
—— *serpillifolia*, L.	I	*ibid.*
—— *Beccabunga*, L.	I	27
—— *Chamædrys*, L.	I	28
—— *arvensis*, L.	I	29
—— *agrestis*, L.	I	29
—— *hederæfolia*, L.	I	*ibid.*
—— *triphyllos*, L.	I	*ibid.*
—— *peregrina*, L.	I	30
Vicia sylvatica, L.	III	323
—— *dumetorum*, L.	III	*ibid.*
—— *Cracca*, L.	III	*ibid.*
—— *sativa*, L.	III	324
—— *sepium*, L.	III	325
Viola hirta, L.	III	643
—— *palustris*, L.	III	*ibid.*
—— *canina*,	III	644
—— *biflora*,	III	645
—— *mirabilis*, L.	III	*ibid.*
Vitis vinifera, L.	I	383

X.

Xanthium Strumarium, L.	IV	107

Fin de la sixième Table.

TABLE SEPTIÈME.

TABLE DES PLANTES COLORANTES.

CLASSE I.

MONANDRIE.

MONOGYNIE.

	PARTIES.	*COULEURS.*
Curcuma rotunda, L. . .	Racine.	Jaune.
—— *longa*, L. . . .	Racine.	Jaune.

CLASSE II.

DIANDRIE.

MONOGYNIE.

Jasminum officinale, L. .	Jeunes branches.	Vigogne dorée très-solide.
—— *fruticans*, L. .	Feuilles et brindilles.	Beau citron solide.
Ligustrum vulgare, L. .	Écorce	Jaune terne.
Phillyrea media, L. . .	Brindilles en feuilles.	Jaune tendre non solide.
Olea Europæa, L. . . .	Brindilles en feuilles.	Citron clair et vigogne dorée.
Chionanthus Virginica, L.	Feuilles.	Merde d'oie dorée et solide.
Syringa vulgaris, L. . .	Gros bois sec.	Jaune-brun.
. . . . .	Jeunes branches et épis des graines vertes.	Noisette vigogne et vigogne dorée.

	PARTIES.	COULEURS.
Veronica officinalis, L. .	Plante séchée à l'ombre.	Ronce d'Artois très-unie et solide.
——— *serpillifolia*, L.	Tiges fleuries.	Teinte blonde.
——— *Chamædrys*, L.	Plante verte.	Ronce d'Artois brillante et jaune blafard.
——— *hederæfolia*, L.	Plante verte.	Bruniture de jaune-olivâtre transparente et très-solide.
Verbena officinalis, L. .	Tiges fleuries.	Musc clair solide.
Lycopus Europæus, L. .	Feuilles et tiges fleuries.	Merde d'oie olivâtre médiocre.
Rosmarinus officinalis, L.	Brindilles en feuilles.	Jaune ravanelle opaque, et musc olivâtre.
Salvia officinalis, L. . .	Souche et tige ligneuse.	Musc terne, sale.

CLASSE III.

TRIANDRIE.

MONOGYNIE.

Crocus sativus, L. . . .	Pistil.	Jaune safran.
Iris Germanica, L. . .	Corolles.	Verte.

DIGYNIE.

Bromus secalinus, L. . .	Panicule des fleurs.	Verte.
——— *tectorum*, L. .	Feuilles, tiges et épis dans l'état purpurin qui annonce sa prochaine maturité.	Gris ardoisé, jaune brunâtre olivâtre, gris foncé, gris verdâtre.
Arundo Phragmites, L. .	Panicule des fleurs.	Verte.

CLASSE IV.

TÉTRANDRIE.

MONOGYNIE.

	PARTIES.	*COULEURS.*
Cephalanthus Occidentalis, L.	Branches.	Jaune mordoré.
Dipsacus fullonum, L. .	Racines.	Grisaille terne.
Scabiosa Succisa, L. .	Fleurs séchées.	Nuance de soufre légère.
Asperula tinctoria, L. .	Racine.	Rouge.
Galium verum, L. . . .	Écorce des racines.	Fausse écarlate ou rouge exalté.
——— *Mollugo*, L. .	Écorce des racines.	Rouge brun et rouge cannelle.
——— *Boreale*, L. . .	Feuilles et tiges vertes.	Vigogne terne et sale.
Rubia Tinctorum, L. . .	Racine.	Rouge marron très-solide.
Plantago lanceolata, L.	Feuilles vertes.	Grisaille noisette.
Sanguisorba officinalis, L.	Toute la plante.	Belle nuance de musc.
Cornus mascula, L. . .	Écorce des racines.	Noisette rosée fort solide.
. . . . .	Écorce fraîche d'une branche de dix-huit années de crue.	Jaune doré fort riche et solide.
——— *sanguinea*, L. .	Baies mûres.	Merde d'oie terne et peu solide.
——— *alba*, L. . . .	Jeunes branches.	Musc doré.

	PARTIES.	COULEURS.
Elæagnus angustifolia, L.	Brindilles en feuilles.	Noisette un peu violente.
Santalum album, L. . .	Bois.	Jaune.

DIGYNIE.

Cuscuta Europæa, L. . .	Plante.	Roux fugace.

TÉTRAGYNIE.

Ilex aquifolium, L. . .	Jeunes branches et feuilles.	Ventre de crapaud.

CLASSE V.

PENTANDRIE.

MONOGYNIE.

Lithospermum arvense, L.	Tiges fraîches fleuries.	Citron verdâtre et nankin clair.
——— *fruticosum*, L.	Racine.	Rouge.
Anchusa officinalis, L. .	Corolles.	Verte.
Symphytum officinale, L.	Feuilles et tiges fleuries.	Musc très-solide.
Borrago officinalis, L. ,	Feuilles et tiges fleuries.	Merde d'oie sale.
Lycopsis arvensis, L. .	Plante fraîche et fleurie.	Nankin clair un peu jaune mat.
Echium vulgare, L. . .	Racine ; feuilles et tiges fleuries.	Olivâtre sale ; vigogne olivâtre.
Lysimachia vulgaris, L.	Racine ; tiges fleuries.	Musc opaque solide ; gris jaunâtre.
Convolvulus arvensis, L.	Traînasses en feuilles et fleuries.	Musc clair.
——— *sepium*, L. . .	Racines.	Cannelle très-unie et solide.

	PARTIES.	COULEURS.
Campanula rotundifolia, L.	Feuilles et tiges fleuries.	Vigogne dorée.
——— *pyramidalis*, L.	Tiges fleuries.	Musc clair.
Lonicera Periclymenum, L.	Sarmens ou branches en feuilles.	Vigogne douce.
——— *Alpigena*, L. .	Jeunes branches.	Jaune abricot.
——— *cærulea*, L. . .	Jeunes branches.	Vigogne dorée.
——— *Diervilla*, L. .	Brindilles en feuilles.	Musc doré.
Verbascum phlomoïdes, L.	Feuilles et tiges fleuries.	Vigogne jaunâtre.
Hyoscyamus niger, L. .	Plante fleurie.	Olive sale solide.
Nicotiana Tabacum, L.	Feuilles cueillies mûres et séchées sans apprêt.	Musc très-beau.
. . . . .	Feuilles vertes.	Musc clair ou vigogne dorée très-solide.
Atropa Belladona, L. .	Feuilles et tiges.	Olive fade et jaunatre.
Solanum Dulcamara, L.	Sarmens.	Olive grisaille.
——— *tuberosum*, L. .	Feuilles vertes et tiges fleuries.	Citron clair.
——— *Lycopersicum*, L.	Tiges et feuilles.	Jaune passable et grisaille sale.
Capsicum annuum, L. .	Feuilles, tiges et gros fruits encore verts.	Citron.
. . . . .	Tiges, feuilles et fruits mûrs seches à l'ombre.	Jaune sale et vigogne.

	PARTIES.	COULEURS.
Genipa Americana, L. .	Baies vertes.	Noire.
Rhamnus catharticus, L.	Branches ligneuses et fraîches.	Jaune verdâtre.
. . . . .	Bois sec avec son écorce.	Mordorée tannée.
. . . . .	Brindilles sans feuilles.	Carmélite.
——— *infectorius*, L. .	Baies.	Jaune.
——— *Frangula*, L. .	Baies mûres et fraîches.	Très-beau noir transparent bleuâtre.
——— *Alaternus*, L. .	Menues branches ou brindilles en feuilles fraîches.	Jaune souci.
——— *Paliurus*, L. .	Branches fraîches et feuillées.	Jaune mordoré.
Ceanothus Americanus, L.	Branches en feuilles.	Nankin cannelle.
Celastrus scandens, L. .	Sarmens.	Jaune brun.
Evonymus Europæus, L.	Écorce du bois de neuf ans.	Noisette tendre.
. . . . .	Fruits mûrs.	Olive clair.
Ribes rubrum, L.	Petites branches ou brindilles.	Noisette rosée un peu foncée bien solide.
. . . . .	Fruits.	Nankin.
——— *nigrum*, L. . .	Fruits mûrs.	Musc foncé.
——— *Uva crispa*, L.	Branches en feuilles.	Vigogne dorée.
. . . . .	Peaux des fruits violets.	Lilas et beau violet solide.

	PARTIES.	COULEURS.
Hedera Helix, L.	Bois, feuilles.	Jaune chamois.
. . . . .	Baies mûres.	Gris olivâtre.
Vitis vinifera, L. . . .	Sarmens, pousses de l'année précédente.	Musc bien solide.
Vinca major, L.	Sarmens en feuilles.	Vigogne dorée solide.
Nerium Oleander, L. . .	Jeunes branches et feuilles.	Merde d'oie solide.

DIGYNIE.

Periploca Græca, L. . .	Tiges ou sarmens.	Jaune ravanelle opaque et musc clair doré.
Asclepias Syriaca, L. .	Feuilles et tiges.	Olive solide.
——— *Vincetoxicum*, L.	Tiges et feuilles fraîches.	Citron tendre et brillant.
Chenopodium Vulvaria, L.	Plante entière.	Citron verdâtre.
Ulmus campestris, L. var. *angustifolia*	Première et seconde écorce.	Mordorée.
Gentiana Centaurium, L.	Plante fleurie.	Jaune rougeâtre.
Eryngium campestre, L.	Feuilles vertes, tiges en boutons.	Vigogne claire.
Daucus Carotta, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Jaune verdâtre.
Athamanta Libanotis, L.	Plante fraîche.	Musc olivâtre.
Angelica sylvestris, L. .	Racines, feuilles, tiges.	Vigogne dorée.
Sium latifolium, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Vigogne foible.
Œnanthe pimpinelloïdes, L.	Tiges mûres.	Olive jaunâtre solide.

	PARTIES.	COULEURS.
Æthusa Cynapium, L. .	Feuilles et tiges fleuries.	Citron verdâtre.
Scandix odorata, L. . .	Feuilles et tiges vertes.	Merde d'oie claire.
——— *Pecten*, L. . .	Plante en graines vertes.	Citron clair.
Chærophyllum sylvestre, L.	Ombelles.	Jaune.
Thapsia villosa, L. . .	Ombelles.	Jaune.
Pastinaca sativa, L. . .	Tiges fleuries.	Vigogne dorée.
Anethum Fœniculum, L.	Tiges fleuries.	Jaune citron et ombre de jaune.

TRIGYNIE.

Rhus Coriaria, L. . . .	Jeunes tiges et feuilles vertes.	Merde d'oie.
——— *Vernix*, L. . .	Bois, écorce.	Olivâtre sale.
——— *Toxicodendrum*, L.	Brindilles.	Musc doré bien solide.
——— *Cotinus*, L. . .	Jeunes branches en feuilles.	Musc doré très-riche et solide.
Viburnum Tinus, L. . .	Brindilles ou jeunes branches fraiches.	Noisette foncée rosée.
——— *Lantana*, L. . .	Brindilles.	Vigogne dorée très-solide.
——— *Opulus*, L. . .	Branches et brindilles en seve.	Puce et presque prune.
Sambucus Ebulus, L. . .	Baies mûres et prêtes à passer à la fermentation vineuse.	Gris bleuâtre.
——— *nigra*, L. . . .	Gros bois.	Gris brun olivâtre.

	PARTIES.	COULEURS.
Sambucus nigra, L. . .	Écorce ou brindilles.	Olive jaunâtre.
. . . . .	Fleurs séchées à l'ombre.	Musc.
. . . . .	Pédicules et fleurs fraîches.	Vigogne cannelle.
. . . . .	Baies mûres fraîchement cueillies.	Bleu tendre et bleu de roi.
. . . . .	Baies mûres parvenues à la fermentation acéteuse.	Musc cannelle très-solide.
——— *racemosa*, L. .	Jeunes branches en feuilles.	Merde d'oie très-dorée.
Staphylea pinnata, L. .	Brindilles en feuilles.	Cannelle tendre brillante et solide.
Tamarix Gallica, L. . .	Brindilles fraîches.	Citron terne.
Basella rubra, L. . . .	Baies.	Violet fugace.

CLASSE VI.

HEXANDRIE.

MONOGYNIE.

Fritillaria Imperialis, L.	Feuilles, tiges défleuries.	Jaune omelette terne.
Calamus Rotang, L. . .	Suc épaissi.	Rouge.
Berberis vulgaris, L. . .	Racines, écorce, jeunes branches, feuilles.	Jaune pur et brillant, fugace.

TRIGYNIE.

Rumex Patientia, L. . .	Racines desséchées.	Musc foncé solide.
——— *sanguineus*, L. .	Plante entière.	Beau musc.

	PARTIES.	COULEURS.
Rumex maritimus, L. .	Plante entière.	Jaune.
——— *aquaticus*, L. .	Racines fraîches.	Jaune un peu rosat, et nuance olivâtre gaie et solide.
——— *Acetosa*, L. . .	Racines.	Bon musc doré.
Colchicum autumnale, L.	Fleurs.	Olive jaunâtre, brillant et solide.

CLASSE VII.

HEPTANDRIE.

MONOGYNIE.

Æsculus Hippocastanum, L.	Écorce en séve.	Jaune mordoré.
——— *Pavia*, L. . .	Branches en feuilles.	Musc-cannelle transparent.

CLASSE VIII.

OCTANDRIE.

MONOGYNIE.

Tropæolum minus ? L. . .	Tiges en feuilles, fleurs, graines.	Musc clair olivâtre.
Epilobium angustifolium, L.	Tiges en fleurs.	Vigogne dorée.
Vaccinium Myrtillus, L.	Jeunes branches en feuilles vertes.	Vigogne mordorée.
Erica vulgaris, L. . . .	Branches.	Noisette foncée.
——— *cinerea*, L. . .	Épis fleuris.	Musc-doré.
Daphne Mezereum, L. .	Tiges effeuillées.	Musc clair et doré.
——— *Laureola*, L. .	Tiges feuillées.	Vigogne claire.

TRIGYNIE.

	PARTIES.	COULEURS.
Polygonum Bistorta, L.	Racines.	Poil de castor.
——— *Persicaria*, L. .	Plante entière.	Olivâtre grisaille.
——— *Orientale*, L. .	Fleurs.	Jaune ravanelle.
——— *aviculare*, L. .	Plante entière.	Vigogne solide.
——— *Fagopyrum*, L.	Partie rouge des tiges fraîches et fleuries.	Musc tabac d'Espagne.
——— *scandens*, L. . .	Feuilles, tiges en fleurs et fruits à demi-mûrs.	Musc-nankin, presque cannelle très-solide.
——— *Convolvulus*, L.	Plante séchée à l'ombre.	Musc-nankin, citron doré très-solide et diaphane.

CLASSE IX.

ENNÉANDRIE.

MONOGYNIE.

Laurus nobilis, L. . . .	Jeunes branches en feuilles.	Musc doré.
——— *Sassafras*, L. .	Écorce.	Orangée.

CLASSE X.

DÉCANDRIE.

MONOGYNIE.

Sophora Japonica, L. .	Branches.	Citron pâle et ventre de biche terne.
Cercis Siliquastrum, L. .	Jeunes branches.	Nankin très-solide.
Cæsalpina Brasiliensis, L.	Bois.	Rouge.
——— *vesicaria*, L. .	Bois.	Rouge pourpre.

	PARTIES.	COULEURS.
Cæsalpina Sappan, L. .	Bois.	Pourpre.
Guilandina dioïca, L. .	Branches en feuilles.	Jaune-olive clair.
Ruta graveolens, L. . .	Feuilles et tiges vertes.	Citron-verdâtre et merde d'oie.
Hæmatoxylum Campechianum, L.	Bois.	Violet.
Melia Azedarach, L. . .	Branches.	Rosée.
Melastomæ species aliquot.	Baies.	Noire.
Arbutus Uva ursi, L. .	Feuilles.	Cendrée.

TRIGYNIE.

Cucubalus Behen, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Merde d'oie presque musc.

PENTAGYNIE.

Sedum Telephium, L. . .	Tiges fleuries.	Noisette-nankin clair.

DÉCAGYNIE.

Phytolacca decandra, L.	Baies mûres et fraîches.	Jaune chamois sans reflet.
. . . . .	Baies sèches.	Jaune chamois sans transparence.

CLASSE XI.

DODÉCANDRIE.

MONOGYNIE.

Asarum Europæum, L. .	Plante entière.	Musc clair olivâtre.
Lythrum Salicaria, L. .	Tiges fleuries.	Musc-marron bien solide.

DIGYNIE.

Agrimonia Eupatoria, L.	Feuilles et tiges.	Nankin doré, presque cannelle.

TRIGYNIE.

	PARTIES.	COULEURS.
Reseda Luteola, L. . . .	Plante entière verte; plante entière desséchée.	Jaune-verdâtre diaphane et charmant; jaune.
Euphorbia Cyparissias, L.	Tiges fleuries.	Merde d'oie solide.
——— *palustris*, L. .	Plante entière.	Jaune-verdâtre.

CLASSE XII.

ICOSANDRIE.

MONOGYNIE.

Philadelphus coronarius, L.	Brindilles sans feuilles.	Cannelle-rosée très solide.
Amygdalus Persica, L. .	Jeunes branches.	Cannelle claire.
. . . . .	Bois des noyaux.	Nankin riche, ou musc un peu rosé, bien solide.
Prunus Lauro-Cerasus, L.	Jeunes branches et feuilles.	Mordorée.
——— *Mahaleb*, L. . .	Branches fraîches.	Cannelle claire rosée.
——— *Armeniaca*, L.	Jeunes branches.	Cannelle dorée.
——— *Sibirica*, L. . .	Brindilles sèches.	Merde d'oie dorée.
——— *avium*, L. . . .	Bois sec.	Cannelle dorée.
——— *domestica*, L. .	Écorce.	Jaune.
. . . . .	Pruneaux.	Noisette assurée.
——— *spinosa*, L. . .	Racine.	Noisette-cannelle rosée.

	PARTIES.	COULEURS.
Prunus spinosa, L. . .	Fruits verts.	Jaune-musc.
. . . . .	Fruits mûrs.	Puce.

DIGYNIE.

Cratægus torminalis, L. .	Branches d'une année.	Musc rougeâtre fort solide.
——— *Oxyacantha*, L.	Écorce ou jeunes branches fraîches.	Jaune mat mordoré.

TRIGYNIE.

Sorbus aucuparia, L. . .	Branches de deux ans.	Nankin-coton de Siam bien solide.

PENTAGYNIE.

Mespilus Germanica, L.	Écorce en séve.	Cannelle tendre.
——— *Pyracantha*, L.	Brindilles fraîches.	Mordorée-cannelle.
Pyrus communis, L. . .	Bois et écorce d'une branche de deux ou trois ans.	Cannelle fine.
——— *Malus*, L. . . .	Bois sec.	Marron clair très-franc et solide.
Spiræa opulifolia, L. .	Brindilles sans feuilles.	Nankin-blond très-élégant et solide.
——— *Filipendula*, L.	Feuilles et tiges fleuries.	Jaune terne et grisaille foncée.
——— *Ulmaria*, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Citron jaune brillant.

POLYGYNIE.

Rosa Eglanteria, L. var. *lutea*.	Jeunes branches.	Bon musc doré clair.
——— *cinnamomea*, L.	Jeunes branches.	Nankin-cannelle.

Rosa

	PARTIES.	COULEURS.
Rosa canina, L.	Racines, gros bois.	Jaune fauve.
Rubus fruticosus, L. . .	Racines.	Bruniture ou ombre de jaune.
——— *odoratus*, L. . .	Sarmens séchés.	Vigogne noisette.
Potentilla fruticosa, L. .	Plante entière.	Marron mordoré.
——— *Anserina*, L. .	Feuilles.	Mordorée solide.
Tormentilla erecta, L. .	Racines fraîches.	Jaune, souci-verdâtre et noisette, musc très-solide.
. . . . .	Racines dépouillées de leur écorce.	Vigogne-cannelle bien solide.
Geum urbanum, L. . .	Racines.	Musc doré.
Comarum palustre, L. .	Racine.	Rouge.
Calycanthus floridus, L.	Branches.	Jaune jonquille.

CLASSE XIII.

POLYANDRIE.

MONOGYNIE.

Actæa spicata, L. . . .		
Chelidonium majus, L. .	Racine.	Jaune sale et terne.
Papaver Rhœas, L. . .	Fleurs.	Noisette.
Gambogia Gutta, L. . .	Suc épaissi.	Jaune.
Bixa orellana, L. . . .	Fécule.	Rouge.
Tilia Europæa, L. . . .	Écorce en séve.	Coton de Siam bien solide.
. . . . .	Brindilles employées au mois de mai.	Vigogne bien assurée.

	PARTIES.	COULEURS.
Cistus Helianthemum, L.	Plante jeune fleurie.	Vigogne.
. . . . .	Souche et racines.	Musc-brun très-solide.

DIGYNIE.

Pœnia officinalis, L. . .	Fleurs doubles.	Musc foncé très-solide.

TRIGYNIE.

Delphinium Consolida, L.	Corolle.	Bleue.
——— *Ajacis*, L. var. *multiplex*.	Feuilles et tiges en fleurs.	Citron verdâtre.

POLYGYNIE.

Liriodendrum tulipifera, L.	Jeunes branches en feuilles vertes.	Musc doré très-solide.
Anemone Pulsatilla, L. .	Plante entière et fleurie.	Vigogne claire assez solide.
——— *nemorosa*, L. . .	Feuilles.	Bruniture jaune.
Clematis Vitalba, L. . .	Sarmens.	Jaune.
Thalictrum flavum, L. .	Racine.	Jaune.
——— *aquilegifolium*, L.	Feuilles et tiges déjà jaunies par la maturité.	Vigogne avec reflet d'olive très-solide.
Ranunculus bulbosus, L.	Plante entière fleurie.	Vigogne.
——— *acris*, L.	Plante en fleur.	Musc olivâtre.
Helleborus fœtidus, L. .	Feuilles et tiges fleuries.	Abricot terne très-solide.
Caltha palustris, L. . .	Corolle.	Jaune.

CLASSE XIV.

DIDYNAMIE.

GYMNOSPERMIE.

	PARTIES.	*COULEURS.*
Teucrium Scorodonia, L.	Feuilles et tiges fleuries.	Jaune ravanelle assez agréable, et musc merde d'oie brillant et solide.
——— *Chamædrys*, L.	Tiges fleuries.	Jaune mat, olivâtre et solide.
Satureia hortensis, L. .	Tiges fleuries.	Jaune olivâtre, ventre de crapaud.
Nepeta Cataria, L. . . .	Feuilles et tiges fleuries.	Vigogne dorée.
Lavandula Spica, L. . .	Tronc et tiges ligneuses.	Carmélite native.
Mentha aquatica, L. . .	Feuilles et tiges.	Musc olivâtre.
Glechoma hederacea, L.	Tiges fleuries.	Merde d'oie.
Lamium purpureum, L. .	Tiges fraîches et fleuries.	Citron-verdâtre, et ronce d'Artois.
Galeopsis Ladanum, L.	Plante fleurie.	Jaune opaque, merde d'oie.
——— *Tetrahit*, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Musc clair.
. . . . .	Plante en graines, et presque sèche.	Jaune terne et musc clair très-solide.
Betonica officinalis, L. .	Feuilles et tiges fleuries.	Musc foncé.
Stachys sylvatica, L. .	Feuilles.	Jaune.

	PARTIES.	COULEURS.
Ballota nigra, L. . . .	Tiges fleuries.	Merde d'oie intense et assurée.
Marrubium vulgare, L. .	Tiges fleuries.	Jaune olivâtre.
Leonurus Cardiaca, L. .	Tiges vertes et fleuries.	Brun foncé.
——— *marrubiastrum*, L.	Plante fleurie.	Merde d'oie dorée.
Clinopodium vulgare, L.	Feuilles et tiges fleuries.	Merde d'oie tirant sur le musc.
Origanum vulgare, L. .	Sommités fleuries.	Musc.
Thymus vulgaris, L. . .	Feuilles et tiges.	Nuance olivâtre bien assurée.
——— *acinos*, L. . . .	Feuilles et tiges.	Ventre de crapaud.
Prunella vulgaris, L. . .	Plante entière fleurie.	Olive grisaille.

ANGIOSPERMIE.

Euphrasia officinalis, L.	Plante fraîche et fleurie.	Vigogne rembrunie bien solide, mais sans reflet.
——— *Odontites*, L. .	Bractées.	Rouge.
Melampyrum nemorosum, L.	Plante fleurie.	Olive-gris-sale.
——— *pratense*, L. . .	Plante fleurie.	Merde d'oie opaque.
Antirrhinum Linaria, L.	Plante fleurie.	Musc olivâtre.
——— *majus*, L. . . .	Tiges fleuries.	Vigogne solide.
——— *Orontium*, L. .	Plante entre fleurs et graines.	Beau musc-doré.
Scrophularia nodosa, L.	Tiges et feuilles.	Musc.
Bignonia Catalpa, L. . .	Branches.	Noisette rosée.

	PARTIES.	COULEURS.
Vitex Agnus-castus, L.	Branches fraîches.	Brun olivâtre et sombre.
Acanthus mollis, L. . .	Herbe.	Jaune.

CLASSE XV.

TÉTRADYNAMIE.

SILICULEUSE.

Lepidium latifolium, L.	Tiges et feuilles.	Jaunâtre.
Thlaspi arvense, L. . .	Plante en graine, encore verte.	Citron terne, et jolî musc clair très-solide.
Bursa pastoris, L. . . .	Plante entière.	Jaune terne.

SILIQUEUSE.

Erysimum officinale, L.	Plante fleurie.	Jaune olivâtre.
——— *Barbarea*, L. .	Feuilles.	Olive jaunâtre.
Cheiranthus incanus, L.	Feuilles et tiges.	Bruniture verdâtre non solide.
Isatis tinctoria, L. . .	Feuilles.	Bleue.

CLASSE XVI.

MONADELPHIE.

DÉCANDRIE.

Geranium moschatum, L.	Plante fleurie.	Jaune citron et jaune olivâtre.
——— *Robertianum*, L.	Plante fleurie.	Jaune intense mais olivâtre, et musc clair doré.

	PARTIES.	COULEURS.
Geranium rotundifolium, L.	Plante entière et fraîche.	Jaune foible et mat.
——— *sanguineum*, L.	Feuilles et tiges fleuries.	Musc doré très-solide.
Lavatera arborea, L. . .	Tiges et feuilles.	Jaune terne et verdâtre.
Hibiscus Syriacus, L. .	Bois.	Ventre de biche.
. . . . .	Fleurs purpurines.	Musc fort solide.

CLASSE XVII.

DIADELPHIE.

HEXANDRIE.

Fumaria officinalis, L. .	Plante fraîche.	Jaune franc riche.

DÉCANDRIE.

Spartium junceum, L. .	Jeunes branches.	Jaune-musc ou ombre de jaune.
——— *scoparium*, L. .	Bois.	Aurore-mordorée.
Genista tinctoria, L. .	Tiges et brindilles.	Jaune-citron et jaune foncé mais terne.
——— *pilosa*, L. . . .	Brindilles vertes.	Citron et musc-doré.
——— *Anglica*, L. . .	Sommités fleuries.	Jaune-aurore bien doré.
Ulex Europæus, L. . .	Bois.	Jaune terne.
. . . . .	Fleurs fraîches.	Jaune jonquille.
. . . . .	Fleurs sèches.	Souci riche et beau jaune franc.
Amorpha fruticosa, L. .	Branches vertes.	Jaune-olivâtre.

	PARTIES.	COULEURS.
Ononis arvensis, L. . .	Tiges fleuries.	Vigogne jaunâtre.
——— *Natrix*, L. . .	Tiges fleuries.	Merde d'oie sale.
Anthyllis Vulneraria, L.	Plante.	Jaune.
Dolichos purpureus? L. .	Semences sèches.	Nuance presque rose et couleur de chair tendre.
Lathyrus Aphaca, L. . .	Plante fraîche et fleurie.	Ronce d'Artois fort transparente.
——— *sylvestris*, L. .	Tiges défleuries.	Vigogne dorée claire.
Vicia Faba, L.	Gousses ou cosses fraîches, vides de leurs fruits.	Olivâtre terne et sale.
. . . . .	Gousses mûres et sèches.	Vert olive foncé.
Cytisus Laburnum, L. .	Jeune bois.	Ventre de biche bien solide.
——— *hirsutus*, L. . .	Brindilles en feuilles.	Olivâtre solide.
Robinia Pseudo-Acacia, L.	Bois vieux.	Musc doré.
. . . . .	Jeunes branches.	Jaune citron.
——— *hispida*, L. . .	Branches sèches.	Jaune doré.
——— *Caragana*, L. .	Branches vertes.	Vigogne claire et solide.
Colutea arborescens, L. .	Branches fraîches.	Vigogne.
——— *Orientalis*, L. .	Branches fraîches.	Musc.
Coronilla Emerus, L. . .	Jeunes branches.	Olivâtre-jaune.
——— *glauca*, L. . . .	Tiges et feuilles.	Vigogne très-belle.

	PARTIES.	COULEURS.
Hedysarum coronarium, L.	Fleurs fraîches.	Musc très-solide.
——— *Onobrychis*, L.	Feuilles vertes et tiges en boutons.	Vigogne bien solide.
. . . . .	Plante en foin sec.	Carmélite.
Indigofera tinctoria, L. .	Feuilles.	Indigo.
Galega tinctoria, L. . .	. . . . .	Bleue.
Astragalus galegiformis, L.	Tiges et feuilles.	Ventre de crapaud.
Trifolium Melilotus officinale, L.	Tiges fleuries.	Bruniture jaune.
——— *pratense*, L. . .	Plante en foin sec.	Jaune terne et olivâtre.
——— *agrarium*, L. .	Feuilles et tiges fleuries.	Ravanelle terne.
Lotus hirsutus, L. . . .	Tiges et feuilles.	Coton de Siam bien assuré.
Medicago sativa, L. . .	Plante sèche.	Chamois ou vigogne claire.

CLASSE XVIII.

POLYADELPHIE.

ICOSANDRIE.

Citrus medica, L. . . .	Jeunes branches et feuilles.	Jaune-verdâtre.
——— *Aurantium*, L. .	Brindilles et feuilles sèches.	Jaune mat et verdâtre.

POLYANDRIE.

Hypericum perforatum, L.	Plante fleurie.	Jaune doré terne.

CLASSE XIX.

SYNGÉNÉSIE.

POLYGAMIE ÉGALE.

	PARTIES.	*COULEURS.*
Scorzonera Hispanica, L.	Racines.	Vigogne solide.
Sonchus oleraceus, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Vigogne dorée.
——— *Plumieri*, L. . .	Feuilles vertes.	Vigogne dorée, transparente et très-solide.
Lactuca sativa, L. . . .	Feuilles et tiges en bourons.	Vigogne claire et dorée.
——— *Scariola*, L. . .	Plante entière.	Vigogne dorée solide.
Chondrilla juncea, L. .	Tiges fleuries.	Olivâtre foible et sale.
Hieracium umbellatum, L.	Plante.	Jaune.
Lapsana communis, L. .	Feuilles et tiges fleuries.	Jaune foible et terne.
Cichorium Intybus, L. .	Toute la plante.	Jaune pâle.
Arctium Lappa, L. . . .	Feuilles et racines.	Jaune-olivâtre vilain et sale.
Serratula tinctoria, L. .	Tiges et feuilles fanées à l'ombre.	Beau jaune franc et solide.
Cynara Scolymus, L. . .	Fanage.	Vigogne dorée bien solide.
Carthamus tinctorius, L.	Corolle.	Safran.
Bidens tripartita, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Jaune aurore.

	PARTIES.	COULEURS.
Eupatorium cannabinum, L.	Plante fleurie.	Musc doré.
POLYGAMIE SUPERFLUE.		
Tanacetum vulgare, L. .	Feuilles et tiges en boutons.	Citron opaque et musc très-assuré.
Artemisia Abrotanum, L.	Branches.	Jaune-orange mat.
——— *Absinthium*, L.	Branches sèches.	Jaune-olivâtre grisaille.
——— *vulgaris*, L. . .	Tiges et feuilles.	Merde d'oie ou musc olivâtre peu intense.
——— *Dracunculus*, L.	Tiges ligneuses.	Merde d'oie jaunâtre.
Gnaphalium sylvaticum, L.	Feuilles et tiges fleuries.	Merde d'oie solide.
Conyza squarrosa, L. .	Feuilles et tiges fleuries.	Jaune-olivâtre.
Senecio Jacobæa, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Musc – olivâtre doré.
——— *paludosus*, L. .	Tiges fleuries.	Jaune citron et musc doré.
Aster Amellus, L. . . .	Tiges fleuries.	Jaune ravanelle.
——— *Chinensis*, L. .	Feuilles et tiges en boutons.	Jaune citron.
Solidago sempervirens, L.	Tiges et feuilles.	Bruniture de jaune-olivâtre.
——— *Canadensis*, L.	Feuilles et tiges en boutons.	Citron olivâtre bien solide.
——— *Virga aurea*, L.	Feuilles et tiges fleuries.	Musc clair.
Inula dyssenterica, L. .	Fleurs.	Musc – olivâtre doré.

	PARTIES.	COULEURS.
Bellis perennis, L. . . .	Plante entière, fraîche et fleurie.	Musc clair doré.
Tagetes patula, L. . . .	Feuilles et tige commençant à fleurir.	Beau jaune citron et bruniture de jaune terne.
——— *erecta*, L. . . .	Fleurs fraîches.	Souci et cannelle.
. . . . .	Feuilles et tiges fraîches.	Beau jaune moins souci.
Anthemis Cotula, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Jaune-citron-verdâtre.
——— *tinctoria*, L. . .	Plante en fleur.	Jaune, aurore et souci.
Achillea Millefolium, L.	Tiges fleuries.	Olive foible et sale.

POLYGAMIE FRUSTRANÉE.

Helianthus annuus, L. .	Fleurs nouvellement épanouies.	Musc-jaunâtre.
Centaurea nigra, L. . .	Feuilles et tiges en boutons.	Citron mat et olive clair.
——— *Cyanus*, L. . .	Corolle.	Bleue.
——— *Scabiosa*, L. .	Feuilles et tiges fleuries.	Olive clair assuré.
——— *Jacea*, L. . . .	Tiges en feuilles.	Jaune.

POLYGAMIE NÉCESSAIRE.

Calendula arvensis, L. .	Tiges, feuilles et fleurs écrasées.	Jaune foible et terne.
Othonna cheirifolia, L. .	Feuilles et tiges vertes.	Citron-verdâtre et noisette-nankin tres-solide.
Filago arvensis, L. . . .	Plante fleurie.	Jaune opaque assez bon.

MONOGAMIE.

	PARTIES.	COULEURS.
Viola odorata, L. . . .	Fleurs.	Vert-pomme tendre et presque solide.
——— *tricolor*, L. . .	Feuilles et tiges fleuries.	Olive tendre et native.
Impatiens Balsamina, L.	Fleurs incarnates et simples.	Jaune foncé navanelle.

CLASSE XX.

GYNANDRIE.

DIANDRIE.

Satyrium nigrum, L. . .	Fleurs.	Violette.

HEXANDRIE.

Aristolochia Clematitis, L.	Feuilles et tiges en fleurs.	Jaune d'ombre.

POLYANDRIE.

Grewia Occidentalis, L.	Branches de trois ans.	Cannelle-rougeâtre bien solide.
Arum maculatum, L. . .	Baies rouges.	Cannelle dorée.

CLASSE XXI.

MONOÉCIE.

TÉTRANDRIE.

Betula alba, L.	Branche coupée depuis six mois.	Noisette douce et solide.
——— *nigra*, L. . . .	Brindilles en feuilles.	Musc-doré.

	PARTIES.	COULEURS.
Betula nana, L.	Feuilles.	Jaune.
——— *Alnus*, L. . . .	Écorce et brindilles fraiches.	Jaune ravanelle mat, et merde d'oie dorée.
Buxus sempervirens, L. .	Brindilles en feuilles vertes.	Noisette claire très-solide.
Urtica urens, L.	Tiges et feuilles.	Musc olivâtre et terne.
——— *dioïca*, L. . . .	Racines.	Paille-citron.
Morus nigra, L.	Gros bois sec.	Jaune opaque olivâtre.
——— *papyrifera*, L. .	Brindilles.	Citron mat et nuancé carmélite.
——— *tinctoria*, L. . .	Bois.	Jaune.

PENTANDRIE.

Amaranthus caudatus, L.	Fleurs.	Pourpre.
Xanthium Strumarium, L.	Plante.	Jaune.

POLYANDRIE.

Quercus Robur, L. . . .	Écorce du jeune bois coupé depuis six semaines.	Tanné, feuille-morte assez beau, et tanné clair.
——— *Ægylops*, L. . .	Cupules des glands.	Noire.
Juglans regia, L. . . .	Brou frais.	Marron foncé.
. . . . .	Écorce des racines fraiche.	Castor.
——— *nigra*, L. . . .	Écorce fraiche.	Puce-violante et inaltérable.

	PARTIES.	COULEURS.
Fagus Castanea, L. . .	Écorce fraîche.	Musc foncé.
——— *sylvatica*, L. .	Écorce fraîche.	Marron, cannelle-mordorée.
. . . . .	Brindilles.	Musc foncé.
Carpinus Betulus, L. . .	Écorce verte.	Olive sale et cannelle claire.
Corylus Avellana, L. . .	Écorce et brindilles fraîches.	Olive-jaunâtre.
Platanus acerifolius, L.	Écorce et brindilles fraîches.	Musc foncé.
Liquidambar styraciflua, L.	Brindilles en feuilles.	Jaune-verdâtre et musc-doré.

MONADELPHIE.

Pinus sylvestris, L. . .	Écorce des jeunes branches.	Nankin-coton de Siam bien solide.
——— *sylvestris*, L. var. *maritima*	Cones vides.	Noisette tendre.
——— *Larix*, L. . . .	Brindilles en feuilles.	Musc-doré.
. . . . .	Brindilles sans feuilles.	Cannelle-dorée.
——— *Abies*, L. . . .	Jeunes branches vertes.	Marron-musc agréable et solide.
Thuya Occidentalis, L. .	Branches vertes.	Jaune-jonquille.
——— *Orientalis*, L. .	Branches vertes.	Jaune.
Cupressus sempervirens, L.	Brindilles.	Citron solide, mais terne, et musc clair.
——— *disticha*, L. . .	Brindilles en feuilles.	Cannelle-dorée très-riche et solide.

	PARTIES.	COULEURS.
Croton tinctorium, L. . .	Graines.	Bleu de Hollande.
Ricinus communis, L. .	Feuilles et épis encore verts.	Citron terne et jaune d'ombre bien solide.

CLASSE XXII.

DIOÉCIE.

DIANDRIE.

Salix pentandra, L. . .	Feuilles sèches.	Jaune.
——— *vitellina*, L. . .	Brindilles.	Beau jaune et riche mordoré.
——— *Capræa*, L. . .	Écorce.	Jaune-abricot.
——— *albâ*, L.	Écorce et brindille fraîche.	Jaune terne et jaune-olive sale.
. . . . .	Bois frais écorcé.	Coton de Siam solidé et très-joli.

TRIANDRIE.

Empetrum nigrum, L. .	Baies.	Pourpre-noirâtre.

TÉTRANDRIE.

Viscum album, L. . . .	Tiges et feuilles vertes.	Jaune terne.
Hippophaë rhamnoïdes, L.	Brindilles en feuilles.	Noisette rosée.
Myrica Gale, L.	Jeunes branches en feuilles.	

PENTANDRIE.

Spinacia oleracea, L. . .	Feuilles.	Citron-verdâtre fort agréable et solide.

	PARTIES.	COULEURS.
Humulus Lupulus, L. .	Feuilles et tiges fleuries.	Cannelle-nankin.

HEXANDRIE.

Tamus communis, L. . .	Baies.	Chamois.

OCTANDRIE.

Populus alba et Tremula, L.	Écorce et brindilles.	Jaune et citron solide.
. . . . .	Gros bois.	Noisette, vigogne, nankin, musc, etc.
——— *nigra*, L. . . .	Écorce, jeunes branches.	Jonquille et jaune.
——— *balsamifera*, L.	Comme les *Populus alba et Tremula*.	

ENNÉANDRIE.

Mercurialis annua, L. .	Feuilles et tiges.	Musc clair et très-solide.

DODÉCANDRIE.

Datisca cannabina, L. .	Plante.	Jaune.

MONADELPHIE.

Juniperus Sabina, L. . .	Jeunes tiges et feuilles vertes.	Petit musc clair.
——— *communis*, L. .	Bois.	Noisette solide.
Taxus baccata, L. . . .	Bois sec.	Noisette tendre.
. . . . .	Baies rouges.	Chamois.
. . . . .	Racines.	Aurore terne, très-unie et solide.

SYNGÉNÉSIE.

SYNGÉNÉSIE.

	PARTIES.	COULEURS.
Ruscus aculeatus, L. . .	Tiges et feuilles.	Vigogne claire et solide.

CLASSE XXIII.

POLYGAMIE.

MONOÉCIE.

Valantia Aparine, L. .	Feuilles et tiges en graines.	Vigogne claire et solide.
Parietaria officinalis, L.	Feuilles et tiges fraîches.	Bruniture, gris foncé olivâtre.
Atriplex hortensis, L. var. *rubra*	Feuilles et tiges en fleurs.	Olive, jaune-verdâtre.
Acer Pseudo-Platanus, L.	Écorce.	Nuance fauve de vigogne solide.
——— *campestre*, L. .	Gros bois frais.	Noisette, coton de Siam.
. . . . .	Écorce.	Rouge-brun et marron rosé.
Celtis Australis, L. . .	Écorce et brindilles en séve.	Jaune verdoyant.

DIOÉCIE.

Gleditschia triacanthos, L.	Jeunes branches.	Vigogne blanche.
Fraxinus excelsior, L. .	Écorce verte.	Jaune-verdâtre ou vert-pomme.
. . . . .	Bois frais écorcé.	Vigogne franche et bien solide.

	PARTIES.	COULEURS.
Diospyros Lotus, L. . .	Brindilles en feuilles.	Musc bien assuré.

TRIOÉCIE.

Ficus Carica, L.	Jeunes branches fraîches.	Vigogne tendre.
. . . . .	Feuilles vertes.	Merde d'oie dorée, brillante.

CLASSE XXIV.

CRYPTOGAMIE.

FOUGÈRES.

Pteris aquilina, L. . . .	Racines fraîches.	Jaune, gris, olivâtre.
Polypodium vulgare, L.	Racines fraîches.	Nankin cannelle.

MOUSSES.

Lycopodium complanatum, L.	. . . . .	Jaune très-brillant.

ALGUES.

Lichen calcarius, L. . .	. . . . .	Rouge.
——— *fagineus*, L. . .	. . . . .	Ferrugineuse, rousse.
——— *tartareus*, L. .	. . . . .	Rouge.
——— *Parellus*, L. . .	. . . . .	Bleue.
——— *centrifugus*, L. .	. . . . .	Jaune.
——— *saxatilis*, L. .	. . . . .	Rouge.
——— *olivaceus*, L. .	. . . . .	Rousse, rouge.
——— *parietinus*, L. .	. . . . .	Cendrée.

	PARTIES.	COULEURS.
Lichen *physodes*, L. . .	. . . . .	Grise, jaunâtre.
—— *Islandicus*, L. .	. . . . .	Jaune, fauve, brune.
—— *nivalis*, L. . .	. . . . .	Violette.
—— *pulmonarius*, L.	. . . . .	Brune, rousse.
—— *furfuraceus*, L.	. . . . .	Vert-olive.
—— *fraxineus*, L. .	. . . . .	Gris-blanc.
—— *prunastri*, L. .	. . . . .	Vigogne claire et dorée.
—— *caperatus*, L. .	. . . . .	Ferrugineuse nuancée.
—— *glaucus*, L. . .	. . . . .	Gris incarnat.
—— *caninus*, L. . .	. . . . .	Ochre.
—— *sacchatus*, L. .	. . . . .	Vert-cendré.
—— *miniatus*, L. .	. . . . .	Gris-verdâtre.
—— *pustulatus*, L. .	. . . . .	Jaune.
—— *gracilis*, L. . .	. . . . .	Cendrée.
—— *rangiferinus*, L.	. . . . .	Rouille ferrugineuse.
—— *uncialis*, L. . .	. . . . .	Gris-cendré.
—— *pascalis*, L. . .	. . . . .	Vert-cendré.
—— *Rocella*, L. . .	. . . . .	Violet, lilas, rose, etc.
—— *plicatus*, L. . .	. . . . .	Rouge fauve.
—— *barbatus*, L. .	. . . . .	Ochre fauve.
—— *vulpinus*, L. . .	. . . . .	Jaune.

	PARTIES.	COULEURS.
Lichen floridus, L. . .	. . . . .	Violette.
Byssus Jolithus, L. . .	. . . . .	Jaune.

CHAMPIGNONS.

Agaricus muscarius, L.	Épiderme.	Faux jaune couleur de paille.
Boletus viscidus, L. . .	. . . . .	Olive jaunâtre, brillant et très-solide.

PALMIERS.

Areca Catecu, L.	Fruits verts.	Rouge.

Fin de la septième Table.

TABLE HUITIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE LATINE

DES SYNONYMES du Pinax de Gaspard Bauhin, *cités dans le Système des Plantes et ramenés à la nomenclature de* Linné.

Les chiffres placés à la suite de chaque synonyme du *Pinax*, indiquent la *page* de cet Ouvrage ; les chiffres de la première colonne placés après les noms de *Linné* indiquent le *Tome ;* et ceux de la seconde, la *page du Tome* où sont citées les phrases latines du *Pinax* avec leur traduction françoise (*).

A.

ABIES. pag. 504 et 505.

I.	*Pinus Picea*, L.	IV	139
II.	—— *Picea*, L. var.	IV	*ibid.*

ABROTANUM. 136.

I.	*Artemisia arborescens*, L.	III	502
III.	—— *Abrotanum*, L.	III	*ibid.*
IV.	—— *Abrotanum*, L.	—	—
VI.	—— *Abrotanum*, L. var.	—	—

(*) Cette Table présente la disposition alphabetique des Synonymes du *Pinax* de *G. Bauhin*, cités dans notre Système des Plantes et indiqués ici seulement par numéros. Ainsi on voit que le mot *Abies* qui constitue un genre dans le *Pinax*, est divisé en deux espèces, désignées dans cette Table par les chiffres romains I, II. En plaçant à la suite de chacun de ces chiffres le nom Linnéen, nous présentons ici la nomenclature de *Linné* pour cet Ouvrage, et nous renvoyons à notre Système des Plantes où nous avons donné la phrase entière du *Pinax* pour chaque espèce, avec sa traduction, et que nous ne répétons pas ici afin d'éviter un double emploi. Les *Tirets* (---) placés à la suite des noms triviaux de *Linné*, désignent que la phrase du *Pinax* à laquelle ils appartiennent, n'est pas citée dans notre Système des Plantes.

	tom.	pag.
VII. *Artemisia campestris*, L.	III	503
VIII. —— *campestris*, L. var.	—	—
ABROTANUM fœmina vulgi. 136 et 137.		
I. *Santolina Chamæ-Cyparissus*, L.	III	495
II. —— *rosmarinifolia*, L. var.	III	496
VIII. —— *rosmarinifolia*, L. var.	III	*ibid.*
IX. —— *rosmarinifolia*, L.	III	*ibid.*
X. —— *rosmarinifolia*, L. var.	III	*ibid.*
ABSINTHIUM Ponticum. 138 et 139.		
I. *Artemisia Absinthium*, L.	III	505
II. —— *Absinthium*, L.	—	—
IV. —— *Pontica*, L.	III	504
VI. —— *rupestris*, L.	III	*ibid.*
ABSINTHIUM Seriphium sive maritimum. 139.		
I. *Artemisia cærulescens*, L.	III	506
II. —— *maritima*, L. var.	III	503
III. —— *maritima*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *maritima*, L. var.	—	—
ABSINTHIUM santonicum. 139.		
I. *Artemisia Judaïca*, L.	III	501
II. —— *Judaica*, L.	III	*ibid.*
III. *Achillea Ægyptiaca*, L.	III	580
IV. *Artemisia Santonica*, L.	III	502
ABSINTHIUM montanum. 139 et 140.		
II. *Artemisia rupestris*, L. var.	III	504
III. —— *glacialis*, L.	III	*ibid.*
IV. *Achillea Clavenæ*, L.	III	580
VI. *Senecio incanus*, L.	—	—
VII. *Anthemis montana*, L.	III	577
ACACIA. 391 et 392.		
I. *Mimosa Nilotica*, L.	IV	286
II. *Spartium spinosum*, L.	III	283
ACANUS. 380.		
I. *Carduus Syriacus*, L.	III	466
ACANTHA sive BRANCA Ursina. 382 et 383.		
I. *Acanthus mollis*, L.	III	141
II. —— *spinosus*, L.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
ACANTHION. 382.		
I. *Onopordum Acanthium*, L.	III	470
II. —— *Illyricum*,	III	471
ACARNA sive ACORNA. 379.		
I. *Carlina racemosa*, L.	III	474
II. —— *lanata*, L.	III	473
III. —— *corymbosa*, L.	III	*ibid.*
IV. *Atractylis cancellata*, L.	III	475
V. *Cnicus Acarna*, L. var.	III	469
VI. —— *Acarna*, L.	III	*ibid.*
VII. *Carduus Casobonæ*, L.	III	465
ACER. 430 et 431.		
I. *Acer Pseudo-Platanus*, L.	IV	276
III. —— *platanoïdes*, L.	IV	*ibid.*
V. —— *Monspessulanum*, L.	IV	*ibid.*
ACETOSA. 114.		
I. *Rumex Acetosa*, L.	II	84
II. —— *Acetosa*, L.	II	*ibid.*
V. —— *tuberosus*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *vesicarius*, L.	II	82
VIII. —— *scutatus*, L.	II	83
X. —— *scutatus*, L. var.	II	*ibid.*
XI. —— *aculeatus*, L.	II	85
XII. —— *Bucephalophorus*, L.	II	82
XIII. —— *Acetosella*, L.	II	84
XIV. —— *Acetosella*, L. var.	II	*ibid.*
XV. —— *Acetosella*, L. var.	II	85
ACHILLEA sive MILLEFOLIUM terrestre. 140 et 141.		
I. *Achillea magna*, L.	III	581
II. —— *Millefolium*, L.	III	582
III. —— *Millefolium*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *Millefolium*, L.	—	—
V. —— *Cretica*, L.	III	582
VII. —— *tomentosa*, L.	III	579
ACHILLEA sive MILLEFOLIUM aquaticum. 141.		
I. *Phellandrium aquaticum*, L.	—	—
II. —— *aquaticum*, L. var.	I	477
III. *Myriophyllum verticillatum*, L.	IV	219

	tom.	pag.
IV. *Hottonia palustris*, L.	I	278
V. —— *palustris*, L.	I	*ibid.*
VI. *Ranunculus aquatilis*, L. var.	II	462
VII. —— *aquatilis*, L. var.	II	*ibid.*
VIII. *Myriophyllum spicatum*, L.	IV	119
IX. *Ranunculus aquatilis*, L. var.	II	462
X. —— *aquatilis*, L. var.	—	—
XI. *Utricularia vulgaris*, L.	I	38
XIII. *Callitriche verna*, L.	I	11
ACONITUM. 182, 183 et 184.		
I. *Helleborus hyemalis*, L.	II	464
II. *Aconitum Lycoctonum*, L.	II	426
III. —— *Lycoctonum*, L. var.	—	—
V. *Delphinium elatum*, L.	II	425
VI. —— *elatum* ? L.	—	—
X. *Aconitum Napellus*, L.	II	426
XI. —— *Cammarum*, L.	II	427
XII. —— *Cammarum*, L. var.	II	*ibid.*
XIII. —— *Cammarum*, L. var.	II	*ibid.*
XIV. —— *variegatum*, L.	II	*ibid.*
XVI. *Actæa spicata*, L.	II	388
XVII. *Aconitum Anthora*, L.	II	427
ACONITUM Pardalianches. 184.		
I. *Ranunculus Thora*, L.	II	455
II. —— *Thora*, L.	II	*ibid.*
ACORUS. 34.		
I. *Acorus Calamus*, L.	II	65
II. *Iris Pseudo-Acorus*, L.	I	80
ADIANTUM sive CAPILLUS VENERIS Officinarum. 355.		
I. *Adiantum Capillus Veneris*, L.	IV	339
II. *Asplenium Adiantum nigrum*, L.	IV	327
III. *Osmunda crispa*, L.	IV	315
IV. *Adiantum pedatum*, L.	IV	338
ADONIS. 178.		
II. *Adonis autumnalis*, L.	II	451
III. —— *autumnalis*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *æstivalis*, L.	II	*ibid.*

	tom.	pag.
ÆTHIOPIS. 241.		
I. *Salvia Æthiopis*, L.	I	50
AGERATUM. 221.		
I. *Achillea Ageratum*, L.	III	579
III. *Erinus Alpinus*, L.	III	120
AGNUS castus. *Voyez* VITEX.		
ALCÆA. 316 et 317.		
I. *Malva Alcæa*, L.	III	243
II. —— *moschata*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *moschata*, L.	III	*ibid.*
V. *Althæa cannabina*, L.	III	238
VI. *Hibiscus Syriacus*, L.	III	251
VII. —— *Trionum*, L.	III	253
VIII. *Althæa hirsuta*, L.	III	238
IX. *Hibiscus Sabdariffera*, L. var.	III	251
XIII. —— *Abelmoschus*, L.	III	252
ALCHIMILLA. 319 et 320.		
I. *Alchemilla vulgaris*, L.	I	218
II. —— *pentaphylla*, L.	I	219
ALCYONIUM. 368.		
XI. *Ulva pavonina*, L.	IV	402
XIV. *Zostera Oceanica*, L.	IV	54
ALLIARIA. 110.		
Erysimum Alliaria, L.	III	183
ALLIUM. 73 et 74.		
I. *Allium sativum*, L.	II	26
II. —— *Scorodoprasum*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *Ampeloprasum*, L.	II	24
VIII. —— *ursinum*, L.	II	29
IX. —— *Victorialis*, L.	II	24
X. —— *vineale?* L.	II	28
XI. —— *vineale?* L. var.	—	—
XII. —— *vineale?* L. var.	—	—
ALLIUM montanum. 74 et 75.		
I. *Allium arenarium*, L.	II	26
III. —— *oleraceum*, L.	II	28
V. —— *pallens*, L.	II	27

	tom.	pag.
VI. *Allium flavum*, L.	—	—
IX. —— *senescens*, L.	II	28
X. —— *angulosum*, L.	II	29
ALNUS. 427 et 428.		
I. *Betula Alnus*, L. var. glutinosa.	IV	99
III. —— *Alnus*, L. var. incana.	IV	*ibid.*
ALNUS baccifera. 428.		
I. *Rhamnus Frangula*, L.	I	364
III. —— *Alpinus*, L.	I	*ibid.*
ALOE. 285 et 286.		
I. *Aloë perfoliata*, L.	—	—
II. *Agave Americana*, L.	II	63
IV. *Stratiotes aloïdes*, L.	II	434
ALSINE. 250 et 251.		
I. *Veronica hederæfolia*, L.	I	29
II. —— *arvensis*, L.	I	*ibid.*
III. —— *agrestis*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *triphyllos*, L.	I	*ibid.*
VI. *Cucubalus bacciferus*, L.	II	238
VIII. *Stellaria nemorum*, L.	II	246
X. *Cerastium aquaticum*, L.	II	273
XI. *Alsine media*, L.	I	511
XII. *Arenaria serpillifolia*, L.	II	248
XIII. —— *serpillifolia*, L. var.	—	—
XV. *Androsace Septentrionalis*, L.	I	270
XVI. —— *maxima*, L.	I	*ibid.*
XVII. —— *Septentrionalis*, L.	—	—
XVIII. *Spergula nodosa*, L.	II	274
ALSINE Spergula dicta. 251.		
I. *Spergula arvensis*, L.	II	274
II. *Arenaria rubra*, L. var. maritima.	II	249
III. —— *rubra*, L. var. campestris.	II	*ibid.*
ALSINE palustris. 251.		
I. *Cerastium aquaticum*, L.	—	—
III. *Callitriche autumnalis*, L.	I	12
V. *Peplis portula*, L.	II	77
VI. *Arenaria peploïdes*, L.	II	247
VIII. *Androsace Septentrionalis*, L.	—	—

	tom.	pag.
IX. *Spergula nodosa*, L.	—	—
X. *Moërhringia muscosa*, L. var.	II	140
ALSINE Alpina. 251.		
I. *Silene rupestris*, L.	II	244
II. *Arenaria laricifolia*, L.	II	250
III. *Moërhingia muscosa*, L.	II	140
VI. *Stellaria nemorum*, L. var.	II	246
ALSINE hirsuta arvensis. 251.		
I. *Cerastium vulgatum*, L.	II	271
II. —— *viscosum*, L.	II	*ibid.*
ALTHÆA. 315 et 316.		
I. *Althæa officinalis*, L.	III	237
II. *Lavatera Thuringiana*, L.	III	246
III. *Althæa officinalis*, L. var.	III	237
IV. *Lavatera triloba*, L.	III	245
V. —— *Olbiã*, L.	III	*ibid.*
VI. *Malva Bryoniæ folia*, L.	III	241
VII. *Hibiscus palustris*, L.	III	250
VIII. *Sida Abutilon*, L.	III	235
IX. —— *Indica*, L.	III	236
ALYSSON. 232.		
I. *Marrubium Alysson*, L.	III	45
AMARANTHUS. 120 et 121.		
I. *Amaranthus caudatus*, L.	IV	114
II. *Celosia coccinea*, L.	I	389
III. —— *cristata*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *margaritacea*, L.	I	*ibid.*
V. *Amaranthus tricolor*, L.	IV	112
AMBROSIA. 137 et 138.		
I. *Ambrosia maritima*, L.	IV	109
II. *Cochlearia coronopus*, L.	III	162
AMMI. 159.		
I. *Ammi majus*, L.	I	453
II. *Bunium aromaticum*, L.	I	454
III. *Sison Ammi*, L.	I	473
AMYGDALUS. 441 et 442.		
I. *Amygdalus communis*, L. var.	II	330

	tom.	pag.
II. *Amygdalus communis*, L.	II	330
VI. *Theobroma Cacao*, L.	III	390
ARTEMISIA. 137.		
I. *Artemisia vulgaris*, L.	III	506
II. —— *vulgaris*, L. var.	—	—
ANAGALLIS terrestris. 252.		
I. *Anagallis arvensis*, L.	I	282
II. —— *arvensis*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *Monelli*, L.	I	283
IV. *Lysimachia nemorum*, L.	I	281
ANAGALLIS aquatica. 252.		
I. *Veronica Beccabunga*, L.	I	27
II. —— *Beccabunga*, L.	I	*ibid.*
III. —— *Anagallis*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *Anagallis*, L. var.	—	—
VI. *Samolus valerandi*, L.	I	314
VIII. *Veronica scutellata*, L.	I	27
ANAGYRIS et LABURNUM. 391.		
I. *Anagyris fœtida*, L.	II	173
III. *Cytisus Laburnum*, L.	III	330
IV. —— *Laburnum*, L.	III	*ibid.*
ANCHUSA. 255.		
II. *Onosma echioïdes*, L.	I	260
III. —— *echioïdes*, L.	I	*ibid.*
IV. *Anchusa tinctoria*, L.	I	254
VI. *Lithospermum fruticosum*, L.	I	253
ANEMONE latifolia simplici flore. 173 et 174.		
I. *Anemone palmata*, L.	II	442
II. —— *hortensis*, L.	II	*ibid.*
(Tous les numeros de ce genre, depuis II jusqu'à XVIII inclusivement, ne sont que des variétés de l'*Anemone hortensis*, L.		
ANEMONE tenuifolia simplici flore. 174.		
I. *Anemone Apennina*, L.	II	444
II. —— *coronaria*, L.	II	442
(Tous les numeros de ce genre, depuis II jusqu'à XXIII inclusivement, ne sont que des variétés de l'*Anemone coronaria*, L.		

	tom.	pag.
ANEMONE pleno flore. 176.		
I. *Anemone hortensis*, L.	—	—
VII. —— *palmata*, L.	—	—
VIII. —— *coronaria*, L. var.	II	442
ANEMONE sylvestris. 176.		
I. *Anemone nemorosa?* L.	—	—
II. —— *nemorosa*, L. var.	—	—
III. —— *Alpina*, L. var.	II	441
IV. —— *Baldensis*, L.	II	440
V. —— *nemorosa*, L.	II	443
ANETHUM. 147.		
I. *Anethum graveolens*, L.	I	491
III. —— *segetum*, L.	I	492
ANGELICA. 155 et 156.		
I. *Angelica Archangelica*, L.	I	469
II. —— *sylvestris*, L.	I	470
III. *Ægopodium Podagraria*, L.	I	498
IV. *Chœrophyllum aromaticum*, L.	I	484
V. *Angelica verticillaris*, L.	I	470
ANGURIA. 312.		
I. *Cucurbita Citrullus*, L.	IV	162
ANISUM. 159.		
I. *Pimpinella Anisum*, L.	I	495
ANONIS sive RESTA bovis. 388 et 389.		
I. *Ononis arvensis*, L. var. spinosa.	III	293
III. —— *minutissima*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *arvensis*, L. var. mitis.	III	294
V. —— *Natrix*, L.	III	297
VI. —— *pinguis*, L.	III	*ibid.*
ANTEUPHORBIUM. *Voyez* EUPHORBIUM.		
ANTIRRHINUM. 211 et 212.		
I. *Antirrhinum majus*, L. var.	III	96
II. —— *majus*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *majus*, L. var.	III	*ibid.*
IV. *Rhinanthus Trixago*, L.	III	77
V. *Antirrhinum Orontium*, L.	III	96
VI. —— *minus*, L.	III	94
VII. —— *origanifolium*, L.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
APARINE sive ASPERUGO. 334.		
I. *Galium Aparine*, L.	I	184
APIOS sive TITHYMALUS tuberosus. 292.		
I. *Euphorbia Apios*, L.	II	305
APIUM. 153 et 154.		
I. *Apium Petroselinum*, L.	I	496
II. —— *Petroselinum*, L. var.	I	*ibid.*
IV. *Ligusticum peregrinum*, L.	I	469
V. *Seseli elatum*, L.	I	488
VI. *Athamanta Oreoselinum*, L.	I	458
VII. *Selinum sylvestre*,	I	456
VIII. *Athamanta Oreoselinum*, L.		458
IX. *Pimpinella peregrina*, L.		495
XI. *Apium graveolens*, L.	I	497
XII. *Bubon Macedonicum*, L.	I	474
XIII. *Smyrnium Olusatrum*, L.	I	491
XIV. —— *perfoliatum*, L.	I	490
APOCYNUM. 302 et 303.		
I. *Cynanchum erectum*, L.	I	408
II. *Periploca Græca*, L.	I	406
AQUILEGIA simplex. 144.		
I. *Aquilegia vulgaris*, L.	II	330
II. —— *vulgaris*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *Alpina*, L.	II	*ibid.*
IV. *Isopyrum aquilegifolium*, L.	II	464
AQUILEGIA pleno flore. 144 et 145.		
I. *Aquilegia vulgaris*, L. var.	II	430
II. —— *vulgaris*, L. var.	—	—
III. —— *vulgaris*, L. var.	II	430
IV. —— *vulgaris*, L. var.	II	*ibid.*
V. —— *vulgaris*, L. var.	II	*ibid.*
ARACUS sive CRACCA. 345.		
I. *Vicia sativa*, L. var.	III	324
II. *Ervum hirsutum*, L.	III	327
III. —— *tetraspermum*, L.	III	*ibid.*
ARACHYDNA. 345.		
I. *Lathyrus amphycarpos*, L.	III	318

	tom.	pag.
ARBORES venenatæ. 512.		
III. *Jatropha Manihot*, L.	—	—
ARBUTUS. 460.		
I. *Arbutus Unedo*, L.	II	211
II. —— *Andrachne*, L.	II	*ibid.*
ARBUTI folio exoticæ. 460.		
I. *Jambolifera pedunculata*, L.	II	113
ARGEMONE. 172.		
I. *Papaver hybridum*, L.	II	391
II. —— *Argemone*, L.	II	392
III. —— *Alpinum*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *Alpinum*, L.	II	*ibid.*
ARISARUM. 196.		
I. *Arum Arisarum*, L.	IV	49
II. —— *Arisarum*, L.	IV	*ibid.*
IV. —— *tenuifolium*, L.	IV	*ibid.*
ARISTOLOCHIA. 307.		
I. *Aristolochia rotunda*, L.	IV	39
II. —— *rotunda*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *longa*, L.	IV	40
IV. —— *longa*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *Clematitis*, L.	IV	*ibid.*
VI. —— *Bætica*, L.	IV	38
VII. —— *Pistolochia*, L.	IV	39
VIII. —— *sempervirens*, L.	IV	38
IX. —— *Maurorum*, L.	IV	*ibid.*
ARUM. 195.		
I. *Arum maculatum*, L.	IV	48
II. —— *maculatum*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *maculatum*, L.	IV	*ibid.*
VI. —— *Colocasia*, L.	IV	47
ARUNDO odorata. 17.		
III. *Andropogon Nardus*, L.	IV	256
ARUNDO inodora. 17.		
I. *Arundo Phragmites*, L.	I	138
II —— *Donax*, L.	I	*ibid.*
ARUNDO Indica. 18 et 19.		
I. *Arundo Bambos*, L.	I	138

	tom.	pag.
II. *Saccharum officinale*, L.	I	102
VII. *Fucus buccinalis*, L.	IV	399
IX. *Canna Indica*, L.	I	3
ASARUM. 197.		
I. *Asarum Europæum*, L.	II	280
II. *Tussilago Alpina*, L.	III	529
ASCLEPIAS. 303.		
I. *Asclepias Vincetoxicum*, L.	I	411
II. —— *nigra*, L.	I	412
IV. —— *variegata*, L.	I	303
ASPARAGUS folio molli. 489 et 490.		
I. *Asparagus officinalis*, L. var.	II	50
II. —— *officinalis*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *officinalis*, L. var.	II	*ibid.*
ASPARAGUS Corruda dictus. 490.		
I. *Asparagus acutifolius*, L.	II	551
II. —— *aphyllus*, L.	II	*ibid.*
III. —— *albus*, L.	II	*ibid.*
ASPERULA. 334.		
I. *Asperula odorata*, L.	I	178
II. —— *arvensis*, L.	I	*ibid.*
IV. *Sherardia muralis*, L.	I	177
ASPHODELUS. 28 et 29.		
I. *Asphodelus ramosus*, L. var.	II	46
II. —— *ramosus*, L. var.	II	*ibid.*
V. —— *luteus*, L.	II	45
VII. —— *fistulosus*, L.	II	46
VIII. *Anthericum ossifragum*, L.	II	48
X. —— *calyculatum*, L.	II	*ibid.*
ASPLENIUM sive SCOLOPENDRIUM. 354.		
Asplenium Ceterach, L.	IV	325
ASTER Atticus luteus. 266 et 267.		
I. *Buphthalmum spinosum*, L.	III	589
II. *Carpesium cernuum*, L.	III	518
III. *Inula odorata*, L.	III	549
IV. *Buphthalmum salicifolium*, L.	III	590
V. *Inula hirta*, L.	III	551

	tom.	pag.
VI. *Inula salicina*, L.	III	551
VIII. *Buphthalmum grandiflorum*, L.	III	590
IX. *Inula ensifolia*, L.	III	552
XI. —— *montana*, L.	III	*ibid.*
XII. *Buphthalmum maritimum*, L.	III	589
ASTER Atticus cæruleus. 267.		
I. *Aster Amellus*, L.	III	539
II. —— *Alpinus*, L. var.	III	558
III. —— *Alpinus*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *Alpinus*, L. var.	III	*ibid.*
V. —— *acris*, L.	III	540
ASTRAGALUS. 351.		
I. *Astragalus Syriacus*, L.	III	361
II. *Phaca Bætica*, L.	III	357
IV. *Astragalus Monspessulanus*, L.	—	—
V. *Anthyllis montana*, L.	III	299
VI. *Orobus tuberosus*, L.	III	316
ATRACTYLIS. 379.		
I. *Carthamus lanatus*, L.	III	476
ATRIPLEX hortensis. 119.		
I. *Atriplex hortensis*, L.	IV	269
II. —— *hortensis*, L.	IV	*ibid.*
ATRIPLEX silvestris. 119.		
I. *Chenopodium album*, L.	I	417
II. —— *album?* L.	—	—
III. —— *rubrum*, L.	I	416
IV. —— *murale*, L.	I	*ibid.*
V. *Atriplex rosea*, L.	IV	269
VI. *Blitum virgatum*, L.	I	12
VII. —— *capitatum*, L.	I	*ibid.*
VIII. *Chenopodium Vulvaria*, L.	I	418
IX. *Atriplex patula*, L.	IV	270
ATRIPLEX maritima. 120.		
I. *Atriplex laciniata*, L.	IV	*ibid.*
III. —— *maritima*, L.	IV	*ibid.*
AVENA. 23.		
I. *Avena sativa*, L.	I	135

	tom.	pag.
II. *Avena sativa*, L.	I	135
III. —— *nuda*, L.	I	*ibid.*
AURICULA MURIS *sive* ECHIUM SCORPIOÏDES. 253 et 254.		
I. *Myosotis scorpioïdes*, L. var. *arvensis.*	I	251
II. —— *scorpioïdes*, L. var. *arvensis.*	—	—
III. —— *scorpioïdes*, L. var. *palustris.*	I	252
AZEDARACTH. 415.		
I. *Melia Azedarach*, L.	II	196

B.

BALSAMINA. 306.		
I. *Momordica Balsamina*, L.	IV	159
II. *Impatiens Balsamina*, L.	III	648
III. —— *Noli-Tangere*, L.	III	*ibid.*
BALSAMUM. 400 et 401.		
VII. *Toluifera Balsamum*, L.	II	188
BARBA CAPRÆ. 163 et 164.		
I. *Spiræa Aruncus*, L.	II	356
II. —— *Ulmaria*, L.	II	*ibid.*
BARBA JOVIS. 397.		
Anthyllis Barba Jovis, L.	III	300
BATATAS. 91.		
VIII. *Convolvulus Batatas*, L.	I	293
BEHEN album et rubrum. 235.		
I. *Centaurea Behen*, L.	III	605
BELLIS. 261.		
I. *Chrysanthemum Leucanthemun*, L.	III	566
II. —— *atratum*, L.	III	565
IV. —— *atratum*, L. var.	III	*ibid.*
V. —— *Leucanthemum*, L. var.	III	566
VI. *Doronicum bellidiastrum*, L.	III	556
VII. *Bellis perennis*, L.	III	559
VIII. —— *annua*, L.	III	*ibid.*
BELLIS hortensis. 261 et 262.		
I. *Bellis perennis*, L. var.	III	*ibid.*
II. —— *perennis*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *annua*, L.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
BELLIS cærulea. 262.		
I. *Globularia nudicaulis*, L.	I	166
II. —— *vulgaris*, L.	I	165
III. —— *spinosa*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *cordifolia*, L.	I	*ibid.*
BELLIS lutea. 262.		
I. *Chrysanthemum segetum*, L.	III	568
III. —— *Myconi*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *flosculosum*, L.	III	569
V. *Saponaria lutea*, L.	II	232
BERBERIS. 454.		
I. *Berberis vulgaris*, L.	II	73
III. —— *Cretica*, L.	II	*ibid.*
BETA minor. 118.		
I. *Beta Cycla*, L.	—	—
II. —— *Cycla*, L.	I	420
III. —— *vulgaris*, L. var.	I	419
IV. —— *vulgaris*, L. var.	I	*ibid.*
V. *Rumex spinosus*, L.	II	84
VII. *Beta maritima*, L.	I	440
BETA major foliis latissimis. 118.		
I. *Beta vulgaris*, L. var.	I	419
II. —— *vulgaris*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *vulgaris*, L. var.	I	*ibid.*
BETONICA. 235.		
I. *Betonica officinalis*, L.	III	39
II. —— *officinalis*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *alopecuros*, L.	III	40
BETULA. 427.		
Betula alba, L.	IV	98
BISTORTA. 192.		
I. *Polygonum Bistorta*, L.	II	141
II. —— *Bistorta*, L. var.	II	*ibid.*
IV. —— *viviparum*, L.	II	*ibid.*
V. —— *viviparum*, L.	II	*ibid.*
BLATTARIA. 240 et 241.		
I. *Verbascum Blattaria*, L.	I	333

	tom.	pag.
II. *Verbascum Blattaria*, L. var.	I	333
IV. —— *phœniceum*, L.	I	332
BLITUM. 118.		
I. *Amaranthus oleraceus*, L.	IV	113
II. —— *viridis*, L.	IV	*ibid.*
III. *Chenopodium polyspermum*, L.	I	418
IV. *Amaranthus Blitum?* L.	—	—
V. —— *Blitum*, L.	IV	113
BOTRYS. 138.		
I. *Chenopodium Botrys*, L.	I	417
II. —— *ambrosioïdes*, L.	I	*ibid.*
III. *Teucrium Botrys*, L.	III	12
BRANCA URSINA, *Voyez* ACANTHA.		
BRASSICA capitata. 111.		
I. *Brassica oleracea*, L. var. *capitata.*	III	194
IV. —— *oleracea*, L. var. *rubra.*	III	*ibid.*
V. —— *oleracea*, L. var. *gongylodes.*	III	*ibid.*
VI. —— *oleracea*, L. var. *Napo-Brassica.*	III	*ibid.*
VII. —— *oleracea*, L. var. *botrytis.*	III	*ibid.*
BRASSICA non capitata. 111.		
I. *Brassica oleracea*, L. var. *viridis.*	III	*ibid.*
III. *Bunias spinosa*, L.	III	201
V. *Arum esculentum*, L.	IV	47
BRASSICA crispa. 111 et 112.		
I. *Brassica oleracea*, L. var. *Sabauda.*	III	194
III. —— *oleracea*, L. var. *sabellica.*	III	*ibid.*
BRASSICA Apii folio. 112.		
II. *Brassica oleracea*, L. var. *selenisia.*	III	*ibid.*
BRASSICA sylvestris. 112.		
III. *Crambe maritima*, L.	III	204
IV. *Brassica Orientalis*, L.	III	193
V. —— *arvensis*, L.	III	*ibid.*
VII. *Turritis glabra?* L.	—	—
VIII. —— *glabra*, L.	III	191
IX. —— *hirsuta*, L.	—	—
BRUNELLA. 260 et 261.		
I. *Prunella vulgaris*, L.	III	71

	tom.	pag.
II. *Prunella laciniata*, L.	III	72
III. —— *hyssopifolia*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *grandiflora*, L.	III	71
V. —— *laciniata*, L. var.	III	*ibid.*
BRYONIA. 297.		
I. *Bryonia alba*, L. var.	IV	166
II. —— *alba*, L.	IV	*ibid.*
III. —— *Cretica*, L.	IV	167
IV. *Tamus communis*, L.	IV	209
V. —— *communis*, L.	IV	*ibid.*
BUGLOSSUM sativum. 256.		
I. *Borrago officinalis*, L.	I	261
II. *Anchusa sempervirens*, L.	I	255
III. —— *officinalis*, L.	I	253
V. —— *angustifolia*, L.	I	254
BUGLOSSUM sylvestre. 256 et 257.		
I. *Anchusa officinalis*, L.	—	—
II. *Lycopsis arvensis*, L.	I	263
V. *Asperugo procumbens*, L.	I	262
BULBOCASTANUM. 162.		
I. *Bunium Bulbocastanum*, L.	I	434
II. *Chærophyllum bulbosum*, L.	—	—
BULBUS eriophorus. 47.		
II. *Scilla hyacinthoïdes*, L.	II	44
BUPHTALMUM. 134 et 135.		
I. *Anthemis tinctoria*, L.	III	578
II. —— *Valentina*, L. var.	III	577
III. —— *Valentina*, L.	III	*ibid.*
V. *Anacyclus Valentinus*, L.	III	574
BUPLEVRON. 278.		
I. *Buplevrum rigidum*, L.	I	445
II. —— *falcatum*, L.	I	444
III. —— *junceum*, L.	—	—
BURSA PASTORIS foliis sinuatis. 108.		
I. *Thlaspi Bursa pastoris*, L. var.	III	160
II. —— *Bursa pastoris*, L.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
III. *Thlaspi Bursa pastoris*, L. var.	III	160
IV. *Iberis nudicaulis*, L.	III	165
BURSA PASTORIS foliis integris, loculis oblongis. 108. et 109.		
I. *Draba muralis*, L.	III	153
II. —— *verna*, L.	III	*ibid.*
III. —— *hirta*, L.	III	*ibid.*
IV. *Arabis Thaliana*, L.	III	190
V. —— *Thaliana*, L.	—	—
BUXUS. 471.		
I. *Buxus sempervirens*, L. var. *arborea.*	IV	100
II. —— *sempervirens*, L. var. *suffruticosa.*	IV	*ibid.*
III. *Polygala Chamæ-Buxus*, L.	III	273

C.

CACALIA. 198 et 199.		
I. *Tussilago frigida*, L.	III	529
II. *Cacalia Alpina*, L. var.	III	484
III. —— *Alpina*, L. var.	III	*ibid.*
CALAMINTHA 228 et 229.		
I. *Melissa Cretica*, L.	III	61
II. —— *Nepeta*, L.	III	*ibid.*
III. —— *Calamintha*, L.	III	60
IV. —— *grandiflora*, L.	III	*ibid.*
VI. *Mentha arvensis*, L.	III	33
CALTHA. 275 et 276.		
I. *Calendula officinalis*, L.	III	619
II. —— *officinalis*, L. var.	—	—
III. —— *officinalis*, L. var.	III	619
IV. —— *officinalis*, L. var.	III	*ibid.*
V. —— *officinalis*, L. var.	III	*ibid.*
VII. —— *arvensis*, L.	III	*ibid.*
IX. *Caltha palustris*, L.	II	466
X. —— *palustris*, L. var.	II	*ibid.*
CAMPANULA hirsuta. 94 et 95.		
I. *Campanula latifolia*, L.	I	306
II. —— *rapunculoïdes*, L.	I	*ibid.*

	tom.	pag.
IV. *Campanula Medium*, L.	I	308
V. —— *laciniata*, L.	I	309
VI. —— *rhomboïdea*, L.	I	306
VII. —— *Trachelium*, L.	I	*ibid.*
VIII. —— *rapunculoïdes*, L.	—	—
X. —— *thyrsoïdea*, L.	I	307
XI. —— *barbata*, L.	I	308
XIII. —— *Alpina*, L.	I	*ibid.*
XV. —— *petræa*, L.	I	307
XVI. —— *graminifolia*, L.	I	306
XVII. —— *glomerata*, L.	I	307
XX. *Trachelium cæruleum*, L.	I	313
CAMPHORA officinarum. 500.		
I. *Laurus Camphora*, L.	II	156
CAMPHORATA. 486.		
I. *Camphorosma Monspeliensis*, L.	I	217
II. —— *glabra*, L.	I	218
III. *Polycnemum arvense*, L.	I	72
CANNABIS. 320.		
I. *Cannabis sativa*, L.	IV	205
II. *Acnida cannabina*, L.	IV	*ibid.*
III. *Cannabis sativa*, L.	IV	*ibid.*
CAPPARIS. 480.		
I. *Capparis spinosa*, L.	II	383
II. —— *spinosa*, L. var.	II	*ibid.*
V. *Zygophyllum Fabago*, L.	II	195
CAPSICUM *seu* PIPER Indicum. 101, 102 et 103.		
I. *Capsicum annuum*, L.	I	349
II. —— *annuum*, L. var.	—	—
VII. —— *grossum*, L.	I	350
CARDAMOMUM. *Voyez* GRANA PARADISI.		
CARDUUS Cirsium dictus. *Voyez* CIRSIUM.		
CARDUUS lacteus. *Voyez* SILYBUM.		
CARDUUS sphærocephalus. 381 et 382.		
I. *Echinops sphærocephalus*, L.	III	633
II. —— *Ritro*, L.	III	*ibid.*
III. —— *spinosus*, L.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
CARDUUS tomentosus capitulo latiore. 382.		
I. *Echinops strigosus ?* L.	III	634
III. *Centaurea galactites*,	III	612
CARDUUS aliquot exotii. 384.		
I. *Cactus Melocactus*, L.	II	319
V. *Bromelia Ananas*, L.	II	7.
CARDUUS spinosissimus. 385.		
I. *Carduus nutans*, L.	III	463
III. —— *crispus*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *lanceolatus*, L.	III	*ibid.*
CARDUUS stellatus. 387.		
III. *Centaurea Calcitrapa*, L.	III	609
IV. —— *solstitialis*, L.	III	*ibid.*
CARVI. 158.		
I. *Carum Carvi*, L.	I	493
II. *Ferula nodiflora*, L.	I	463
VI. *Thapsia Asclepium*, L.	I	489
CARYOPHYLLATA. 321 et 322.		
I. *Geum urbanum*, L.	II	372
II. —— *urbanum*, L. var.	—	—
III. —— *urbanum*, L. var.	—	—
IV. —— *rivale*, L.	II	373
V. —— *rivale*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *montanum*, L.	II	*ibid.*
VII. —— *montanum*, L. var.	II	*ibid.*
VIII. —— *reptans*, L.	II	*ibid.*
IX. —— *Anemone narcissiflora ?* L.	II	444
CARYOPHYLLUS pleno flore. 207.		
I. *Dianthus Caryophyllus*, L. var.	II	235
II. —— *Caryophyllus*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *Caryophyllus*, L. var.	II	*ibid.*
CARYOPHYLLUS hortensis simplex. 208.		
I. *Dianthus Caryophyllus*, L. var.	II	235
II. —— *arboreus*, L.	II	237
V. —— *delthoïdes*, L.	II	235
CARYOPHYLLUS barbatus et Prolifer. 208 et 209.		
I. *Dianthus barbatus*, L. var. *flore pleno.*	—	—

	tom.	pag.
III. *Dianthus barbatus*, L.	II	233
IV. —— *barbatus*, L. var.	II	*ibid.*
V. —— *Armeria*, L.	II	234
VI. —— *prolifer*, L.	II	*ibid.*
VII. —— *diminutus*, L.	II	*ibid.*
CARYOPHYLLUS sylvestris. 209.		
I. *Dianthus Carthusianorum*, L.	II	234
II. —— *Carthusianorum*, L. var.	—	—
III. —— *Caryophyllus*, L. var.	II	235
IV. —— *Alpinus*, L.	II	236
V. —— *Alpinus*, L.	II	237
VI. —— *arenarius*, L.	II	236
VIII. *Aphyllanthes Monspeliensis*, L.	II	23
IX. *Dianthus Virginicus*, L.	II	237
XI. *Cucubalus Pumilio*, L.	II	239
CARYOPHYLLUS simplex laciniatus. 209 et 210.		
III. *Dianthus superbus*, L.	II	236
VI. —— *plumarius*, L.	II	*ibid.*
VII. *Lychnis Flos cuculi*, L.	II	269
VIII. —— *Flos cuculi*, L. var.	II	*ibid.*
CARYOPHYLLUS holostius arvensis. 210.		
I. *Cerastium arvense*, L.	II	271
II. —— *tomentosum*, L.	II	273
III. —— *tomentosum*, L. var.	II	*ibid.*
IV. *Holosteum umbellatum*, L.	I	150
V. *Stellaria holostea*, L.	II	246
VI. —— *graminea*, L.	II	*ibid.*
CARYOPHYLLUS holostius Alpinus. 210.		
I. *Cerastium latifolium*, L.	II	273
II. *Stellaria graminea*, L. var.	II	246
III. *Silene rupestris*, L. var.	II	244
IV. *Cerastium tomentosum*, L.	—	—
CARYOPHYLLUS montanus. 211.		
I. *Statice Armeria*, L.	II	516
II. —— *Armeria*, L. var.	II	517
CARYOPHYLLUS saxatilis. 211.		
I. *Gypsophila fastigiata*, L.	II	230
II. —— *repens*, L.	II	229

	tom.	pag.
IV. *Silene saxifraga*, L.	II	245
V. *Gypsophila saxifraga*, L.	II	231
VI. *Arenaria tetraquetra*, L. var.	II	247
IX. *Gypsophila muralis*, L.	II	230
CARYOPHYLLUS aromaticus. 410		
I. *Caryophyllus aromaticus*, L.	II	409
CASSIA nigra *seu* Fistulosa. 403.		
I. *Cassia fistulosa*, L.	II	178
II. —— *Javanica*, L.	II	180
III. *Tamarindus Indica*, L.	I	68
CASSIA *sive* CANELLA. *Voyez* CINNAMOMUM.		
CASTANEA. 418 et 419.		
I. *Fagus Castanea*, L. var.	IV	130
II. —— *Castanea*, L.	IV	*ibid.*
IV. *Æsculus Hippocastanum*, L.	II	95
VIII. *Bixa orellana*, L.	II	399
CAUCALIS. 152 et 153.		
I. *Tordylium maximum*, L.	—	—
III. *Caucalis latifolia*, L.	I	450
IV. ---- *grandiflora*, L.	I	449
V. —— *leptophylla*, L.	I	*ibid.*
VI. *Daucus muricatus*, L.	I	453
VII. *Tordylium anthriscus*, L.	I	448
VIII. —— *nodosum*, L.	I	449
IX. —— *peregrinum*, L.	I	448
XI. *Daucus muricatus*, L. var. *maritima*.	I	453
CEDRUS conifera. 490.		
I. *Pinus Cedrus*, L.	IV	139
CENTAURIUM minus. 278.		
I. *Gentiana Centaurium*, L.	I	435
II. —— *spicata*, L.	I	*ibid.*
III. *Chlora perfoliata*, L.	II	117
IV. *Gentiana filiformis*, L.	I	437
CEPA. 71 et 72.		
I. *Allium Cepa*, L.	II	29
II. —— *fistulosum*, L.	II	30
VII. —— *Ascalonicum*, L.	II	28

	tom.	pag.
CEPÆA. 288.		
I. *Sedum Cepœa*, L.	II	260
CERASUS. 449, 450 et 451.		
I. *Prunus Cerasus*, L. var. *Capronia.*	II	332
II. —— *avium*, L. var. *Bigarella.*	II	334
III. —— *Cerasus*, L. var. *austera.*	II	332
IV. —— *avium*, L. var. *Duracina.*	II	334
V. —— *Cerasus*, L. var. *Juliana.*	II	332
VI. —— *Cerasus*, L. var. *dulçis.*	II	*ibid.*
VII. —— *avium*, L.	II	334
IX. —— *Cerasus*, L. var. *rosea.*	II	332
X. —— *Cerasus*, L. var. *plena.*	II	*ibid.*
XI. —— *Lauro-Cerasus*, L.	II	*ibid.*
XII. —— *Cerasus*, L. var. *pumila.*	II	*ibid.*
XIII. —— *Cerasus*, L. var. *avium.*	II	*ibid.*
XIV. —— *Padus*, L.	II	331
XV. —— *Mahaleb*, L.	II	332
CERATIA *sive* SILIQUA. 402.		
I. *Ceratonia Siliqua*, L.	IV	299
III. *Cercis Siliquastrum*, L.	II	174
V. *Erythrina corallodendron*, L.	III	278
CERINTHE *sive* CYNOGLOSSUM montanum. 257 et 258.		
I. *Cerinthe major*, L.	I	259
II. —— *major*, L. var.	I	*ibid.*
IV. —— *minor*, L.	I	260
CHÆROPHYLLUM. 152.		
I. *Scandix Cerefolium*, L.	I	482
II. *Chœrophyllum temulum*, L.	I	484
III. *Aphanes arvensis*, L.	I	219
CHAMÆCERASUS spuria. 451.		
I. *Lonicera Alpigena*, L.	I	323
II. —— *nigra*, L.	I	322
III. —— *cœrulea*, L.	I	323
IV. —— *Xylosteum*, L.	I	*ibid.*
CHAMÆCISTUS. 465 et 466.		
I. *Cistus Helianthemum*, L.	II	416
III. *Saxifraga Hirculus*, L.	II	224
IV. *Cistus pilosus*, L. var.	—	—

	tom.	pag.
V. *Cistus pilosus*, L.	II	416
VII. —— *canus*, L.	II	413
IX. *Azalea procumbens*, L.	I	287
X. *Rhododendron Chamæ-Cistus*, L.	II	207
XI. *Cistus serpillifolius*, L.	II	415
XII. —— *Fumana*, L.	II	413
CHAMÆDRYS. 248 et 249.		
II. *Teucrium Chamædrys*, L.	III	16
III. —— *Chamædrys*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *spinosum*, L.	III	18
V. *Dryas octopetala*, L.	—	—
VI. *Pedærota Bonarota*, L.	I	31
VII. *Veronica aphylla*, L.	I	26
VIII. *Rhinanthus Trixago*, L.	III	77
IX. *Veronica Austriaca*, L.	I	28
XI. —— *latifolia*, L.	I	*ibid.*
XII. —— *Teucrium*, L.	—	—
XIV. —— *Teucrium*, L.	I	27
XV. —— *Chamædrys*, L.	I	28
XVI. —— *pilosa*, L.	I	27
XVII. —— *biloba*, L.	I	29
XVIII. —— *prostrata*, L.	I	27
XIX. —— *montana*, L.	I	28
CHAMÆGENISTA. 395 et 396.		
I. *Genista pilosa*, L.	III	285
II. —— *sagittalis*, L.	III	284
III. —— *tridentata*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *pilosa*, L.	III	285
CHAMÆIRIS. 33.		
I. *Iris biflora*, L.	I	80
IV. — *pumila*, L.	I	*ibid.*
V. — *pumila*, L.	—	—
VI. — *pumila*, L.	—	—
IX. — *pumila*, L.	—	—
XIII. — *pumila*, L.	—	—
XVI. — *pumila*, L.	—	—
CHAMÆLEA. 462.		
I. *Cneorum tricoccos*, L.	I	69
II. *Daphne Alpina*, L.	II	133

	tom.	pag.
CHAMÆLEON *sive* CARLINA. 379 et 380.		
I. *Carlina acaulis*, L.	III	473
II. —— *acaulis*, L. var.	—	—
III. *Atractylis gummifera*, L.	III	475
IV. *Carduus acaulis*, L.	III	468
V. *Cnicus spinosissimus*, L.	III	469
VI. *Carthamus corymbosus*, L.	III	477
CHAMÆLEUM *et* COTULA. 135 et 136.		
I. *Matricaria Chamomilla*, L.	III	570
II. *Anthemis nobilis*, L.	III	576
III. —— *altissima*, L.	III	575
V. —— *nobilis*, L.	III	576
VI. *Anacyclus aureus*, L.	III	574
VII. *Anthemis arvensis*, L.	III	576
VIII. —— *Cotula*, L.	III	*ibid.*
IX. *Chrysanthemum Alpinum*, L.	III	566
CHAMÆPYTIS. 249 et 250.		
I. *Cressa Cretica*, L.	I	423
II. *Teucrium Iva*, L.	III	13
III. —— *Chamæpithys*, L.	III	12
IV. *Dracocephalum Austriacum*, L.	III	63
V. *Teucrium Pseudo-Chamæpithys*, L.	III	13
CHAMÆRUBUS. 479 et 480.		
I. *Rubus saxatilis*, L.	II	363
II. —— *Chamæ-Morus*, L.	II	*ibid.*
III. —— *Chamæ-Morus*, L.	—	—
CHAMÆSYCE. 293.		
Euphorbia Chamæsyce, L.	II	303
CHELIDONIA minor. 309.		
I. *Ranunculus Ficaria*, L. var.	II	454
II. —— *Ficaria*, L.	II	*ibid.*
CHELIDONIUM. 144.		
I. *Chelidonium majus*, L.	II	390
II. —— *majus*, L. var.	II	*ibid.*
CHONDRILLA lutea. 130.		
I. *Chondrilla juncea*, L.	III	431
II. *Prenanthes viminea*, L.	III	432
III. —— *viminea*, L.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
IV. *Lactuca Saligna*, L.	III	430
VI. *Leontodon bulbosum*, L.	III	435
VIII. *Erigeron tuberosum*, L. var.	III	527
IX. —— *tuberosum*, L. var.	III	*ibid.*
X. *Lapsana Zacintha*, L.	III	454
CHONDRILLA cærulea et PURPUREA. 130 et 131.		
I. *Lactuca perennis*, L.	III	430
II. —— *perennis*, L.	III	*ibid.*
III. *Centaurea crupina*, L.	III	600
V. *Crepis fœtida*, L.	—	—
VI. *Catananche cærulea*, L.	III	455
VII. —— *cærulea*, L. var.	III	*ibid.*
CHRYSANTHEMUM. 134.		
I. *Chrysanthemum coronarium*, L.	III	568
III. —— *coronarium*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *coronarium*, L. var.	—	—
CHRYSANTHEMUM Alpinum. 134.		
I. *Senecio incanus*, L.	III	534
II. —— *abrotanifolius*, L.	III	*ibid.*
CHRYSOGONUM. 324.		
Leontice Leontopetalon, L.	III	49
CICER. 347.		
I. *Cicer arietinum*, L.	III	328
CICER sylvestre. 347.		
I. *Astragalus Cicer*, L.	III	360
II. —— *microphyllus*, L.	III	*ibid.*
III. —— *Glaux*, L.	III	362
IV. —— *pilosus*, L.	III	358
V. —— *excapus*, L.	—	—
VI. *Ononis rotundifolia*, L.	III	298
CICHORIUM. 125 et 126.		
I. *Cichorium Intybus*, L. var.	—	—
II. —— *Intybus*, L.	III	456
III. —— *spinosum*, L.	III	*ibid.*
CICHORIUM sylvestre luteum. 126.		
I. *Picris hieracioïdes*, L.	III	425
II. *Crepis vesicaria*, L. var.	III	445
IV. —— *tectorum*, L.	—	—

	tom.	pag.
CICUTA et CICUTARIA. 160 et 161.		
I. *Conium maculatum*, L.	I	455
II. *Æthusa Cynapium*, L.	I	479
III. *Ligusticum Peloponense*, L.	I	468
V. *Chærophyllum hirsutum*, L.	I	484
VI. —— *hirsutum*, L.	I	*ibid.*
VII. *Phellandrium aquaticum*, L.	I	477
VIII. *Chærophyllum bulbosum*, L.	I	484
CINNAMOMUM. 408 et 409.		
I. *Laurus Cinnamomum*, L.	II	155
II. —— *Cassia*, L.	II	156
CINARA. 383 et 384.		
I. *Cynara Scolymus*, L. var.	III	472
II. —— *Scolymus*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *Scolymus*, L.	—	—
IV. —— *Carduncellus ?* L.	—	—
V. —— *Scolymus*, L.	III	472
CIRSIUM. 377.		
I. *Carduus heterophyllus*, L.	III	467
II. *Cnicus oleraceus*, L. var.	III	468
IV. *Carduus dissectus*, L.	III	464
V. —— *helenioïdes*, L.	III	467
VI. —— *defloratus*, L.	III	464
VII. —— *Monspessulanus*, L.	III	465
VIII. —— *serratuloïdes*, L.	III	467
IX. —— *defloratus*, L.	III	464
CISTUS mas. 464.		
I. *Cistus villosus*, L.	II	410
II. —— *albidus*, L.	II	412
III. —— *incanus*, L.	II	411
V. —— *crispus*, L.	II	412
CISTUS fœmina. 464 et 465.		
I. *Cistus salviæfolius*, L.	II	411
II. —— *tuberaria*, L.	II	414
III. —— *halimifolius*, L.	II	412
IV. —— *halimifolius*, L. var.	II	*ibid.*
VIII. *Telephium Imperati*, L.	I	509

	tom.	pag.
X. *Cistus salicifolius*, L.	II	415
XI. —— *guttatus*, L.	II	414
XII. —— *ledifolius*, L.	II	*ibid.*
CISTUS ledum. 467.		
I. *Cistus Monspeliensis*, L.	II	411
II. —— *ladaniferus*, L.	II	*ibid.*
III. —— *laurifolius*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *populifolius*, L. var.	II	410
V. —— *populifolius*, L. var.	II	*ibid.*
VI. —— *Creticus*, L.	II	411
IX. —— *Monspeliensis*, L. var.	II	*ibid.*
X. —— *Libanotis*, L.	II	412
XII. —— *hirtus*, L.	II	416
XIV. —— *umbellatus*, L.	II	413
XV. *Ledum palustre*, L.	II	206
CLEMATIS daphnoides. 301 et 302.		
I. *Vinca minor*, L.	I	398
II. —— *major*, L.	I	*ibid.*
CLEMATIS. 300.		
I. *Clematis Vitalba*, L. var.	II	447
III. —— *cirrhosa*, L.	II	446
IV. —— *Flammula*, L.	II	447
V. —— *maritima*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *erecta*, L.	II	*ibid.*
VII. *Atragene Alpina*, L.	II	445
VIII. *Clematis integrifolia*, L.	II	448
IX. —— *Viticella*, L.	II	446
X. —— *Viticella*, L. var.	II	*ibid.*
XI. *Passiflora incarnata*, L.	IV	36
CLEMATIS Indica quæ Lignum Colubrinum. 301.		
I. *Strychnos colubrina*, L.	—	—
II. —— *colubrina*, L.	I	351
III. *Ophioxylon serpentinum*, L.	IV	273
VI. *Strychnos Nux vomica*, L.	—	—
VII. *Thalia geniculata*, L.	—	—
CLINOPODIUM et ACINOS. 224 et 225.		
I. *Clinopodium vulgare*, L.	III	32

	tom.	pag.
II. *Thymus acynos*, L.	III	58
IV —— *Alpinus*, L.	III	*ibid.*
V. *Bartsia Alpina*, L.	III	75
CNEORON. 463.		
I. *Daphne Cneorum*, L.	II	134
II. *Convolvulus Cneorum*, L.	I	297
CNICUS. 378.		
I. *Carthamus tinctorius*, L.	III	476
II. —— *cæruleus*, L.	III	477
IV. *Centaurea benedicta*, L.	III	608
V. *Carlina vulgaris*, L.	III	474
COCHLEARIA. 110.		
I. *Cochlearia officinalis*, L.	III	161
II. —— *Anglica*, L.	III	162
III. —— *Danica*, L. var.	III	163
IV. *Danica*, L.	III	*ibid.*
COLCHICUM autumnale. 67 et 68.		
I. *Colchicum autumnale*, L.	II	89
IV. —— *montanum*, L.	II	*ibid.*
COLCHICUM polyanthes, *sive* multiflorum, simplex et plenum. 68 et 69.		
IV. *Colchicum autumnale*, L. var.	—	—
COLCHICUM vernum. 69.		
II. *Bulbocodium vernum*, L.	II	22
COLCHICUM luteum. 69.		
I. *Amaryllis lutea*, L.	II	21
COLOCYNTHIS. 313.		
I. *Cucumis Colocynthis*, L.	IV	163
COLUTEA. 396 et 397.		
I. *Colutea arborescens*, L.	III	335
II. *Coronilla Emerus*, L.	III	338
III. —— *Emerus*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *coronata*, L.	III	*ibid.*
V. —— *glauca*, L.	III	*ibid.*
CONSOLIDA regalis. 142.		
I. *Delphinium Ajacis*, L.	II	424
II. —— *Ajacis*, L.	II	*ibid.*

	tom.	pag.
III. *Delphinium Ajacis*, L. var.	II	424
IV. —— *Consolida*, L.	II	423
V. —— *Consolida*, L.	—	—
VI. —— *peregrinum*, L.	II	424
CONSOLIDA media. 260.		
I. *Ajuga pyramidalis*, L.	III	10
II. —— *reptans*, L.	III	11
CONVOLVULUS *seu* SMILAX. 294 et 295.		
I. *Convolvulus sepium*, L.	I	292
III. —— *arvensis*, L.	I	291
IV. *Polygonum Convolvus*, L.	II	146
V. *Convolvulus Nil*, L.	I	293
VI. —— *purpureus*, L.	I	*ibid.*
VII. —— *tricolor*, L.	I	298
VIII. —— *Cairicus*, L.	I	295
IX. —— *Althæoïdes*, L.	I	*ibid.*
X. —— *Cantabrica*, L.	I	297
CONYZA. 265.		
I. *Erigeron viscosum*, L.	III	524
II. *Baccharis Dioscoridis*, L.	III	519
III. *Erigeron graveolens*, L.	III	524
IV. *Inula pulicaria*, L. var.	III	550
VI. *Conyza squarrosa*, L.	III	520
VII. *Inula Oculus Christi*, L.	III	549
VIII *Erigeron acre*, L.	III	526
CONYZA montana. 265.		
I. *Erigeron Alpinum*, L.	III	*ibid.*
II. —— *uniflorum*, L.	III	*ibid.*
IV. *Cineraria Alpina*, L. var. *Helenitis.*	III	547
V. *Erigeron glutinosum*, L.	III	525
VII. *Inula Britanica*, L. var.	III	549
CONYZA palustris. 265 et 266.		
I. *Inula dyssenterica*, L.	III	550
II. —— *pulicaria*, L.	III	*ibid.*
III. *Cineraria palustris*, L.	III	546
IV. *Senecio paludosus*, L.	III	535
V. *Inula Britanica*, L. var.	III	549
VI. —— *Germanica*, L.	III	551

	tom.	pag.
CORCHORUS. 317.		
Corchorus olitorius, L.	II	418
CORIS. 280.		
I. *Hypericum Coris*, L.	III	403
II. *Coris Monspeliensis*, L.	I	330
CORNUS. 446 et 447.		
I. *Cornus mascula*, L.	I	204
II. —— *mascula*, L.	—	—
III. —— *sanguinea*, L.	I	204
CORONOPUS. 190 et 191.		
I. *Plantago coronopifolia*, L. var.	I	198
II. —— *coronopifolia*, L.	I	*ibid.*
III. —— *maritima*, L.	I	197
V. —— *coronopifolia*, L.	—	—
CORYLUS. 417 et 418.		
I. *Corylus Avellana*, L. var.	IV	133
II —— *Avellana*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *Avellana*, L. var.	IV	*ibid.*
IV. —— *Avellana*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *Avellana*, L.	IV	*ibid.*
VI. —— *Colurna*, L.	IV	134
VII. *Jatropha multifida*, L.	IV.	152
COSTUS. 36.		
I. *Costus Arabicus*, L.	I	5
COTINUS. 415.		
Rhus Cotinus, L.	I	500
COTONEASTER et CHAMÆ-MESPILUS. 452.		
I. *Mespilus Chamæ-Mespilus*, L.	II	342
II. —— *Cotoneaster*, L.	II	343
III. —— *Cotoneaster*, L.	II	*ibid.*
COTYLEDON seu UMBILICUS VENERIS. 285.		
I. *Cotyledon Umbilicus*, L. var.	II	258
II. *Saxifraga Cotyledon?* L.	II	221
III. —— *Cotyledon*, L.	II	*ibid.*
V. —— *Cotyledon*, L. var.	II	222
VI. *Sedum stellatum*, L.	II	260

	tom.	pag.
CRITHMUM. 288.		
II. *Crithmum maritimum*, L.	I	461
III. *Inula chrithmifolia*, L.	I	552
IV. *Echinophora spinosa*, L.	I	446
CROCUS sativus. 65.		
I. *Crocus sativus*, L.	I	73
CROCUS vernus latifolius. 65 et 66.		
I. *Crocus sativus*, L.	I	73
(Tous les numéros de ce genre ne présentent que des variétés du *Safran*.)		
CROCUS vernus latifolius luteus aureusve. 66.		
I. *Crocus sativus*, L.	I	73
(Tous les numéros de ce genre ne présentent que des variétés du *Safran*.)		
CRUCIATA. 335.		
I. *Valantia Cruciata*, L.	IV	265
II. —— *glabra*,	IV	266
CUCUMIS. 310.		
I. *Cucumis sativus*, L.	IV	164
II. —— *sativus*, L.	—	—
III. —— *flexuosus*, L.	IV	165
V. —— *Chate*, L.	IV	164
CUCUMIS asininus. 314.		
Momordica Elaterium, L.	IV	160
CUCURBITA. 312 et 313.		
I. *Cucurbita Lagenaria*, L.	—	—
II. —— *Pepo*, L.	IV	162
III. —— *Lagenaria*, L.	—	—
V. —— *Lagenaria*, L.	IV	161
CUMINUM. 146.		
I. *Cuminum Cyminum*, L.	I	475
II. *Pimpinella Anisum*, L. var.	I	495
III. *Lagoëcia cuminoïdes*, L.	I	385
CUPRESSUS. 488.		
Cupressus sempervirens, L.	IV	142
CUSCUTA, *Voyez* EPITHYMUM.		

	tom.	pag.
CYANUS. 273 et 274.		
I. *Centaurea montana*, L.	III	602
II. —— *Cyanus*, L.	III	603
III. —— *Cyanus*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *Cyanus*, L. var.	III	*ibid.*
V. —— *amara*, L.	III	606
VI. *Stehælina fruticosa*, L.	III	491
CYCLAMEN. 307 et 308.		
I. *Cyclamen Europæum*, L.	I	276
(Tous les numéros de ce genre ne présentent que des variétés du *Cyclame* ou *Pain de pourceau.*)		
CYMBALARIA. 306.		
Antirrhinum Cymbalaria, L.	III	90
CYNOGLOSSUM. 257.		
I. *Cynoglossum officinale*, L. var.	—	—
II. —— *officinale*, L.	I	255
III. —— *Apenninum*, L.	—	—
IV. —— *officinale*, L.	—	—
VII. *Myosotis Lappula*, L.	I	251
VIII. *Cynoglossum cheirifolium*, L.	I	256
IX. —— *cheirifolium*, L. var.	—	—
X. *Myosotis Lappula*, L.	I	251
CYNOSORCHIS seu TESTICULUS CANINUS. 80 et 81.		
I. *Orchis militaris*, L.	IV	9
II. —— *pyramidalis*, L. var.	IV	7
III. —— *pyramidalis*, L. var.	IV	*ibid.*
IV. —— *militaris*, L. var.	IV	9
CYNOSORCHIS militaris. 81.		
I. *Orchis militaris*, L. var.	IV	9
III. —— *militaris?* L. var.	IV	*ibid.*
IV. —— *pyramidalis*, L.	IV	7
VI. —— *ustulata*, L.	IV	8
IX. —— *globosa*, L.	IV	7
X. *Ophrys Alpina*, L.	IV	17
CYPERUS rotundus odoratus. 13.		
III. *Scirpus maritimus*, L.	I	96
CYPERUS rotundus inodorus. 14.		
III. *Scirpus maritimus*, L.	—	—

	tom.	pag.
CYPERUS longus odoratus. 14.		
I. *Cyperus longus*, L.	I	90
II. *Dorstenia Contrairerva*, L.	I	212
CYPERUS longus inodorus. 14.		
IV. *Schœnus Mariscus*, L.	I	87
V. *Carex paniculata*, L.	IV	84
CYPERUS esculentus. 14.		
I. *Cyperus esculentus*, L.	I	90
CYTISUS incanus vel hirsutus. 389 et 390.		
I. *Medicago arborea*, L.	III	383
II. *Ebenus Cretica*, L.	III	302
III. *Cytisus Austriacus*, L.	III	332
IV. *Cytisus hirsutus*, L.	III	331
VI. —— *hirsutus*, L.	III	*ibid.*
VIII. *Anthyllis cytisoïdes*, L.	III	301
XII. *Genista Canariensis*, L.	III	284
XIII. *Vella Pseudo-Cytisus*, L.	III	150
CYTISUS glaber. 390.		
I. *Cytisus sessilifolius*, L.	III	331
III. —— *nigricans*, L.	III	*ibid.*
IV. *Spartium complicatum*, L.	III	282

D.

DAUCUS. 149 et 150.		
I. *Athamanta Cretensis*, L.	I	458
II. —— *Cretensis*, L.	—	—
III. *Seseli Hippomarathrum*, L.	I	487
IV. *Pimpinella dioïca*, L.	I	496
V. *Athamantha Cervaria*, L.	I	458
VI. —— *Libanotis*, L.	—	—
VII. —— *Libanotis*, L.	—	—
VIII. —— *Libanotis*, L.	—	—
XI. *Æthusa Bunius*, L.	I	480
XIII. *Sison verticillatum*, L.	I	473
DENS CANIS. 87.		
I. *Erythronium Dens canis*, L.	I	37
II. —— *Dens canis*, L. var.	I	*ibid.*

	tom.	pag.
DENS LEONIS. 126.		
I. *Leontodon Taraxacum*, L. var.	III	434
II. —— *Taraxacum*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *bulbosum*, L.	—	—
V. *Hyoseris fœtida*, L.	III	449
VI. —— *radiata*, L.	III	*ibid.*
VII. *Leontodon hispidum*, L.	—	—
DENTARIA. 322.		
I. *Dentaria pentaphyllos*, L.	III	173
II. —— *pentaphyllos*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *bulbifera*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *bulbifera*, L. var.	III	*ibid.*
V. —— *enneaphylla*, L.	III	*ibid.*
DICTAMNUS. 222.		
I. *Origanum Dictamnus*, L.	III	54
II. *Marrubium Pseudo-Dictamnus*, L.	III	47
IV. —— *acetabulosum*, L.	III	*ibid.*
V. *Dictamnus albus*, L.	II	186
DIGITALIS folio Verbasci. 243 et 244.		
I. *Digitalis purpurea*, L.	III	105
II. —— *purpurea*, L. var.	III	*ibid.*
DIGITALIS folio virescente. 244.		
I. *Digitalis ambigua*, L.	III	106
II. —— *lutea*, L.	III	*ibid.*
III. —— *lutea*, L. var.	—	—
IV. —— *lutea*, L. var.	—	—
V. —— *ferruginea*, L.	III	106
DIPSACUS seu CARDUUS FULLONUM. 385.		
I. *Dipsacus fullonum*, L. var.	I	167
II. —— *laciniatus*, L.	I	*ibid.*
III. —— *fullonum*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *pilosus*, L.	I	*ibid.*
DORONICUM. 184 et 185.		
I. *Arnica scorpioïdes*, L. var.	III	554
II. —— *scorpioïdes*, L.	III	*ibid.*
III. *Doronicum Pardalianches*, L. var.	III	556
IV. —— *plantagineum*, L.	III	*ibid.*
V. *Arnica montana*, L.	III	554

	tom.	pag.
VI. *Senecio Doronicum*, L.	III	536
VIII. *Doronicum Pardalianches*, L.	III	556
IX. *Senecio Doronicum*, L. var.	III	*ibid.*
X. —— *Doronicum*, L. var.	III	*ibid.*
DRABA. 109 et 110.		
I. *Cochlearia Draba*, L.	III	162
IV. *Arabis Alpina*, L. var.	III	190
V. —— *Alpina*, L. var.	III	*ibid.*
VII. *Sisymbrium strictissimum*, L.	III	181
VIII. *Lobelia urens*, L.	III	640
DRACO. 505 et 506.		
I. *Dracæna Draco*, L.	II	52
III. *Yucca Draconis*, L.	II	60
DRACUNCULUS esculentus. 98.		
I. *Artemisia Dracunculus*, L.	III	506
II. *Achillea Ptarmica*, L.	III	580
III. —— *Ptarmica*, L. var.	—	—
IV. —— *macrophylla*, L.	III	580
DRACUNTIUM *seu* DRACUNCULUS. 194 et 195.		
II. *Arum Dracunculus*, L.	IV	46
III. —— *triphyllum*, L.	IV	47
IV. *Calla palustris*, L.	IV	52
DRYPIS. 388.		
Drypis spinosa, L.	I	512

E.

ECHIUM. 254.		
I. *Echium Italicum*, L.	I	265
II. —— *vulgare*, L.	I	*ibid.*
III. —— *Creticum*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *Creticum*, L.	I	*ibid.*
V. *Lycopsis pulla*, L.	I	263
VI. *Echium violaceum*, L.	I	265
IX. *Myosotis Apula*, L.	I	251
ELATINE. 252 et 253.		
I. *Antirrhinum Elatine*, L.	—	—
II. —— *Elatine*, L.	III	90
III. —— *Elatine*, L. var.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
EPHEMERON. 244.		
II. *Lysimachia Ephemerum*, L.	I	280
EPIMEDIUM. 323.		
Epimedium Alpinum, L.	—	—
EPITHYMUM *et* CUSCUTA. 219.		
I. *Cuscuta Epithymum*, L.	I	221
III. —— *Europæa*, L.	I	*ibid.*
EQUISETUM. 15 et 16.		
I. *Elatine alsinastrum*, L.	II	153
II. *Equisetum fluviatile*, L.	IV	309
III. —— *palustre*, L.	IV	308
IV. *Hippuris vulgaris*, L.	I	10
V. *Equisetum palustre*, L. var.	IV	308
VII. —— *sylvaticum*, L.	IV	*ibid.*
IX. —— *arvense*, L.	IV	*ibid.*
X. —— *hyemale*, L.	IV	309
XI. —— *hyemale*, L.	IV	*ibid.*
XII. —— *hyemale*, L.	IV	*ibid.*
XIII. *Chara vulgaris*, L.	IV	71
ERICA folio Myricæ. 485.		
I. *Erica vulgaris*, L.	II	122
II. —— *vulgaris*, L. var.	II	*ibid.*
ERICA folio Coridis. 485 et 486.		
I. *Erica arborea*, L.	II	124
III. —— *multiflora*, L.	II	130
V. —— *viridipurpurea*, L.	II	123
VII. —— *Tetralix*, L.	II	125
VIII. —— *cinerea*, L.	II	126
IX. —— *ciliaris*, L.	II	128
X. —— *cinerea*, L. var.	II	126
ERICA procumbens. 486.		
I. *Erica herbacea*, L. var.	II	130
II. —— *herbacea*, L.	II	*ibid.*
III. —— *purpurascens*, L.	II	*ibid.*
ERICA baccifera. 486.		
I. *Empetrum album*, L.	IV	189
II. —— *nigrum*, L.	IV	190

	tom.	pag.
ERVUM. *Voyez* OROBUS.		
ERUCA. 98 et 99.		
I. *Brassica Eruca*, L.	III	196
IV. —— *Erucastrum*, L.	III	*ibid.*
V. *Sisymbrium sylvestre*, L.	III	177
VI. —— *sylvestre*, L.	III	*ibid.*
VII. —— *Barrelieri*, L.	III	179
IX. *Erysimum Barbarea*, L.	III	182
XI. *Sisymbrium arenosum*, L.	III	180
XII. *Bunias Kakile*, L.	III	202
XIV. —— *Erucago*, L.	III	201
XV. *Erysimum cheiranthoïdes*, L.	—	—
ERYNGIUM *sive* IRINGUS Officinarum. 386.		
I. *Eryngium maritimum*, L.	I	439
II. —— *campestre*, L.	I	*ibid.*
III. —— *Amethystinum*, L.	I	*ibid.*
V. *Carthamus Carduncellus*, L.	III	477
VI. *Eryngium Alpinum*, L.	I	440
VII. —— *planum*, L.	I	438
VIII. —— *pusillum*, L.	I	439
IX. *Sium falcaria*, L.	I	472
ERYSIMUM. 27.		
I. *Polygonum Fagopyrum*, L.	II	145
ERYSIMUM. 100 et 101.		
I. *Erysimum officinale*, L.	III	182
III. *Sisymbrium polyceratium*, L.	III	179
IV. —— *Irio*, L.	III	181
V. —— *Loëselii*, L.	III	*ibid.*
VII. *Turritis hirsuta*, L.	III	192
ESULA. *Voyez* PITUYSA.		
EVONYMUS. 428.		
I. *Evonymus Europœus*, L. var.	I	371
II. —— *verrucosus*, L.	—	—
III. —— *Europœus*, L. var. *latifolia.*	I	371
IV. *Coffea Arabica*, L.	I	319
EUPATORIUM. 320 et 321.		
I. *Eupatorium cannabinum*, L.	III	487
II. *Bidens tripartita*, L.	III	479

	tom.	pag.
III. *Bidens cernua*, L.	III	480
IV. *Agrimonia Eupatoria*, L.	II	296
VI. —— *agrimonoïdes*, L.	II	*ibid.*
EUPHORBIUM *et* ANTEUPHORBIUM. 387.		
I. *Euphorbia antiquorum*, L.	—	—
II. *Cacalia Anteuphorbium*, L.	III	482
EUPHRASIA. 233 et 234.		
I. *Euphrasia officinalis*, L.	III	78
II. —— *linifolia*, L.	III	79
III. —— *Odontites*, L.	III	78
IV. —— *latifolia*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *lutea*, L.	III	79
VII. *Tozzia Alpina*, L.	III	83

F.

FABA. 338.		
I. *Vicia Faba*, L.	III	326
II. —— *Faba*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *Narbonensis*, L.	III	325
FAGUS. 419.		
I. *Fagus sylvatica*, L.	IV	131
FERRUM EQUINUM. 349.		
I. *Hippocrepis unisiliquosa*, L.	III	341
II. —— *multisiliquosa*, L.	III	342
III. —— *comosa*, L.	III	*ibid.*
IV. *Coronilla minima*, L.	III	338
FERULA. 148.		
I. *Ferula communis*, L.	I	462
II. —— *Ferulago*, L.	I	462
FICUS. 457 et 458.		
I. *Ficus Carica*, L.	IV	300
II. —— *Carica*, L. var.	IV	*ibid.*
VIII. —— *Indica*, L.	IV	301
IX. *Cactus Opuntia*, L.	II	321
XIV. —— *Peruvianus*, L.	II	320
FICUS Indica. 508.		
I. *Musa paradisiaca*, L.	—	—

	tom.	pag.
FILIX ramosa. 357 et 358.		
I. *Pteris aquilina*, L.	IV	321
III. *Osmunda regalis*, L.	IV	314
IV. *Polypodium Dryopteris*, L.	IV	337
FILIX non ramosa. 358.		
II. *Osmunda strutiopteris*, L.	IV	315
III. *Polypodium Filix mas*, L.	IV	334
FILIX saxatilis. 358.		
II. *Polypodium Dryopteris*, L.	—	—
III. —— *fragile*, L.	IV	336
V. *Acrostichum Septentrionale*, L.	III	316
FILICULA fontana. 358.		
I. *Polypodium Rhæticum*, L.	IV	335
II. —— *fontanum*, L.	IV	333
III. *Asplenium marinum*, L.	IV	326
FILIX aculeata. 358.		
I. *Polypodium aculeatum*, L.	IV	335
II. —— *aculeatum*, L. var.	—	—
FŒNICULUM. 147.		
I. *Anethum Fœniculum*, L. var.	I	492
II. —— *Fœniculum*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *Fœniculum*, L.	I	*ibid.*
V. —— *Fœniculum*, L.	I	*ibid.*
VI. *Cachrys Sicula*, L.	I	462
VII. *Thea Bohea*, L.	II	408
FŒNUM-GRÆCUM. 348.		
I. *Trigonella Fœnum-Græcum*, L.	III	382
II. —— *Fœnum-Græcum*, L. var. *sylvestris*.	III	*ibid.*
III. —— *polyceratia*, L.	III	381
FRAGARIA. 326.		
I. *Fragaria vesca*, L.	II	364
II. —— *vesca*, L.	II	*ibid.*
III. —— *vesca*, L. var.	II	*ibid.*
IV. —— *vesca*, L. var.	—	—
V. —— *vesca*, L. var.	—	—
VII. —— *sterilis*, L.	II	365
VIII. *Potentilla subacaulis*, L.	II	370

	tom.	pag.
FRAXINUS. 416.		
I. *Fraxinus excelsior*, L.	IV	290
II. —— *Ornus*, L.	IV	*ibid.*
IV. *Guilandina Moringa*, L.	II	183
V. *Melia Azadirachta*, L.	II	194
FRITILLARIA. 64.		
I. *Fritillaria Meleagris*, L.	II	35
VI. —— *Meleagris*, L.	II	*ibid.*
VII. —— *Meleagris*, L.	—	—
VIII. —— *Meleagris*, L.	II	35
IX. —— *Meleagris*, L.	—	—
XIII. —— *Pyrænaïca*, L.	II	35
FRUCTUS orbiculares sulcis nervisque distincti. 405.		
I. *Strychnos colubrina*, L.	—	—
FRUMENTUM Indicum. 24 et 25.		
III. *Zea Mays*, L.	IV	77
FUCI subrotundi. 364.		
III. *Ulva umbilicalis*, L.	IV	402
V. —— *intestinalis*, L.	IV	403
FUCUS *sive* ALGA latifolia. 364.		
I. *Ulva lactuca*, L.	IV	403
II. —— *Linza*, L.	IV	404
IV. —— *latissima*, L.	IV	403
IX. —— *pavonina*, L.	IV	402
FUCUS *sive* ALGA angustifolia. 364.		
I. *Fucus digitatus*, L.	IV	400
II. —— *saccharinus*, L.	IV	*ibid.*
V. *Zostera marina*, L.	IV	54
FUCUS *sive* ALGA capillaceo folio. 364.		
II. *Fucus Filum*, L.	IV	399
III. *Conferva glomerata*, L.	IV	406
IV. —— *canalycularis*, L.	IV	405
FUCI folliculati. 365.		
II. *Fucus siliquosus*, L.	IV	397
III. —— *vesiculosus*, L.	IV	396
IV. —— *vesiculosus*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *Fœniculaceus*, L. var.	IV	397

	tom.	pag.
VI. *Ruppia maritima*, L.	IV	227
VII. *Fucus Fœniculaceus*, L.	IV	397
VIII. —— *selaginoïdes*, L.	IV	398
X. —— *natans*, L.	IV	395
XII. —— *acinarius*, L.	IV	*ibid.*
XIV. —— *ericoïdes*, L.	IV	402
FUCI diversi. 365.		
I. *Lichen Rocella*, L.	IV	391
II. —— *Rocella*, L.	IV	*ibid.*
III. —— *fuciformis*, L.	IV	385
FUMARIA non bulbosa. 143.		
I. *Fumaria officinalis*, L.	III	268
II. —— *capreolata*, L.	III	269
III. —— *spicata*, L.	III	*ibid.*
V. —— *lutea*, L.	III	268
VI. —— *claviculata*, L.	III	269
FUMARIA bulbosa. 143 et 144.		
I. *Fumaria bulbosa*, L. var. *cava*.	III	267
II. —— *bulbosa*, L. var. *intermedia*.	III	*ibid.*
III. —— *bulbosa*, L. var. *non cava*.	III	*ibid.*
FUNGI. 369, 370 et 371.		
IV. *Agaricus Georgii*, L.	IV	410
XXVII. —— *piperatus*, L.	IV	*ibid.*
FUNGI noxii. 372, 373, 374 et 375.		
I. *Peziza auricula*, L.	IV	418
III. *Boletus igniarius*, L.	IV	413
XVIII. *Agaricus cantharellus*, L.	IV	409
XXXVIII. *Phallus impudicus*, L.	IV	415
XLIII. *Clathrus cancellatus*, L.	IV	416

G.

GALEGA. 352.		
I. *Galega officinalis*, L.	III	555
II. *sclynomene Sesban*, L.	III	344
GALEOPSIS. *Voyez* LAMIUM.		
GALIUM. 335.		
I. *Galium verum*, L.	I	182

	tom.	pag.
II. *Galium rubrum*, L.	I	184
III. —— *purpureum*, L.	I	183
IV. —— *palustre*, L.	I	181
GENISTA SPARTIUM. 394.		
I. *Spartium Scorpius*, L.	III	282
II. —— *Scorpius*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *Scorpius*, L. var.	III	*ibid.*
IV. *Genista Lusitanica*, L.	III	286
V. *Hedysarum Alhagi*, L.	III	345
VI. *Anthyllis erinacea*, L.	III	301
GENISTA spinosa *sive* SCORPIUS. 394 et 395.		
I. *Ulex Europæus*, L. var.	III	290
II. —— *Europæus*, L.	III	*ibid.*
III. *Genista Germanica*, L.	III	286
IV. —— *Hispanica*, L.	III	*ibid.*
V. —— *Anglica*, L.	III	*ibid.*
GENISTA non spinosa. 395.		
I. *Spartium scoparium*, L.	III	283
II. *Genista florida*, L.	III	285
III. —— *tinctoria*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *pilosa*, L.	III	*ibid.*
GENTIANA Alpina major. 187.		
I. *Gentiana lutea*, L.	I	431
II. —— *purpurea*, L.	I	*ibid.*
III. —— *punctata*, L.	I	432
IV. —— *asclepiadea*, L.	I	*ibid.*
GENTIANA Alpina minor *sive* GENTIANELLA. 187 et 188.		
I. *Gentiana acaulis*, L.	I	433
II. —— *acaulis*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *verna*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *campestris*, L.	I	436
V. —— *nivalis*, L.	I	434
GENTIANA pratensis. 188.		
I. *Gentiana cruciata*, L.	I	437
II. —— *Amarella*, L.	I	436
III. —— *Amarella*, L.	—	—
V. —— *utriculosa*, L.	I	434

	tom.	pag.
VI. *Gentiana pneumonanthe*, L.	I	432
VII. —— *ciliata*, L.	I	436
GENTIANA palustris. 188.		
I. *Gentiana pneumonanthe*, L.	I	432
II. *Swertia perennis*, L.	I	430
GERANIUM Anemones folio rotundo. 317 et 318.		
I. *Geranium sylvaticum*, L.	III	226
II. —— *phæum*, L.	III	225
III. —— *macrorhizum*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *sanguineum*, L.	III	229
V. —— *pratense*, L.	III	226
VIII. —— *fuscum*, L.	III	225
IX. —— *tuberosum*, L.	III	*ibid.*
XII. —— *nodosum*, L.	III	226
XIV. —— *argenteum*, L.	III	227
XV. —— *lucidum*, L.	III	*ibid.*
GERANIUM Malvæ folio. 318.		
I. *Geranium rotundifolium*, L.	III	228
II. —— *pusillum*, L.	III	229
III. —— *malacoïdes*, L.	III	223
GERANIUM folio Cicutæ vel Myrrhidis. 319.		
I. *Geranium ciconium*, L.	III	224
II. —— *moschatum*, L.	III	223
IV. —— *cicutarium*, L.	III	*ibid.*
V. —— *Robertianum*, L.	III	227
VII. —— *gruinum*, L.	III	224
GINGIDIUM. 151.		
I. *Artedia squamata*, L.	I	451
II. *Daucus Visnaga*, L.	I	452
III. —— *Gingidium*, L.	I	*ibid.*
IV. *Tordylium Syriacum*, L.	I	448
GLADIOLUS. 41.		
III. *Gladiolus communis*, L.	I	76
IV. —— *communis*, L. var.	I	*ibid.*
GLAUX. 215.		
I. *Glaux maritima*, L.	I	393
GLYCYRRHIZA. 352.		
I. *Glycyrrhiza echinata*, L.	III	336

	tom.	pag.
II. *Glycyrrhiza glabra*, L.	III	336
III. *Astragalus glyciphyllos*, L.	III	360
GNAPHALIUM. 263.		
I. *Athanasia maritima*, L.	III	497
II. *Gnaphalium margaritaceum*, L.	III	513
III. *Filago Germanica*, L.	III	628
IV. —— *pyramidata*, L.	III	*ibid.*
V. *Micropus erectus*, L.	III	630
VI. *Filago montana*, L.	III	628
VII. —— *acaulis*, L.	III	*ibid.*
VIII. —— *acaulis*, L.	III	*ibid.*
IX. *Gnaphalium luteo-album*, L.	III	512
X. *Filago arvensis ?* L.	III	629
XI. *Gnaphalium sylvaticum*, L.	III	514
GNAPHALIUM montanum. 263 et 264.		
I. *Gnaphalium dioïcum*, L. (mas.)	III	513
II. —— *dioïcum*, L. (fœmina.)	III	*ibid.*
III. —— *sanguineum*, L.	III	512
IV. *Filago Leontopodium*, L.	III	629
V. —— *Leontopodium*, L. var.	III	*ibid.*
VI. *Gnaphalium Alpinum*, L.	III	514
GOSSYPIUM *sive* XYLON. 430.		
I. *Gossypium herbaceum*, L.	III	248
II. —— *arboreum*, L.	III	*ibid.*
III. *Bombax Ceiba*, L.	III	232
IV. —— *pentandrum*, L.	III	*ibid.*
GRAMEN caninum. 1 et 2.		
I. *Triticum repens*, L.	I	146
II. *Poa compressa*, L.	—	—
III. *Holcus mollis*, L.	IV	258
IV. —— *mollis*, L.	IV	*ibid.*
V. *Agrostis canina*, L.	I	114
VI. *Aira aquatica*, L.	I	116
X. *Cenchrus racemosus*, L.	IV	261
XII. *Poa compressa*, L.	I	22
GRAMEN nodosum à radicis formâ, 2.		
I. *Avena elatior*, L.	I	134

	tom.	pag.
III. *Phleum nodosum*, L.	—	—
V. *Hordeum bulbosum*, L.	I	144
GRAMEN tremulum. 2.		
I. *Briza maxima*, L.	I	123
II. —— *media*, L.	I	*ibid.*
V. —— *eragrostis*, L.	I	*ibid.*
VI. *Agrostis minima*, L.	I	115
GRAMEN paniculatum pratense. 2 et 3.		
I. *Holcus lanatus*, L.	IV	238
II. *Poa pratensis*, L.	I	120
III. —— *angustifolia*, L.	I	*ibid.*
V. —— *trivialis*, L.	I	*ibid.*
VI. —— *annua*, L.	I	*ibid.*
VII. —— *rigida*, L.	I	121
GRAMEN paniculatum arvense. 3.		
I. *Poa bulbosa*, L. var.	—	—
II. *Cynosurus aureus*, L.	I	127
III. *Agrostis spica venti*, L.	I	113
IV. *Aira cæspitosa*, L.	I	117
GRAMEN paniculatum montanum et sylvestre. 3		
I. *Agrostis capillaris*, L.	I	114
II. *Holcus odoratus*, L.	IV	258
III. *Phalaris arundinacea*, L.	—	—
GRAMEN paniculatum aquaticum. 3.		
I. *Poa aquatica*, L.	I	119
II. *Phalaris oryzoïdes*, L.	I	104
IV. *Poa aquatica*, L.	—	—
GRAMEN spicatum aquaticum. 3.		
I. *Festuca fluitans*, L.	I	129
II. *Alopecurus geniculatus*, L.	I	111
III. *Ruppia maritima*, L.	—	—
GRAMEN cristatum et spicatum pratense. 3.		
I. *Cynosurus cristatus*, L.	I	125
II. *Poa cristata*, L.	I	122
III. *Anthoxanthum odoratum*, L.	I	53
IV. *Phalaris utriculata*, L.	I	104
V. *Dactylis glomerata*, L.	I	125

	tom.	pag.
GRAMEN spicatum montanum et nemorosum. 4.		
I. *Carex tomentosa*, L.	IV	85
III. —— *pedata*, L.	IV	*ibid.*
IV. —— *digitata*, L.	IV	*ibid.*
GRAMEN typhoïdes. 4.		
I. *Phleum pratense*, L.	I	110
III. —— *pratense*, L.	—	—
IV. —— *nodosum*, L.	I	110
GRAMEN phalaroïdes. 4.		
III. *Alopecurus pratensis*, L.	I	111
GRAMEN Alopecuroïdes. 4.		
I. *Lagurus ovatus*, L.	I	137
II. *Alopecurus paniceus*, L.	I	112
IV. —— *Monspeliensis*, L.	I	*ibid.*
VI. *Cynosurus echinatus*, L.	I	126
GRAMEN tomentosum. 4 et 5.		
I. *Lagurus cylindricus*, L.	I	137
II. *Eriophorum polystachyon*, L.	I	98
III. —— *vaginatum*, L.	I	*ibid.*
GRAMEN sparteum. 5.		
I. *Stipa tenacissima*, L.	I	133
II. *Lygeum spartum*, L.	I	100
III. *Arundo arenaria*, L.	I	138
VI. *Nardus stricta*, L.	I	99
VII. —— *stricta*, L.	—	—
VIII. —— *stricta*, L.	—	—
X. *Fucus Tendo*, L.	IV	399
XI. *Stipa pennata*, L.	I	133
XII. *Aira canescens*, L.	I	117
GRAMEN junceum et spicatum. 5 *et* 6.		
II. *Festuca ovina*, L.	I	127
III. —— *duriuscula*, L.	I	128
V. *Aira canescens*, L.	—	—
VIII. *Juncus articulatus*, L. var.	II	68
IX. —— *articulatus*, L. var.	II	*ibid.*
X. —— *squarrosus*, L.	II	*ibid.*
XI. *Scirpus cæspitosus*, L.	I	94
XII. *Carex Baldensis*, L.	IV	82

	tom.	pag.
XIII. *Scirpus setaceus*, L.	I	95
XVI. *Triglochin palustre*, L.	II	86
XVII. —— *maritimum*, L.	II	87
GRAMEN cyperoïdes spicatum et paniculatum. 6.		
I. *Carex acuta*, L. var. *ruffa.*	IV	88
IV. —— *elongata*, L.	IV	84
V. —— *Pseudo-Cyperus*, L.	IV	87
VII. *Scirpus maritimus*, L. var.	—	—
VIII. *Carex vulpina*, L.	IV	83
X. —— *leporina*, L.	IV	82
XI. *Cyperus flavescens*, L.	I	91
XII. —— *fuscus*, L.	I	92
XIII. *Scyrpus sylvaticus*, L.	I	97
XIV. *Schœnus mucronatus*, L.	I	87
GRAMEN arundinaceum. 6.		
I. *Festuca elatior*, L.	I	129
II. *Phalaris arundinacea*, L.	I	104
III. *Arundo Calamagrostis*, L.	I	138
V. *Saccharum Ravennæ*, L.	I	102
VI. *Melica cærulea*, L. var.	—	—
VII. —— *cærulea*, L.	I	119
GRAMEN nemorosum glabrum. 7.		
I. *Aira flexuosa*, L.	I	117
IV. *Carex muricata*, L.	IV	83
V. *Juncus bufonius*, L.	II	69
VI. —— *bufonius*, L. var.	II	*ibid.*
GRAMEN nemorosum hirsutum. 7.		
I. *Juncus pilosus*, L.	II	69
II. —— *pilosus*, L.	—	—
III. —— *campestris*, L.	II	70
IV. —— *campestris*, L. var.	II	*ibid.*
V. *Juncus pilosus*, L. var.	—	—
VI. —— *niveus*, L.	II	70
GRAMEN echinatum et aculeatum. 7.		
I. *Cenchrus capitatus*, L.	IV	261
III. *Schœnus aculeatus*, L.	I	87
IV. *Carex flava*, L.	IV	84

	tom.	tom.
GRAMEN DACTILOÏDES *sive* ISCHÆMUM. 7 et 8.		
I. *Cynosurus Coracanus*, L.	I	126
II. *Panicum dactylon*, L.	I	107
III. —— *dactylon*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *sanguinale*, L.	I	*ibid.*
V. *Andropogon Ischæmum*, L.	IV	256
VII. *Panicum sanguinale*, L.	—	—
VIII. —— *sanguinale*, L.	—	—
GRAMEN paniceum. 8.		
I. *Panicum crus galli*, L.	I	106
II. —— *crus galli*, L. var.	—	—
III. —— *viride*, L.	I	106
IV. —— *verticillatum*, L.	I	*ibid.*
GRAMEN miliaceum. 8.		
I. *Milium effusum*, L.	I	112
GRAMEN spicâ triticeâ et secalinâ. 8 et 9.		
IV. *Triticum junceum*, L.	I	146
CRAMEN spicâ Brizæ. 9.		
I. *Bromus pinnatus*, L.	I	132
II. —— *distachyos*, L.	I	133
GRAMEN hordeaceum. 9.		
I. *Elymus Europæus*, L.	I	141
II. *Hordeum murinum*, L.	I	144
GRAMEN loliaceum. 9.		
I. *Lolium temulentum*, L.	I	140
III. —— *perenne*, L.	I	*ibid.*
IV. *Triticum tenellum*, L.	I	147
VII. —— *maritimum*, L.	I	*ibid.*
GRAMEN festucæ *seu* ÆGYLOPS et BROMOS HERBA. 9 et 10.		
I. *Bromus secalinus*, L.	I	130
II. —— *squarrosus*, L.	I	*ibid.*
III. —— *arvensis*, L.	I	131
IV. —— *asper*, L.	—	—
V. *Stipa juncea*, L.	I	133
VI. *Andropogon hirtum*, L.	IV	255
VII. *Bromus sterilis*, L.	I	131
XI. *Avena pubescens*, L.	I	136
XIII. —— *fatua*, L.	I	135

	tom.	pag.
XIV. *Ægylops ovata*, L.	IV	262
XV. *Stipa capillaris*, L.	I	133
GRAMEN *avenaceum*. 10.		
I. *Melica nutans*, L.	I	118
IV. *Aira montana*, L.	I	117
V. *Melica ciliata*, L.	I	118
VIII. *Cynosurus cæruleus*, L.	I	126
GRANA PARADISI et CARDAMOMUM. 413.		
I. *Amomum Grana Paradisi*, L.	I	4
GRATIOLA. 278 et 279.		
Gratiola officinalis, L.	I	279
GROSSULARIA et RIBES Officinarum. 455.		
I. *Ribes uva crispa*, L.	I	380
III. —— *reclinata*, L.	I	*ibid.*
V. —— *rubrum*, L.	I	378
VII. —— *Alpinum*, L.	—	—
VIII. —— *rubrum*, L. var.	—	—
IX. —— *Alpinum*, L.	I	379
XI. —— *nigrum*, L.	I	*ibid.*
XII. *Rheum Ribes*, L.	II	162

H.

HALIMUS. 120.		
I. *Atriplex Halimus*, L.	IV	268
IV. —— *portulacoïdes*, L.	IV	268
HEDERA. 305.		
I. *Hedera Helix*, L.	I	382
II. —— *Helix*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *Helix*, L. var.	I	*ibid.*
IV. —— *Helix*, L. var.	I	*ibid.*
HEDERA TERRESTRIS. 306.		
I. *Glechoma hederacea*, L.	III	35
II. —— *hederacea?* L. var.	—	—
III. *Antirrhinum Azarina*, L.	III	96
HEDYSARUM. *Voyez* SECURIDACA.		
HELENIUM *et* FLOS SOLIS. 276 et 277.		
I. *Inula Helenium*, L.	III	548

	tom.	pag.
III. *Helianthus annuus*, L.	III	591
IV. —— *multiflorus*, L.	III	*ibid.*
VII. —— *tuberosus*, L.	III	*ibid.*
HELYCHRYSUM. 264 et 265.		
I. *Tanacetum annuum*, L.	III	499
IV. *Gnaphalium Stœchas*, L.	III	510
V. —— *Orientale*, L.	III	511
VII. —— *arenarium*, L.	III	*ibid.*
VIII. *luteo-album*, L.	III	512
IX. *Conyza sordida*, L.	III	521
X. *Stehælina dubia*, L.	III	490
XI. *Conyza saxatilis*, L.	III	521
HELIOTROPIUM. 253.		
I. *Heliotropium Europœum*, L.	I	249
II. —— *supinum*, L.	I	250
IV. *Croton tinctorium*, L.	IV	147
HELLEBORINE. 186 et 187.		
I. *Serapias latifolia*, L.	IV	20
II. —— *latifolia?* L. var.	—	—
III. —— *longifolia*, L.	IV	20
IV. —— *rubra*, L.	—	—
V. —— *grandiflora*, L.	IV	20
VI. —— *grandiflora*, L.	—	—
VII. —— *rubra*, L.	IV	20
IX. *Cypripedium calceolus*, L.	IV	23
HELLEBORUS niger. 185 et 186.		
I. *Helleborus fœtidus*, L.	II	465
II. —— *viridis*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *niger*, L.	II	464
V. *Astrantia major*, L.	I	442
VI. —— *minor*, L.	I	*ibid.*
VII. —— *Epipactis*, L.	—	—
IX. *Adonis vernalis*, L.	II	451
HELLEBORUS albus. 186.		
I. *Veratrum album*, L.	IV	252
II. —— *nigrum*, L.	IV	*ibid.*

	tom.	pag.
HEMIONITIS. 353 et 354.		
I. *Asplenium Hemionitis*, L.	IV	324
IV. *Pteris Cretica*, L.	IV	321
HEPTAPHYLLON, *Voyez* TORMENTILLA.		
HIERACIUM Dentis leonis folio acuto. 126 et 127.		
I. *Sonchus arvensis*, L.	III	426
III. *Tragopogon picroïdes*, L.	III	421
VI. *Crepis Dioscoridis*, L.	III	446
VII. —— *rubra*, L.	III	445
VIII. *Hieracium sanctum*, L.	III	440
IX. —— *sanctum*, L.	—	—
X. *Crepis virens*, L.	III	446
XI. *Tragopogon Dalechampii*, L.	III	421
XII. *Leontodon hirtum*, L.	III	436
XIII. —— *hirtum*, L.	III	*ibid.*
HIERACIUM Dentis leonis folio obtuso. 127.		
I. *Hypochœris radicata*, L.	III	452
II. *Hieracium glutinosum*, L.	III	443
IV. *Hypochœris radicata*, L.	III	452
V. —— *radicata*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *glabra*, L.	III	*ibid.*
VIII. *Hyoseris minima*, L.	III	449
HIERACIUM Chondrillæ folio. 127 et 128.		
I. *Crepis biennis*, L.	III	446
II. —— *tectorum*, L.	III	*ibid.*
III. —— *tectorum*, L.	III	*ibid.*
IV. *Leontodon autumnale*, L.	III	435
V. —— *autumnale*, L. var.	III	*ibid.*
HIERACIUM intybaceo folio. 128.		
III. *Crepis rubra*, L.	III	445
HIERACIUM chicoraceo folio, semine adunco. 128.		
I. *Hyoseris hedypnoïs*, L.	III	450
II. *Lapsana stellata*, L.	III	454
III. *Crepis barbata*, L.	III	444
IV. —— *barbata*, L. var.	—	—
HIERACIUM montanum hirsutum. 128 et 129.		
I. *Picris echioïdes*, L.	III	425

	tom.	pag.
II. *Crepis vesicaria*, L.	III	445
III. *Hieracium Pyrœnaïcum*, L. var.	III	442
IV. *Leontodon hispidum*, L. var.	III	436
V. *Hypochœris maculata*, L.	III	452
VI. —— *maculata*, L.	III	*ibid.*
VII. *Hieracium villosum*, L.	III	442
X. —— *aurantiacum*, L.	III	439
XI. —— *aurantiacum*, L.	III	*ibid.*
XV. —— *Alpinum*, L.	III	437
XVI. *Leontodon hispidum*, L. var.	III	436
HIERACIUM montanum glabrum. 129.		
I. *Crepis Sibirica*, L.	—	—
II. *Hieracium paludosum*, L.	III	441
III. —— *chondrilloïdes*, L.	III	440
IV. —— *porrifolium*, L.	III	*ibid.*
HIERACIUM murorum, Pulmonaria Gallorum dicta. 129.		
I. *Hieracium murorum*, L. var. *pilosissima.*	III	441
II. —— *murorum*, L. var. *sylvatica.*	III	*ibid.*
III. —— *cymosum*, L.	III	439
HIERACIUM pratense. 129.		
II. *Hieracium præmorsum*, L.	III	439
III. —— *præmorsum*, L.	III	*ibid.*
HIERACIUM fruticosum. 129.		
I. *Hieracium Sabaudum*, L. var.	—	—
II. —— *Sabaudum*, L.	III	443
IV. —— *umbellatum*, L.	III	*ibid.*
HOLOSTEUM. 190.		
I. *Plantago albicans*, L.	I	197
II. —— *albicans*, L.	—	—
III. —— *Alpina*, L.	I	197
IV. —— *Cretica*, L.	I	*ibid.*
VI. —— *subulata*, L. var.	—	—
VII. —— *subulata*, L.	I	197
VIII. —— *subulata*, L. var.	—	—
IX. *Myosurus minimus*, L.	I	532
HORDEUM 22 et 23.		
I. *Hordeum vulgare*, L. var.	I	143
III. —— *distychon*,	I	*ibid.*

	tom.	pag.
HORMINUM. 238 et 239.		
I. *Salvia Horminum*, L.	I	47
II. —— *Syriaca*, L.	I	*ibid.*
III. —— *Sclarea*, L.	I	50
IV. —— *glutinosa*, L.	I	49
V. —— *verticillata*, L.	I	*ibid.*
VI. —— *pratensis*, L.	I	48
VII. —— *pratensis*, L. var.	—	—
VIII. —— *pratensis*, L. var.	—	—
IX. —— *Verbenaca*, L.	I	48
X. —— *sylvestris*, L.	I	47
XI. —— *nemorosa*, L.	I	*ibid.*
XIV. *Betonica alopecuros*, L.	—	—
HYACINTHUS comosus. 42.		
I. *Hyacinthus comosus*, L.	II	58
II. —— *Romanus*, L.	II	57
V. —— *monstrosus*, L.	II	58
HYACINTHUS racemosus. 42 et 43.		
I. *Hyacinthus botryoïdes*, L.	II	58
VI. —— *botryoïdes*, L.	—	—
VII. —— *racemosus*, L.	II	58
VIII. —— *Muscari*, L.	II	*ibid.*
HYACINTHUS oblongo flore. 43 et 44.		
I. *Hyacinthus non scriptus*, L.	II	56
III. —— *serotinus*, L.	II	57
VIII. —— *amethystinus*, L.	II	*ibid.*
HYACINTHUS Orientalis. 44 et 45.		
I. *Hyacinthus Orientalis*, L.	II	57
(Tous les numéros de ce genre ne sont que des variétés de l'*Hyacinthus Orientalis*, L.)		
HYACINTHUS Orientalis flore pleno. 45.		
I. *Hyacinthus Orientalis*, L. var.	—	—
II. —— *Orientalis*, L. var.	—	—
III. —— *Orientalis*, L. var.	—	—
HYACINTHUS stellaris. 45 et 46.		
I. *Scilla bifolia*, L.	II	44
II. —— *bifolia*, L. var.	II	*ibid.*

	tom.	pag.
IV. *Scilla Lusitanica*, L.	II	44
VI. —— *Italica*, L.	II	43
VII. —— *amœna*, L.	II	*ibid.*
XIII. —— *Lilio–Hyacinthus*, L.	II	*ibid.*
XV. —— *autumnalis*, L.	II	44
HYACINTHUS Indicus. 47.		
I. *Scilla Peruviana*, L.	II	43
III. *Polyanthes tuberosa*, L. var.	II	56
IV. —— *tuberosa*, L.	II	*ibid.*
HYDROPIPER *seu* PERSICARIA. 101.		
I. *Polygonum Persicaria*, L.	II	143
II. —— *Hydropiper*, L.	II	142
III. —— *Persicaria*, L. var.	II	143
IV. —— *Persicaria*, L. var.	II	*ibid.*
HYPECOON. 172.		
I. *Hypecoum procumbens*, L.	I	222
II. —— *pendulum*, L.	I	*ibid.*
HYOSCYAMUS. 169.		
I. *Hyoscyamus niger*, L.	I	336
II. —— *albus*, L.	I	*ibid.*
III. —— *albus*, L. var.	I	*ibid.*
IV. —— *aureus*, L. var.	I	337
V. —— *aureus*, L.	I	*ibid.*
VI. —— *reticulatus*, L.	I	336
VII. —— *reticulatus*, L.	I	*ibid.*
HYPERICUM. 279.		
I. *Hypericum perforatum*, L.	III	400
I. bis —— *quadrangulare*, L.	III	*ibid.*
II. —— *nummularium*, L.	III	402
III. —— *crispum*, L.	III	401
IV. —— *pulchrum*, L.	III	402
V. —— *humifusum*, L.	III	400
VI. —— *tomentosum*, L. var.	III	402
VII. —— *tomentosum*, L.	III	*ibid.*
HYPERICUM Ascyron dictum. 280.		
I. *Hypericum Elodes*, L.	III	401
II. —— *montanum*,	III	*ibid.*
III. —— *Ascyrum*, L.	III	398

	tom.	pag.
IV. *Hypericum hirsutum?* L.	III	402
VII. —— *Andr sœmum*, L.	III	398
VIII —— *hircinum*, L.	III	399
HYPOCISTIS. 465.		
Cytinus Hypocistis, L.	IV	43
HYSSOPUS. 217 et 218.		
I. *Hyssopus officinalis*, L.	III	22
II —— *officinalis*, L. var.	III	*ibid.*
XII. *Thymbra verticillata*, L.	III	21
XIII. *Lythrum hyssopifolia*, L.	II	294

I.

IBERIS 97.		
I. *Lepidium ruderale*, L.	—	—
II. —— *Iberis*, L.	III	157
ILEX et SMILAX Arcadum. 424 et 425.		
I. *Quercus Ilex*, L.	IV	125
II. —— *Ilex*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *Ilex*, L.	—	—
IV. —— *coccifera*, L.	IV	126
V. *Ilex aquifolium*, L.	IV	223
IMPERATORIA. 156.		
Imperatoria Ostruthium, L.	I	485
INTYBUS *sive* ENDIVIA. 125.		
I. *Cichorium Endivia*, L.	III	456
II. —— *Endivia?* L. var.	—	—
III. —— *Endivia*, L.	III	456
IRIS latifolia. 30 et 31.		
I. *Iris Germanica*, L.	I	79
II. —— *Germanica*, L.	—	—
V. —— *Florentina*, L.	I	79
IRIS latifolia peregrina major. 31.		
I. *Iris Susiana*, L.	I	*ibid.*
III. —— *Susiana?* L.	—	—
VI. —— *Susiana?* L.	—	—
IRIS latifolia Germanica et Pannonica. 31 et 32.		
II. *Iris sambucina*, L.	I	79

	tom.	pag.
VI. *Iris variegata*, L.	I	80
VIII. —— *aphylla*, L.	I	79
IRIS angustifolia. 32 et 33.		
I. *Iris spuria*, L.	I	81
II. —— *Sibirica*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *pumila*, L.	I	80
IX. —— *graminea*, L.	I	81
X. —— *graminea*, L. var.	—	—
IRIS bulbosa latifolia. 38.		
II. *Iris Xiphium*, L.	I	82
IV. —— *Xiphium*, L.	—	—
IRIS bulbosa cærulea. 40.		
I. *Iris Xiphium*, L.	—	—
IV. —— *Xiphium*, L. var.	—	—
IRIS tuberosa. 40.		
IV *Iris tuberosa*, L.	I	82
ISATIS *sive* GLASTUM. 113.		
I. *Isatis tinctoria*, L. var.	III	203
II. —— *tinctoria*, L.	III	*ibid.*
III. *Indigofera tinctoria*, L.	III	354

J.

JACEA non laciniata. 271.		
I. *Centaurea Jacea*, L.	III	603
II. —— *Jacea*, L. var.	III	*ibid.*
III. *Stehælina Chamæpitce*, L. var.	III	491
IV. *Centaurea montana*, L.	III	603
VII. —— *Phrygia*, L.	III	601
VIII. —— *Phrygia*, L.	III	*ibid.*
IX. —— *Phrygia*, L. var.	III	*ibid.*
JACEA laciniata. 271 et 272.		
I. *Centaurea nigra*, L.	III	602
II. —— *pullata*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *rupestris*, L.	III	610
V. —— *Babylonica*, L.	III	606
JACEA laciniata capite spinoso. 272.		
II. *Centaurea centauroïdes*, L.	III	610

	tom.	pag.
III. *Centaurea collina*, L.	III	610
IV. —— *muricata*, L.	III	611
V. —— *seridis*, L.	III	607
VI. —— *sonchifolia*, L.	III	*ibid.*
JACEA laciniata incana. 272.		
II. *Centaurea pectinata*, L.	—	—
III. —— *pectinata*, L.	III	602
IV. —— *cineraria*, L.	III	604
V. —— *conifera*, L.	III	607
JACEA oleæ folio. 272.		
I. *Xeranthemum annuum*, L. var.	III	516
II. —— *annuum*, L.	III	*ibid.*
III. —— *annuum*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *annuum*, L. var.	III	*ibid.*
JACOBÆA. 131.		
I. *Senecio Jacobæa*, L.	III	534
II. —— *Sarracenicus*, L.	III	535
III. *Cineraria maritima*, L.	III	547
IV. *Senecio erucæfolius*, L.	III	534
V. *Cineraria Canadensis*, L.	III	547
VI. —— *Alpina*, L. var.	III	*ibid.*
VII. —— *Alpina*. L.	III	*ibid.*
VIII. —— *Alpina*, L. var.	III	*ibid.*
IX. *Inula Provincialis*, L.	III	552
JASMINUM. 397 et 398.		
I. *Jasminum officinale*, L.	I	18
II. —— *humile*, L.	I	*ibid.*
III. —— *grandiflorum*, L.	I	*ibid.*
V. —— *fruticans*, L.	I	*ibid.*
VI. *Ipomæa Quamoclit*, L.	I	299
JUNCUS odoratus *sive* aromaticus. 11.		
I. *Andropogon Schœnanthus*, L.	IV	255
JUNCUS ACUTUS. 11.		
I. *Juncus acutus*, L.	—	—
II. *Scirpus Holoschœnus*, L.	I	94
III. —— *mucronatus*, L.	I	95
IV. *Juncus inflexus*, L. var.	II	67

	tom.	pag.
JUNCUS LÆVIS. 12.		
II. *Scirpus lacustris*, L.	I	94
IV. *Juncus effusus*, L.	II	67
VI. —— *filiformis*, L.	II	*ibid.*
VII. —— *conglomeratus*, L.	II	*ibid.*
VIII. —— *triglumis*, L.	II	69
IX. *Scirpus setaceus*, L.	—	—
JUNCUS acumine reflexo. 12.		
I. *Juncus inflexus*, L.	II	67
II. —— *inflexus*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *trifidus*, L.	II	68
JUNCUS capitulis equiseti. 12.		
I. *Scirpus palustris*, L.	I	93
II. —— *fluitans*, L.	I	94
JUNCUS capitulo lanuginoso et bombycino. 12.		
I. *Eriophorum vaginatum*, L.	—	—
II. —— *Alpinum*, L.	I	99
JUNCUS floridus. 12.		
I. *Butomus umbellatus*, L.	II	162
II. *Scheuchzeria palustris*, L.	II	80
JUNIPERUS. 488.		
I. *Juniperus communis*, L.	IV	231
II. —— *communis*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *communis*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *oxycedrus*, L.	IV	*ibid.*

K.

KALI. 289.		
I. *Salsola Soda*, L.	I	421
II. *Chenopodium maritimum*, L.	I	419
III. *Salsola sativa*, L.	I	421
IV. —— *hirsuta*, L.	I	422
V. —— *altissima*, L.	I	421
VI. *Reaumuria vermiculata*, L.	—	—
VII. *Mesembryanthemum nodiflorum*, L.	II	347
VIII. —— *copticum*, L.	II	*ibid.*
IX. *Salicornia fruticosa ?* L.	I	10
X. *Anabasis aphylla*, L.	I	423

L.

	tom.	pag.
LABURNUM. *Voyez* CYTISUS.		
LACTUCA hortensis. 122 et 123.		
I. *Lactuca sativa*, L.	III	429
(Les numeros de ce genre ne sont que des variétés de la *Laitue cultivée.*)		
LACTUCA sylvestris. 123.		
I. *Lactuca Scariola*, L.	III	429
II. —— *virosa*, L.	III	430
III. *Prenanthes purpurea*, L. var.	III	432
IV. —— *purpurea*, L.	III	*ibid.*
LAMIUM *vel* URTICA MORTUA. 230 et 231.		
I. *Lamium purpureum*, L.	III	37
II. —— *album*, L.	III	36
III. *Galeopsis Galeobdolon*, L.	III	38
IV. *Lamium maculatum*, L.	III	36
V. —— *maculatum*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *amplexicaule*, L. var.	III	37
VII. —— *amplexicaule*, L.	III	*ibid.*
VIII. *Stachys sylvatica*, L.	III	40
IX. *Lamium Orvala*, L.	III	36
X. *Melitis melissophyllum*, L.	III	65
XI. *Scutellaria peregrina*, L.	III	70
LAPPA *sive* ARCTIUM. 198.		
I. *Arctium Lappa*, L.	III	458
III. —— *Lappa*, L. var.	III	*ibid.*
VI. *Xanthium Strumarium*, L.	IV	107
LARIX. 493.		
Pinus Larix, L.	IV	139
LASERPITIUM. 156.		
II. *Laserpitium Gallicum*, L.	I	464
LAVANDULA. 216.		
I. *Lavandula Spica*, L. var.	III	26
II. —— *Spica*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *multifida*, L.	III	*ibid.*
LATHYRIS. 293.		
I. *Euphorbia Lathyris*, L.	II	305

	tom.	pag.
LATHYRUS *sive* CICERCULA. 343 et 344.		
I. *Lathyrus sativus*, L. var.	III	319
II. —— *Cicera*, L.	III	318
III. —— *sylvestris*, L.	III	321
V. —— *Nissolia*, L.	III	318
VI. —— *latifolius*, L.	III	321
VII. —— *hirsutus*, L.	III	320
IX. —— *articulatus*, L.	III	319
X. —— *articulatus*, L. var.	III	*ibid.*
XI. —— *setifolius*, L.	III	*ibid.*
XII. —— *palustris*, L.	III	321
XIII. —— *pratensis*, L.	III	*ibid.*
XIV. —— *tuberosus*, L.	III	320
LAUREOLA. 462.		
I. *Daphne Laureola*, L.	II	133
II. —— *Mezereum*, L.	II	132
LAURUS. 460.		
II. *Laurus nobilis*, L.	II	157
LAURUS sylvestris. 461.		
I. *Viburnum Tinus*, L.	I	501
II. —— *Tinus*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *Tinus*, L. var.	I	*ibid.*
LAURIFOLIO EXOTICÆ. 461.		
III. *Garcinia Mangostana*, L.	II	285
LENS. 346.		
I. *Ervum Lens*, L.	III	327
II. —— *Lens*, L.	—	—
LENTICULA palustris. 362.		
I. *Lemna minor*, L.	IV	74
II. *Callitriche verna*, L.	—	—
III. *Lemna trisulca*, L.	IV	74
IV. *Marsilea quadrifolia*, L.	IV	343
V. —— *natans*, L.	IV	*ibid.*
VI. *Pistia Stratiotes*, L.	IV	41
LENTISCUS *et* MOLLE. 398 et 399.		
I. *Pistacia Lentiscus*, L.	IV	200
II. *Schinus Molle*, L.	IV	223
VII. *Pavetta Indica*, L.	I	189

	tom.	pag.
LEONTOPETALON. 324.		
Leontice Leontopetalum, L,	II	49
LEPIDIUM. 97.		
I. *Lepidium latifolium*, L.	III	156
II. *Cochlearia glastifolia*, L.	III	162
III. *Plumbago Europæa*, L.	I	288
LEUCOIUM bulbosum. 55 et 56.		
I. *Leucoïum vernum*, L.	II	13
III. —— *æstivum*, L.	II	14
IV. *Galanthus nivalis*, L.	II	13
VIII. *Leucoïum autumnale*, L.	II	14
LEUCOIUM non bulbosum, incano folio, hortense. 200 et 201.		
I. *Cheiranthus incanus*, L.	III	185
II. —— *incanus*, L.	III	*ibid.*
III. —— *annuus*, L.	III	186
IV. —— *incanus*, L.	III	185
V. —— *incanus*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *incanus*, L.	III	*ibid.*
LEUCOIUM incanum maritimum. 201.		
I. *Hesperis verna*, L.	III	189
II. *Cheiranthus sinuatus*, L.	III	187
III. —— *littoreus*, L.	III	186
VI. —— *trilobus*, L.	III	*ibid.*
VII. *Alyssum delthoïdeum*, L.	III	168
LEUCOIUM Creticum. 201.		
IV. *Verbascum spinosum*, L.	I	333
LEUCOIUM luteum folio hirsuto. 201.		
I. *Alyssum clypeatum*, L.	III	167
III. —— *sinuatum*, L.	III	168
V. *Erysimum hieracifolium*, L.	III	183
LEUCOIUM folio viridi. 202.		
III. *Cheiranthus Cheiri*, L. var.	III	185
IV. —— *Cheiri*, L. var.	III	*ibid.*
V. —— *Cheiri*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *Cheiri*, L. var.	III	*ibid.*
VII. —— *Cheiri*, L. var.	III	*ibid.*
VIII. —— *erysimoïdes*, L.	III	184
IX. *Lobelia Dortmana*, L.	—	—

	tom.	pag.
LIBANOTIS. 157.		
I. *Laserpitium latifolium*, L.	I	464
II. —— *latifolium*, L.	I	*ibid.*
IV. *Athamantha Libanotis*, L.	I	457
VI. *Laserpitium trilobum*, L.	I	464
VII. *Ligusticum Levisticum*, L.	—	—
LICHEN. 362.		
I. *Marchantia polymorpha*, L.	IV	373
II. —— *polymorpha*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *polymorpha*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *conica*, L.	IV	374
VI. *Jungermannia epiphylla*, L.	IV	371
VII. *Targionia hypophylla*, L.	IV	372
VIII. *Bryum glaucum*, L.	IV	358
LIGNUM Guajacum. 448.		
I. *Guaïacum officinale*, L.	II	184
II. —— *sanctum*, L.	II	*ibid.*
LIGUSTICUM. 162.		
I. *Laserpitium Siler*, L.	I	465
III. —— *Siler*, L.	—	—
LIGUSTRUM. 475 et 476.		
I. *Ligustrum vulgare*, L.	I	19
III. *Syringa Persica*, L.	—	—
IV. *Lawsonia inermis*, L.	II	118
LILIUM album. 76.		
I. *Lilium candidum*, L.	II	31
II. —— *candidum*, L. var.	II	*ibid.*
LILIUM purpuro croceum. 76 et 77.		
I. *Lilium bulbiferum*, L.	II	32
II. —— *bulbiferum*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *bulbiferum*, L. var.	II	*ibid.*
IV. —— *bulbiferum*, L. var.	II	*ibid.*
LILIUM bulbiferum. 77.		
I. *Lilium bulbiferum*, L. var.	II	32
II. —— *bulbiferum*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *bulbiferum*, L. var.	II	*ibid.*
IV. —— *bulbiferum*, L. var.	II	*ibid.*

	tom.	pag.
LILIUM floribus reflexis, latifolium. 77 et 78.		
I. *Lilium Martagon*, L.	II	33
II. —— *Martagon*, L.	II	*ibid.*
III. —— *Martagon*, L. var.	—	—
IV. —— *Martagon*, L. var.	—	—
VII. —— *Chalcedonicum*, L.	II	33
VIII. —— *Chalcedonicum*, L. var.	II	*ibid.*
IX. —— *Chalcedonicum*, L.	II	*ibid.*
LILIUM floribus reflexis, angustifolium. 78 et 79.		
I. *Lilium Pomponicum*, L.	II	32
II. —— *Pomponicum*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *Pomponicum*, L. var.	II	*ibid.*
LILIUM *sive* CORONA IMPERIALIS. 79.		
I. *Fritillaria imperialis*, L.	II	34
II. —— *imperialis*, L. var.	—	—
III. —— *imperialis*, L. var.	—	—
LILIUM Persicum. 79.		
I. *Fritillaria Persica*, L.	II	35
LILIUM Asphodeli radice. 80.		
I. *Hemerocallis flava*, L.	II	64
II. —— *fulva*, L.	II	*ibid.*
LILIUM CONVALLIUM. 304.		
I. *Convallaria majalis*, L. var.	II	53
II. —— *majalis*, L.	II	*ibid.*
III. —— *majalis*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *majalis*, L.	—	—
LIMONIUM. 192.		
I. *Statice Limonium*, L.	I	517
III. —— *Limonium*, L. var.	I	*ibid.*
V. —— *cordata*, L.	I	*ibid.*
VI. —— *minuta*, L.	—	—
VII. —— *sinuata*, L.	I	519
VIII. —— *Sarracenia purpurea*, L.	II	397
LINARIA erecta latifolia. 212.		
I. *Antirrhinum Dalmaticum*, L.	III	94
II. —— *linifolium*, L.	III	95
IV. —— *triphyllum*, L.	III	91
V. —— *triphyllum*, L. var.	III	*ibid.*
VII. —— *bellidifolium*, L.	III	97

	tom.	pag.
LINARIA erecta, angustifolia. 212 et 213.		
I. *Chenopodium Scoparia*, L.	I	418
II. *Osyris alba*, L.	IV	190
III. *Antirrhinum Linaria*, L.	III	95
VI. *Chrysocoma Lynosiris*, L.	III	493
VII. —— *Lynosiris*, L.	III	*ibid.*
VIII. *Antirrhinum genistæfolium*, L.	III	94
X. —— *purpureum*, L.	III	91
XI. —— *Monspessulanum*, L.	III	92
XII. *Linum tenuifolium*, L. var.	I	521
XIV. *Antirrhinum arvense*, L. var.	III	92
XV. *Thesium Linophyllum*, L.	I	393
XVII. *Antirrhinum arvense*, L. var.	III	92
XVIII. *Senecio linifolius*, L.	III	535
LINARIA pumila *seu* repens. 213.		
I. *Antirrhinum supinum*, L.	III	92
II. —— *arvense*, L.	III	*ibid.*
III. —— *Alpinum*, L. var.	III	93
IV —— *Alpinum*, L. var.	III	*ibid.*
V. —— *Alpinum*, L.	III	*ibid.*
LINGUA CERVINA. 353.		
I. *Asplenium Scolopendrium*, L.	IV	324
II. —— *Scolopendrium*, L. var.	IV	*ibid.*
LINUM latifolium. 214.		
I. *Linum usitatissimum*, L. var.	I	520
II. —— *usitatissimum*, L.	I	*ibid.*
VI. —— *viscosum*, L.	I	521
VII. —— *Narbonense*, L.	I	*ibid.*
VIII. —— *flavum*, L.	I	523
IX. —— *campanulatum*, L.	I	*ibid.*
X. —— *nodiflorum*, L.	I	*ibid.*
XII. —— *maritimum*, L.	I	522
LINUM sylvestre angustifolium. 214.		
I. *Linum tenuifolium*, L.	I	521
II. —— *tenuifolium*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *tenuifolium*, L. var.	I	*ibid.*
IV. —— *Austriacum*, L.	I	522
V. —— *Gallicum*, L.	I	*ibid.*

	tom.	pag.
VI. *Lysimachia Linum stellatum*, L.	I	228
VII. *Linum catharticum*, L.	I	523
LITHOSPERMUM. 258 et 259.		
I. *Coix Lachryma*, L.	IV	79
III. *Lithospermum officinale*, L.	I	252
V. —— *purpuro-cœruleum*, L.	I	253
VII. —— *arvense*, L.	I	252
VIII. *Stellera passerina*, L.	II	136
IX. *Linum strictum*, L.	I	523
LOBIS. (De) 403 et 404.		
I. *Mimosa scandens*, L.	IV	283
IV. *Hymœnea Courbaril*, L.	II	176
XVII. *Epidendrum Vanilla*, L.	IV	24
LONCHITIS. 358 et 359.		
I. *Polypodium Lonchitis*, L.	IV	352
II. *Osmunda Spicant*, L.	IV	315
III. *Acrosticum Marantæ*, L.	IV	318
LOTUS pentaphyllos siliquis rectis. 332.		
I. *Lotus corniculatus*, L.	III	380
II. —— *angustissimus*, L.	III	378
III. —— *corniculatus*, L. var.	III	380
VI. —— *corniculatus*, L. var.	III	*ibid.*
IX. —— *hirsutus*, L.	III	379
X. —— *rectus*, L.	III	*ibid.*
XI. *Cytisus argenteus*, L.	III	332
XII. *Lotus siliquosus*, L.	III	378
XIII. —— *tetragonolobus*, L.	III	*ibid.*
LOTUS pentaphyllos siliquâ convexâ. 332.		
I. *Lotus edulis*, L.	—	—
II. —— *ornithopodioïdes*, L.	III	379
III. *Anthyllis lotoïdes*, L.	III	300
IV. —— *tetraphylla*, L.	III	299
LOTO AFFINIS. 332 et 333.		
I. *Cassia Absus*, L.	II	177
II. *Anthyllis Vulneraria*, L.	III	299
III. —— *Vulneraria*, L. var.	III	*ibid.*
IV. *Medicago circinnata*, L.	III	384

	tom.	pag.
LOTUS 447 et 448.		
I. *Celtis Australis*, L.	IV	278
II. *Diospyros Lotus*, L.	IV	291
III. —— *Lotus*, L. var.	IV	*ibid.*
IV. —— *Virginicus*, L.	IV	*ibid.*
LUNARIA. 354 et 355.		
I. *Osmunda Lunaria*, L.	IV	313
II. —— *Lunaria*, L. var.	IV	*ibid.*
IV. —— *Lunaria*, L.	IV	*ibid.*
LUPINUS. 347 et 348.		
I. *Lupinus albus*, L.	III	303
II. —— *varius*, L.	III	304
III. —— *luteus*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *hirsutus*, L.	III	*ibid.*
LUPULUS. 298.		
I. *Humulus Lupulus*, L.	IV	207
LUTEOLA. 100.		
I. *Reseda Luteola*, L.	II	297
III. *Datisca cannabina*, L.	IV	226
LYCHNIS flore coccineo. 203.		
I. *Lychnis Chalcedonica*, L.	II	269
LYCHNIS coronaria. 203 et 204.		
I. *Agrostema Coronaria*, L.	II	268
III. —— *Flos Jovis*, L.	II	*ibid.*
IV. *Lychnis dioïca*, L. var.	II	270
V. —— *dioïca*, L. var.	II	*ibid.*
VII. —— *dioïca*, L.	II	*ibid.*
LYCHNIS segetum. 204.		
I. *Agrostema Githago*, L.	II	267
II. *Cerastium dichotomum*, L.	II	272
III. *Saponaria Vaccaria*, L.	II	232
LYCHNIS sylvestris. 205.		
I. *Cucubalus Behen*, L.	II	238
II. *Silene conoidea*, L.	II	242
III. —— *conica*, L.	II	*ibid.*
V. —— *fruticosa*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *noctiflora*, L.	II	243

	tom.	pag.
VII. *Silene polyphylla*, L.	II	244
VIII. —— *amœna*, L.	II	241
LYCHNIS viscosa. 205 et 206.		
I. *Silene nutans*, L.	II	241
II. *Lychnis quadridentata*, L.	II	269
IV. —— *viscaria*, L.	II	*ibid.*
V. *Silene Muscipula*, L.	II	244
VI. —— *Armeria*, L.	II	*ibid.*
X. *Cucubalus otites*, L.	II	239
LYCHNIS hirsuta. 206.		
IV. *Silene quinque vulnera*, L.	II	240
V. *Velezia rigida*, L.	I	429
VI. *Cerastium repens*, L.	II	272
LYCHNIS Alpina. 206.		
I. *Saponaria ocymoïdes*, L.	II	232
IV. *Silene acaulis*, L.	II	245
LYCIUM. 478.		
I. *Rhamnus saxatilis*, L.	—	—
II. —— *saxatilis*, L.	I	363
VI. —— *infectorius*, L.	I	362
VIII. —— *infectorius?* L.	I	*ibid.*
LYCOPSIS. 255.		
I. *Echium Italicum*, L. var.	I	265
LYSIMACHIA lutea. 245.		
I. *Lysimachia vulgaris*, L.	I	280
II. —— *punctata*, L.	I	281
IV. —— *thyrsiflora*, L.	I	*ibid.*
V. *Oenothera biennis*, L.	II	107
LYSIMACHIA siliquosa. 245.		
I. *Epilobium hirsutum*, L.	II	109
II. —— *hirsutum*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *montanum*, L.	II	110
IV. —— *tetragonum*, L.	II	*ibid.*
V. —— *palustre*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *angustifolium*, L. var.	II	109
VII. —— *angustifolium*, L.	II	*ibid.*
VIII. —— *angustifolia*, L. var.	II	*ibid.*

	tom.	pag.
LYSIMACHIA spicata. 246.		
I. *Lythrum Salicaria*, L.	II	293
II. *Veronica maritima*, L.	I	25
LYSIMACHIA non spicata. 246.		
I. *Lythrum virgatum*, L.	II	293
II. —— *hyssopifolia*, L. var.	II	294
III. *Scutellaria galericulata*, L.	III	70

M.

MALVA. 314 et 315.		
I. *Malva rotundifolia*, L.	III	242
II. —— *sylvestris*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *Mauritiana*, L.	III	*ibid.*
V. —— *crispa*, L.	III	243
VI. *Lavatera trimestris*, L.	III	246
VII. *Alcæa Rosea*, L.	III	239
VIII. —— *Rosea*, L. var.	III	*ibid.*
IX. —— *ficifolia*, L.	III	*ibid.*
X. *Malva Mauritiana*, L. var.	III	242
XI. *Lavatera arborea*, L.	III	245
MALUM. 433.		
I. *Pyrus Malus*, L. var. *paradisiaca.*	II	344
ARBORES pomiferæ exoticæ. 433 et 434.		
II. *Averrhoa Carambola*, L.	II	256
X. *Adansonia digitata*, L.	III	232
XIV. *Cerbera Ahouahi*, L.	I	396
MALUS CYDONIA. 434.		
I. *Pyrus Cydonia*, L. var.	II	345
II. —— *Cydonia*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *Cydonia*, L.	—	—
IV. —— *Cydonia*, L.	—	—
V. *Cratæva Marmelos*, L.	II	288
MALUS CITRIA. 435.		
I. *Citrus medica*, L.	III	392
MALUS LIMONIA. 436.		
I. *Citrus medica*, L. var.	III	*ibid.*
MALUS ARANTIA. 436 et 437.		
I. *Citrus Aurantium*, L.	III	393
II. —— *Aurantium*, L. var.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
MALO ARANTIO similes exoticæ. 437.		
V. *Psidium pomiferum*, L.	II	323
MALUS ADAMI. 437.		
Citrus medica, L. var.	—	—
MALUS PUNICA. 437 et 438.		
I. *Punica Granatum*, L.	II	328
II. —— *Granatum*, L.	II	*ibid.*
III. —— *Granatum*, L. var.	II	*ibid.*
IV. —— *Granatum*, L. var.	II	*ibid.*
MALUS Persica. 439 et 440.		
I. *Amygdalus Persica*, L.	II	329
II. —— *Persica*, L.	—	—
III. —— *Persica*, L.	—	—
VI. —— *Persica*, L. var.	II	329
PERSICÆ similes exoticæ. 440.		
II. *Mangifera Indica*, L.	I	377
IV. *Cerbera Manghas*, L.	I	396
V. *Eugenia Jambos*, L.	II	323
MANDRAGORA. 169.		
I. *Atropa Mandragora*, L.	I	339
II. —— *Mandragora*, L.	—	—
MANIHOT Indorum. 90.		
IV. *Jatropha Manihot*, L.	IV	151
MARRUBIUM nigrum. 229 et 230.		
I. *Leonurus Cardiaca*, L.	III	48
II. *Lycopus Europæus*, L.	I	41
III. —— *Europæus*, L. var.	—	—
IV. *Ballota nigra*, L.	III	44
V. *Stachys hirta*, L.	III	42
VI. *Phlomis Herba venti*, L.	III	50
MARRUBIUM album. 230.		
I. *Marrubium vulgare*, L.	III	46
II. —— *vulgare*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *vulgare*, L. var.	—	—
IV. —— *peregrinum*, L.	III	45
V. —— *peregrinum*, L. var.	III	*ibid.*
MATRICARIA. 133 et 134.		
I. *Matricaria Parthenium*, L.	III	569

	tom.	pag.
II. *Matricaria Parthenium*, L.	III	569
VI. *Achillea atrata*, L.	III	581
VIII. *Anthemis maritima*, L.	III	575
MELAMPYRUM. 234.		
I. *Melampyrum arvense*, L.	III	80
II. —— *nemorosum*, L.	III	*ibid.*
III. —— *arvense*, L.	—	—
IV. —— *pratense*, L.	III	80
V. —— *cristatum*, L.	III	*ibid.*
VI. *Ranunculus falcatus*, L.	II	461
MELANTHIUM. *Voyez* NIGELLA.		
MELILOTUS. 331.		
I. *Trifolium Melilotus officinale*, L. var.	III	369
II. *Trigonella corniculata*, L.	III	382
III. —— *hamosa*, L.	III	381
IV. *Trifolium Melilotus Italica*, L.	III	370
V. —— *Melilotus Indica*, L.	III	369
VI. —— *Melilotus cærulea*, L.	III	*ibid.*
MELISSA. 229.		
I. *Melissa officinalis*, L.	III	60
II. *Dracocephalum Moldavica*, L.	III	63
III. *Molucella lævis*, L.	III	51
IV. —— *spinosa*, L.	III	52
MELO. 310.		
I. *Cucumis Melo*, L.	IV.	164
II. —— *Melo*, L.	—	—
MELOCACTUS. *Voyez* CARDUI aliquot exotici.		
MELOPEPO. 312.		
I. *Cucurbita Melopepo*, L.	IV	162
MENTHA sativa. 226 et 227.		
I. *Tanacetum Balsamita*, L.	III	500
III. *Mentha gentilis*, L.	III	32
IV. —— *sativa*, L.	III	*ibid.*
VII. —— *viridis*, L.	III	30
MENTHA sylvestris *sive* MENTASTRUM. 227.		
I. *Mentha rotundifolia*, L.	III	31
II. —— *sylvestris*, L.	III	30

	tom.	pag.
V. *Nepeta Pannonica*, L.	III	23
VII. —— *tuberosa*, L.	III	24
MERCURIALIS. 121 et 122.		
I. *Mercurialis annua*, L. (*fœmina*).	IV	219
II. —— *annua*, L. (*mas*).	IV	*ibid.*
III. —— *perennis*, L. (*fœmina*).	IV	*ibid.*
IV. —— *perennis*, L. (*mas*).	IV	*ibid.*
V. *Theligonum Cynocrambe*, L.	IV	122
MESPILUS. 453 et 454.		
I. *Mespilus Germanica*, L.	II	342
II. —— *Germanica*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *Germanica*, L. var.	—	—
IV. *Cratægus coccinea*, L.	II	338
VI. —— *Azarolus*, L.	II	339
VII. —— *Torminalis*, L.	II	338
VIII. —— *Oxyacantha*, L.	II	339
IX. *Mespilus Pyracantha*, L.	II	342
MEUM. 147 et 148.		
I. *Æthusa Meum*, L.	I	480
III. *Phellandrium Mutellina*, L.	I	478
IV. *Seseli montanum*, L.	I	486
MILIUM. 26.		
I. *Panicum miliaceum*, L.	I	108
IV. *Holcus bicolor*, L.	IV	257
MILLEFOLIUM. *Voyez* ACHILLEA.		
MOLLUGO. 334.		
I. *Galium sylvaticum*, L.	I	183
II. —— *Mollugo*, L.	I	*ibid.*
MOLY. 75.		
I. *Allium magicum*, L.	II	25
IV. —— *Moly*, L.	II	30
VIII. —— *subhirsutum*, L.	II	25
IX. —— *Chamæ-Moly*, L.	II	30
X. —— *triquetrum*, L.	II	29
XIV. —— *moscatum*, L.	II	27
MONOPHYLLUM. 304.		
Convallaria bifolia, L.	II	55

	tom.	pag.
MONORCHIS et TRIORCHIS. 84.		
I. *Ophrys monorchis*, L.	IV	17
II. —— *monorchis*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *monorchis*, L. var.	IV	*ibid.*
IV. —— *monorchis*, L. var.	IV	*ibid.*
VI. —— *spiralis*, L. var.	IV	15
VII. —— *spiralis*, L.	IV	*ibid.*
VIII. *Satyrium repens*, L.	IV	14
MORUS. 459.		
I. *Morus nigra*, L.	IV	105
II. —— *alba*, L.	IV	104
MUSCUS terrestris repens. 360.		
II. *Hypnum proliferum*, L.	—	—
VII. *Lycopodium Helveticum*, L.	IV	347
VIII. —— *denticulatum*, L.	IV	348
X. —— *clavatum*, L.	IV	345
XI. —— *complanatum*, L.	IV	347
MUSCUS terrestris ramosus. 360 et 361.		
I. *Lycopodium Selago*, L.	IV	346
XII. *Mnium serpillifolium*, L. var. *prolifera*	IV	355
MUSCUS terrestris coralloïdes. 361.		
II. *Lichen rangiferinus*, L. var.	IV	390
III. —— *rangiferinus*, L.	IV	*ibid.*
MUSCUS arboreus.		
I. *Lichen plicatus*, L.	IV	392
II. —— *barbatus*, L.	IV	*ibid.*
III. —— *Floridus*, L.	IV	393
VI. —— *articulatus*, L.	IV	*ibid.*
VII. —— *pulmonarius*, L.	IV	383
MUSCUS saxatilis. *Voyez* LICHEN.		
MUSCUS maritimus. 363.		
IV. *Fucus cartilagineus*, L.	IV	401
X. *Conferva bullosa*, L.	IV	404
MYAGRUM. 109.		
I. *Erysimum cheiranthoïdes*, L.	III	183
II. *Myagrum sativum*, L. var.	III	149
III. —— *sativum*, L.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
IV. *Myagrum sativum*, L. var.	III	149
V. —— *perfoliatum*, L.	III	148
VI. —— *rugosum*, L.	—	—
VII. —— *paniculatum*, L.	III	149
MYRICA. *Voyez* TAMARISCUS.		
MYROBOLANI. 445.		
V. *Phyllanthus Emblica*, L.	IV	94
MYRRHIS. 160.		
I. *Scandix odorata*, L.	I	482
II. *Chærophyllum aureum*, L.	I	485
III. —— *sylvestre*, L.	I	484
IV. *Scandix Antriscus*, L.	I	482
V. *Chærophyllum hirsutum*, L.	I	484
VI. —— *hirsutum*, L.	I	*ibid.*
MYRTILLUS. *Voyez* VITIS IDÆA.		
MYRTUS. 468 et 469.		
I. *Myrtus communis*, L. var. *Italica.*	II	324
II. —— *communis*, L. var. *Romana.*	II	*ibid.*
IV. —— *communis*, L. var. *Bætica.*	II	*ibid.*
V. —— *communis*, L. var. *Belgica.*	II	*ibid.*
VII. —— *communis*, L. var. *Lusitanica.*	II	*ibid.*
VIII. —— *communis*, L. var. *mucronata.*	II	*ibid.*
IX. —— *communis*, L. var. *Tarentina.*	II	*ibid.*
MYRTO similes exoticæ. 469.		
II. *Nyctantes Arbor tristis*, L.	I	17

N.

NAPUS. 95.		
I. *Brassica Napus*, L. var. *sativa.*	III	193
II. —— *Napus*, L.	III	*ibid.*
NARCISSUS poraceo folio, angusto calice, latifolius, simplex, uno flore. 48 et 49.		
V. *Narcissus poëticus*, L.	II	15
NARCISSUS latifolius, simplex, pluribus floribus. 49.		
I. *Narcissus Orientalis*, L. var.	II	16
IV. —— *minor*, L.	—	—

	tom.	pag.
NARCISSUS medio luteus. 50.		
V. *Narcissus Orientalis*, L. var.	II	16
XI —— *Tazeta*, L.	II	*ibid.*
XIII. —— *Orientalis*, L.	II	*ibid.*
NARCISSUS totus luteus. 50 et 51.		
V. *Narcissus calathinus*, L.	II	17
NARCISSUS porraceo angusto folio. 51.		
III. *Narcissus trilobus*, L.	II	*ibid.*
NARCISSUS juncifolius simplex, luteus et albus. 51.		
I. *Narcissus Joncquilla*, L.	II	18
II. —— *Joncquilla*, L.	II	*ibid.*
VIII. —— *serotinus*, L.	II	*ibid.*
IX. *Anthericum serotinum*, L.	II	46
NARCISSUS magno et oblongo tubo vel calice, latifolius. 52 et 53.		
IV. *Narcissus moschatus*, L.	—	—
VI. —— *moschatus*, L.	II	16
VII. —— *bicolor*, L. var.	II	*ibid.*
VIII. —— *Pseudo-Narcissus*, L.	II	15
IX. —— *bicolor*, L. var.	—	—
XI. —— *minor*, L.	II	16
XII. —— *triandrus*, L.	II	*ibid.*
NARCISSUS oblongo calice vel Calathi figurâ, angusto etiam juncifolio. 53.		
III. *Narcissus Bulbocodium*, L.	II	17
IV. —— *Bulbocodium*, L.	—	—
V. —— *Bulbocodium*, L.	—	—
NARCISSUS pleno flore. 53 et 54.		
X. *Narcissus Pseudo-Narcissus*, L.	III	15
XII. —— *Pseudo-Narcissus*, L. var.	II	*ibid.*
NARCISSUS maritimus. 54 et 55.		
I. *Pancratium maritimum*, L.	II	19
II. —— *Illyricum*, L.	II	*ibid.*
NARDUS. 13.		
Nardus Gangitis, L.	I	99
NARDUS montana et Celtica. 165.		
I. *Valeriana tuberosa*, L.	I	65

	tom.	pag.
II. *Valeriana tuberosa*, L.	I	63
IV. —— *Celtica*, L.	I	*ibid.*
V. —— *Celtica*, L.	—	—
VI. —— *Celtica*, L.	—	—
VII. —— *saxatilis*, L.	—	—
NASTURTIUM hortense. 103 et 104.		
I. *Lepidium sativum*, L.	—	—
II. —— *sativum*, L.	III	155
III. —— *sativum*, L. var.	III	*ibid.*
NASTURTIUM pratense. 104.		
I. *Cardamine pratensis*, L.	III	176
III. —— *parviflora*, L.	—	—
IV. —— *pratensis*, L. var.	III	176
NASTURTIUM aquaticum. 104.		
I. *Sisymbrium Nasturtium*, L.	III	177
II. *Cardamine amara*, L.	III	176
III. —— *amara*, L. var.	—	—
IV. —— *hirsuta*, L.	III	176
NASTURTIUM montanum. 104.		
III. *Cardamine trifolia*, L.	III	175
IV. —— *resedifolia*, L.	III	*ibid.*
VIII. *Lepidium Alpinum*, L.	III	155
IX. —— *petræum*, L.	III	*ibid.*
XI. *Arabis bellidifolia*, L.	III	190
XII. *Cardamine bellidifolia*, L.	III	174
XIII. *Arabis Halleri*, L.	III	191
NASTURTIUM sylvestre. 105.		
I. *Lepidium ruderale*, L.	III	157
II. *Sisymbrium Sophia*, L.	III	180
III. *Vella annua*, L.	III	150
NASTURTIUM Indicum. 306.		
I. *Tropæolum majus*, L.	II	104
II. —— *minus*, L.	II	*ibid.*
NERION. 464.		
I. *Nerium Oleander*, L.	I	399
II. —— *Oleander*, L. var.	—	—

	tom.	pag.
NICOTIANA. 169 et 170.		
I. *Nicotiana Tabacum*, L.	I	338
III. —— *rustica*, L.	I	*ibid.*
NIGELLA *seu* MELANTHIUM. 145 et 146.		
I. *Nigella arvensis*, L.	II	432
II. —— *Hispanica*, L.	II	*ibid.*
III. —— *Damascena*, L.	II	431
IV. —— *Damascena*, L. var.	II	*ibid.*
V. —— *sativa*, L.	II	432
VI. —— *sativa*, L.	II	*ibid.*
VIII. *Garidella nigellastrum*, L.	II	251
NUMMULARIA. 309 et 310.		
I. *Lysimachia Nummularia*, L.	I	282
II. *Anagallis tenella*, L.	I	283
NUX AVELLANA. *Voyez* CORYLUS.		
NUX JUGLANS. 417.		
I. *Juglans regia*, L.	IV	128
II. —— *regia*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *regia*, L. var.	IV	*ibid.*
IV. —— *regia*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *regia*, L. var.	IV	*ibid.*
ARBORES Indicæ Juglandi similes. 417.		
I. *Mammea Americana*, L.	II	400
V. *Spondias Myrobolanus*, L.	II	257
NUCES exoticæ. 511 et 512.		
II. *Strychnos Nux vomica*, L.	I	351
IV. *Menispermum Cocculus*, L.	IV	227
V. *Avicennia tomentosa*, L.	III	140
VI. *Anacardium Occidentale*, L.	II	159
ARBORES venenatæ. 512.		
III. *Jatropha Manihot*, L.	—	—
NYMPHÆA alba. 193.		
I. *Nymphæa alba*, L.	II	398
II. *Hydrocharis Morsus-ranæ*, L. var.	IV	221
III. —— *Morsus-ranæ*, L.	IV	193
NYMPHÆA lutea. 193 et 194.		
I. *Nymphæa lutea*, L.	II	397

	tom.	pag.
III. *Menyanthes nymphoïdes*, L.	I	277.
IV. —— *nymphoïdes*, L.	I	*ibid.*

O.

OCHRUS *sive* ERVILIA. 343.		
Pisum Ochrus, L.	III	315
OCYMUM. 225 et 226.		
I. *Ocymum Basilicum*, L. var.	III	66
II. —— *Basilicum*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *Basilicum*, L. var.	III	*ibid.*
V. —— *Basilicum*, L.	III	*ibid.*
VII. —— *Basilicum*, L.	—	—
X. —— *minimum*, L.	III	67.
ŒNANTHE *et* FILIPENDULA. 162 et 163.		
I. *Œnanthe pimpinelloïdes*, L.	I	477
II. —— *pimpinelloïdes*, L.	—	—
III. —— *crocata*, L.	I	476
IV. —— *fistulosa*, L.	I	*ibid.*
V. *Thalictrum tuberosum*, L.	II	449
VI. *Œnanthe prolifera*, L.	I	476
VII. *Spiræa Filipendula*, L.	II	356
VIII. —— *Filipendula*, L. var.	II	*ibid.*
IX. *Pedicularis tuberosa*, L.	III	86
X. —— *verticillata*, L.	III	64
ŒNOPLIA. 477.		
II. *Rhamnus Spina-Christi*, L.	I	366
OLEA. 471 et 472.		
I. *Olea Europæa*, L.	I	20
II. —— *Europæa*, L. var.	—	—
III. *Elæagnus angustifolia*, L.	I	213
ONOBRYCHIS. 215.		
II. *Campanula Speculum*, L.	I	34
ONOBRYCHIS. 350.		
I. *Hedysarum Onobrychis*, L.	III	351
II. —— *caput galli*, L.	III	352
III. —— *coronarium*, L.	III	350
IV. —— *humile*, L.	III	351

	tom.	pag.
V. *Hedysarum Alpinum*, L.	III	350
VI *Astragalus incanus*, L.	III	363
VII. —— *incanus?* L.	—	—
VIII. —— *Onobrychis*, L.	III	359
X. —— *Austriacus*, L.	III	358
XI. —— *montanus*, L.	III	362
OPHRYS. 86 et 87.		
I. *Ophrys ovata*, L.	IV	16
II. —— *ovata*, L. var.	IV	*ibid.*
IV. —— *cordata*, L.	IV	*ibid.*
OPHIOGLOSSUM. 354.		
I. *Ophioglossum vulgatum*, L.	IV	312
III. —— *vulgatum*, L. var.	IV	*ibid.*
ORCHIS MORIO. 81 et 82.		
I. *Orchis mascula*, L.	IV	8
III. —— *mascula*, L.	IV	*ibid.*
IV. —— *Morio*, L.	IV	*ibid.*
VII. *Ophrys antropophora*, L.	IV	18
VIII. *Orchis militaris*, L. var.	IV	9
ORCHIS fætida. 82.		
I. *Satyrium hircinum*, L.	IV	13
III. —— *hircinum?* L.	—	—
IV. *Orchis coriophora*, L. var.	IV	7
ORCHIS Serapias. 82, 83 et 84.		
I. *Orchis bifolia*, L. var.	IV	6
II. —— *bifolia*, L.	IV	*ibid.*
III. —— *bifolia*, L. var.	IV	*ibid.*
IV. —— *bifolia*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *bifolia*, L. var.	IV	*ibid.*
VII. *Ophrys insectifera*, L. var.	IV	18
VIII. —— *insectifera*, L. var.	IV	*ibid.*
IX. —— *insectifera*, L. var.	IV	*ibid.*
X. —— *insectifera*, L. var.	IV	*ibid.*
XI. —— *insectifera*, L. var.	IV	*ibid.*
XII. —— *insectifera*, L. var.	IV	*ibid.*
XIV. *Orchis papilionacea*, L.	IV	9
XVII. *Ophrys insectifera*, L. var.	IV	18

	tom.	pag.
XVIII. *Serapias Lingua*, L.	IV	20
XIX. —— *Lingua*, L. var.	IV	*ibid.*
ORCHIS palmata. 85 et 86.		
I. *Orchis latifolia*, L.	IV	10
III. —— *maculata*, L.	IV	11
IV. —— *conopsea*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *conopsea*, L.	IV	*ibid.*
VI. —— *conopsea*, L. var.	IV	*ibid.*
VII. —— *odoratissima*, L.	IV	*ibid.*
IX. —— *sambucina*, L.	IV	10
X. *Satyrium viride*, L. var.	IV	13
XII. *Orchis latifolia*, L.	IV	10
XV. —— *latifolia*, L.	IV	*ibid.*
XVII. *Satyrium viride*, L.	IV	13
XIX. *Orchis latifolia*, L. var.	IV	10
XX. —— *maculata*, L.	IV	11
XXI. *Satyrium nigrum*, L.	IV	13
ORCHIS abortiva. 86.		
I. *Ophrys Nidus avis*, L.	IV	15
II. *Orchis abortiva*, L.	IV	12
ORIGANUM. 223.		
I. *Origanum vulgare*, L.	III	55
II. —— *vulgare*, L. var.	—	—
IV. —— *heracleoticum*, L.	III	54
V. —— *Creticum*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *Onites*, L.	III	55
VII. —— *Creticum*, L. var.	—	—
VIII. —— *Creticum*, L. var.	III	54
IX. —— *Ægyptiacum*, L.	III	*ibid.*
ORNITHOGALUM umbellatum, album. 69 et 70.		
I. *Ornithogalum Arabicum*, L.	II	42
IV. —— *umbellatum*, L.	II	*ibid.*
ORNITHOGALUM spicatum. 70.		
I. *Ornithogalum latifolium*, L.	II	41
III. —— *Pyrænaïcum*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *pyramidale*, L.	II	*ibid.*
V. —— *comosum*, L.	II	*ibid.*

	tom.	pag.
VI. *Ornithogalum Narbonense*, L.	II	41
XII. ——— *nutans*, L.	II	42
ORNITHOGALUM luteum. 71.		
III. *Ornithogalum luteum*, L.	II	40
IV. ——— *minimum*, L.	II	*ibid.*
ORNITHOPODIUM. 350.		
I. *Ornithopus perpusillus*, L. var.	III	340
II. —— *perpusillus*, L.	III	*ibid.*
III. —— *perpusillus*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *compressus*, L.	III	*ibid.*
V. *Astragalus sesameus*, L.	III	361
OROBANCHE. 87 et 88.		
I. *Orobanche major*, L.	III	127
II. *Lathræa Clandestina*, L.	III	81
IV. *Orobanche lævis*, L.	III	127
V. *Monotropa Hypopithys*, L.	II	200
VII. *Lathræa squamaria*, L.	III	82
IX. *Ophrys corallorhiza*, L.	IV	15
OROBUS *sive* ERVUM. 346.		
I. *Ervum Ervilia*, L.	III	327
OROBUS sylvaticus. 351 et 352.		
I. *Orobus luteus*, L.	III	316
II. —— *vernus*, L.	III	*ibid.*
III. —— *luteus*, L.	III	*ibid.*
V. —— *tuberosus*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *niger*, L.	III	317
ORYZA. 24.		
I. *Oryza sativa*, L.	II	78
OSTRYS *sive* OSTRYA. 427.		
I. *Carpinus Betulus*, L.	IV	132
II. —— *Ostrya*, L.	IV	*ibid.*

P.

PÆONIA. 323.		
I. *Pæonia officinalis*, L.	II	420
II. —— *officinalis*, L.	II	*ibid.*
III. —— *officinalis*, L, var.	—	—

	tom.	pag.
PALMA. 506, 507 et 508.		
I. *Phœnix dactylifera*, L.	IV	427
II. *Chamærops humilis*, L.	IV	424
VII. *Coccos Guinensis*, L.	IV	427
XI. *Musa paradisiaca*, L.	IV	251
XIII. —— *sapientium*, L.	IV	*ibid.*
PALMA nucem ferens. 508, 509 et 510.		
I. *Coccos nucifera*, L.	IV	427
XI. *Areca Cathecu*, L.	IV	429
PANAX. 156 et 157.		
I. *Laserpitium Chironium*, L.	I	467
II. *Pastinaca Opoponax*, L.	I	490
III. *Heracleum Panaces*, L.	I	467
PANICUM. 27.		
II. *Panicum Italicum*, L.	I	106
III. *Holcus spicatus*, L.	IV	257
PAPAVER. 170, 171 et 172.		
I. *Papaver somniferum*, L.	II	393
II. —— *somniferum*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *somniferum*, L. var.	—	—
IV. —— *somniferum*, L. var.	II	393
VI. —— *somniferum*, L. var.	II	*ibid.*
VII. —— *somniferum*, L. var.	II	*ibid.*
X. —— *Rhœas*, L.	II	392
XI. —— *Rhœas*, L. var.	II	*ibid.*
XII. —— *Cambricum*, L.	II	394
XIII. —— *Rhœas*, L. var.	II	392
XIV. *Chelidonium Glaucium*, L.	II	390
XV. —— *corniculatum*, L.	II	*ibid.*
XVI. —— *corniculatum*, L. var.	II	*ibid.*
XVII. *Argemone Mexicana*, L.	II	395
XVIII. *Chelidonium hybridum*, L.	II	391
PAPYRUS. 19.		
II. *Cyperus Papyrus*, L.	I	92
PARIETARIA. 121.		
I. *Parietaria officinalis*, L.	IV	267
II. —— *Judaïca*, L.	IV	*ibid.*
PARTHENIUM. *Voyez* MATRICARIA.		

	tom.	pag.
PASTINACA. 150 et 151.		
I. *Daucus Carotta*, L.	I	451
II. —— *Mauritanicus*, L.	I	452
IV. *Echinophora tenuifolia*, L.	I	446
V. *Daucus Carotta*, L. var.	I	451
VI. —— *Carotta*, L. var.	I	*ibid.*
PASTINACA latifolia. 155.		
I. *Pastinaca sativa*, L. var.	I	489
II. —— *sativa*, L.	I	*ibid.*
PEDICULARIS *seu* FISTULARIA. 163.		
I. *Pedicularis tuberosa*, L.	—	—
II. —— *foliosa*, L.	III	86
III. —— *rostrata*, L.	III	84
IV. —— *flammea*, L.	III	85
V. —— *sylvatica*, L.	III	84
VI. *Rhinanthus Crista-Galli*, L.	III	76
VIII. —— *Crista-Galli*, L. var.	III	*ibid.*
PEPLIS. 292 et 293.		
I. *Euphorbia Peplis*, L.	II	303
PEPLUS *sive* ESULA rotunda. 292.		
I. *Euphorbia Peplus*, L.	II	304
II. —— *epithymoïdes*, L.	II	306
PEPO. 311.		
I. *Cucurbita Pepo*, L. var.	IV	162
II. —— *Pepo*, L. var.	—	—
III. —— *Pepo*, L. var.	—	—
PERFOLIATA. 277.		
I. *Buplevrum rotundifolium*, L.	I	443
III. —— *longifolium*, L.	I	444
VI. —— *angulosum*, L.	I	443
VII. —— *stellatum*, L.	I	*ibid.*
VIII. —— *angulosum*, L.	—	—
IX. —— *petræum*, L.	I	443
X. —— *Odontites*, L.	I	444
XI. —— *Ranunculoïdes*, L.	I	*ibid.*
XII. —— *Ranunculoïdes*, L.	—	—
PERICLYMENUM. 302.		
I. *Lonicera Periclymenum*, L.	I	322

	tom.	pag.
II. *Lonicera Caprifolium*, L.	I	322
III. *Cornus Suecica*, L.	I	204
IV. —— *Suecica*, L.	—	—
PERSEA. 441.		
Laurus Persea, L.	II	157
PES LEONIS. *Voyez* ALCHIMILLA.		
PETASITES. 197.		
I. *Tussilago Petasites*, L.	III	530
II. —— *alba*, L.	III	529
PEUCEDANUM. 149.		
II. *Peucedanum officinale*, L.	I	459
III. —— *minus*, L.	I	460
PICEA. 493.		
I. *Pinus Abies*, L. var.	IV	140
II. —— *Abies*, L. var.	—	—
PILA MARINA. *Voyez* ALCYONIUM.		
PILOSELLA. 262.		
I. *Hieracium Pilosella*, L.	III	438
II. —— *dubium*, L.	III	*ibid.*
III. —— *præmorsum*, L.	III	439
IV. —— *auricula*, L.	III	438
V. —— *cymosum*, L.	III	439
VI. *Sideritis Syriaca*, L.	—	—
PINUS. 491 et 492.		
I. *Pinus Pinea*, L.	IV	138
II. —— *sylvestris*, L.	IV	137
III. —— *sylvestris*, L. var.	—	—
IV. —— *Cembra*, L.	IV	138
V. —— *sylvestris*, L.	—	—
VI. —— *sylvestris*, L. var.	IV	137
IX. —— *sylvestris*, L. var.	IV	*ibid.*
X. —— *sylvestris*, L. var.	IV	*ibid.*
XI. *Crotton Triglium*, L.	IV	148
PIMPINELLA. 159 et 160.		
I. *Pimpinella magna*, L.	I	494
II. —— *saxifraga*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *magna*, L. var.	I	495

	tom.	pag.
IV. *Pimpinella saxifraga*, L.	I	494
V. *Seseli saxifragum*, L.	I	487
VI. *Sanguisorba officinalis*, L.	I	201
VII. *Poterium Sanguisorba*, L.	IV	123
VIII. —— *Sanguisorba*, L. var.	IV	*ibid.*
IX. —— *Sanguisorba*, L. var.	IV	*ibid.*
PIPER. 411 et 412.		
I. *Piper rotundum*, L.	I	54
III. —— *longum*, L.	I	*ibid.*
VII. *Vitex trifolia*, L.	III	138
PISTACIA. 401.		
I. *Pistacia vera*, L.	IV	199
III. *Staphyllea pinnata*, L.	I	506
PISUM. 342 et 343.		
I. *Pisum sativum*, L. var. *quadrata*.	III	314
II. —— *sativum*, L. var. *umbellata*.	III	*ibid.*
III. —— *sativum*, L. var.	III	*ibid.*
VII. —— *sativum*, L. var.	III	*ibid.*
IX. *Vicia pisiformis*, L.	III	322
X. *Cardiospermum Halicacabum*, L.	II	150
PITUYSA *sive* ESULA. 291 et 292.		
I. *Euphorbia Esula*, L.	—	—
II. —— *palustris*, L.	II	309
III. —— *dulcis*, L.	II	306
IV. —— *pilosa*, L.	II	308
V. —— *Pituysa*, L.	II	306
PHALANGIUM. 29.		
I. *Anthericum Liliastrum*, L.	II	47
II. —— *Liliago*, L.	II	*ibid.*
III. —— *ramosum*, L.	II	*ibid.*
PHALARIS. 28.		
I. *Phalaris Canariensis*, L.	I	103
PHASEOLUS. *Voyez* SMILAX hortensis.		
PHILLYREA. 476.		
I. *Phillyrea latifolia*, L.	—	—
II. —— *latifolia*, L.	I	20
III. —— *latifolia*, L. var.	—	—

	tom.	pag.
IV. *Phillyrea media*, L.	I	20
V. —— *angustifolia*, L.	I	*ibid.*
VI. —— *angustifolia*, L.	I	*ibid.*
PHYLICA. 476 et 477.		
I. *Rhamnus Alaternus*, L.	I	364
II. —— *Alaternus*, L.	I	*ibid.*
PHYLLITIS. *Voyez* LINGUA CERVINA.		
PHYLLON. 122.		
I. *Mercurialis tomentosa*, L. (*fœmina*).	IV	220
II. —— *tomentosa*, L. (*mas*).	IV	*ibid.*
PLANTAGO latifolia. 189.		
I. *Plantaga major*, L.	—	—
II. —— *major*, L.	I	195
III. —— *media*, L.	I	196
IV. —— *major*, L. var.	I	195
V. —— *major*, L. var.	I	*ibid.*
VI. —— *major*, L. var.	I	*ibid.*
XII. —— *major*, L. var.	I	*ibid.*
PLANTAGO angustifolia. 189.		
I. *Plantago lanceolata*, L.	I	196
II. —— *lanceolata*, L. var.	I	*ibid.*
VIII. —— *Lagopus*, L.	I	*ibid.*
IX. —— *lanceolata*, L.	I	*ibid.*
PLANTAGO aquatica. 190.		
I. *Alisma Plantago*, L.	I	91
II. —— *ranunculoïdes*, L.	I	92
III. —— *Damasonium*, L.	I	*ibid.*
IV. *Limosella aquatica*, L.	III	124
PLATANUS. 431.		
I. *Platanus Orientalis*, L.	IV	135
II. *Carica Papaya*, L.	IV	222
POLIUM montanum. 220 et 221.		
I. *Teucrium montanum*, L.	III	17
II. —— *Polium*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *Polium*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *supinum*, L.	III	*ibid.*
POLIUM maritimum. 221.		
II. *Teucrium Creticum*, L.	III	14

	tom.	pag.
III. *Teucrium capitatum*, L. var.	III	18
IV. —— *Polium*, L. var.	III	*ibid.*
V. —— *Polium*, L. var.	III	*ibid.*
POLYGALA. 215.		
I. *Polygala vulgaris*, L.	III	271
II. —— *vulgaris*, L. var.	III	*ibid.*
V. *Illecebrum verticillatum*, L.	I	391
POLYGONATUM. 303 et 304.		
I. *Convallaria Polygonatum*, L.	II	54
II. —— *multiflora*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *Polygonatum*, L.	—	—
V. —— *Polygonatum*, L.	—	—
VI. *Uvularia perfoliata*, L.	II	36
VII. —— *amplexifolia*, L.	II	*ibid.*
VIII. *Convallaria verticillata*, L.	II	54
IX. —— *verticillata*, L.	II	*ibid.*
POLYGONUM bacciferum *sive* UVA maritima. 15.		
II. *Ephedra distachya*, L. var.	IV	234
III. —— *distachya*, L.	IV	*ibid.*
POLYGONUM majus. 281.		
I. *Polygonum aviculare*, L.	II	144
II. —— *aviculare*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *aviculare*, L. var.	II	*ibid.*
IV. —— *aviculare*, L. var.	—	—
V. —— *maritimum*, L.	II	144
POLYGONUM minus. 281 et 282.		
II. *Scleranthus annuus*, L.	II	228
III. —— *annuus*, L.	—	—
V. *Illecebrum Paronychia*, L.	I	391
VI. *Scleranthus polycarpos*, L.	II	229
VII. *Frankenia hirsuta*, L.	II	77
VIII. *Corrigiola littoralis*, L.	I	510
IX. *Herniaria lenticulata*, L.	I	415
X. *Frankenia lævis*, L.	II	77
XI. *Herniaria glabra*, L.	I	414
XIII. *Linum Radiola*, L.	I	524
POLYPODIUM. 359.		
I. *Polypodium vulgare*, L.	IV	330

	tom.	pag.
II. *Polypodium vulgare*, L. var.	IV	330
III. —— *quercifolium*, L.	IV	331
POLYTRICHUM aureum. 356.		
I. *Polytrichum commune*, L.	IV	353
II. —— *commune*, L. var.	IV	*ibid.*
POMUS. *Voyez* MALUM.		
POPULUS. 429 et 430.		
I. *Populus alba*, L.	IV	215
III. —— *nigra*, L.	IV	216
IV. —— *Tremula*, L.	IV	*ibid.*
V. *Cocoloba uvifera*, L.	II	147
PORRUM. 72.		
I. *Allium Porrum*, L.	II	24
II. —— *Porrum*, L.	II	*ibid.*
III. —— *Schœnoprasum*, L.	II	30
VI. —— *vineale*, L. var.	II	28
VII. —— *vineale*, L.	II	*ibid.*
PORTULACA. 287 et 288.		
I. *Portulaca oleracea*, L. var.	II	291
II. —— *oleracea*, L.	II	*ibid.*
III. *Montia fontana*, L.	I	148
POTAMOGETON. 192 et 193.		
I. *Potamogeton natans*, L.	I	224
II. *Polygonum amphibium*, L.	II	142
III. *Potamogeton serratum*, L.	—	—
V. —— *lucens*, L.	I	225
VI. —— *densum*, L.	—	—
VII. —— *setaceum*, L.	I	226
VIII. —— *pectinatum*, L.	I	*ibid.*
IX. —— *pusillum*, L.	I	*ibid.*
X. *Zanichellia palustris*, L.	IV	68
POTENTILLA. 321.		
Potentilla Anserina, L.	II	365
POTERIUM. 388.		
I. *Astragalus Tragacantha*, L.	III	364
II. *Poterium spinosum*, L.	III	124
PRIMULA VERIS. *Voyez* VERBASCULUM.		

	tom.	pag.
PRUNUS. 442, 443 et 444.		
I. *Prunus domestica*, L.	II	334
II. —— *domestica*, L. var. *Damascena.*	II	*ibid.*
III. —— *domestica*, L. var. *Damascena.*	II	*ibid.*
IV. —— *domestica*, L. var. *Hungarica.*	II	*ibid.*
V. —— *domestica*, L. var. *Juliana.*	II	*ibid.*
VI. —— *domestica*, L. var. *Pertigona.*	II	*ibid.*
VII. —— *domestica*, L. var. *cerea.*	II	*ibid.*
VIII. —— *domestica*, L. var. *acinaria.*	II	*ibid.*
IX. —— *domestica*, L. var. *maliformis.*	II	*ibid.*
X. —— *domestica*, L. var. *augustana.*	II	*ibid.*
XI. —— *domestica*, L. var. *præcox.*	II	*ibid.*
XII. —— *domestica*, L. var. *cereola.*	II	*ibid.*
XIII. —— *domestica*, L. var. *amygdalina.*	II	*ibid.*
XIV. —— *domestica*, L. var. *galatensis.*	II	*ibid.*
XV. —— *domestica*, L. var. *Brignola.*	II	*ibid.*
XVI. —— *domestica*, L. var. *Myrobolana.*	II	*ibid.*
PRUNUS sylvestris. 444.		
I. *Prunus spinosa*, L.	II	336
II. —— *insititia*, L.	II	*ibid.*
PRUNUS SEBESTEN. 446.		
I. *Cordia Myxa*, L.	I	355
II. —— *Myxa*, L.	I	*ibid.*
PULEGIUM. 222.		
I. *Mentha Pulegium*, L.	III	33
IV. —— *cervina*, L.	III	*ibid.*
PULMONARIA. *Voyez* SYMPHYTUM maculosum.		
PYRETHRUM. 148.		
Anthemis Pyrethrum, L.	III	577
PYROLA. 191.		
I. *Pyrola rotundifolia*, L.	II	213
II. —— *uniflora*, L.	II	214
III. —— *secunda*, L.	II	*ibid.*
IV. *Trientalis Europæa*, L.	II	94
V. —— *Europæa*, L. var.	II	*ibid.*
VI. *Pyrola umbellata*, L.	II	214
PYRUS. 438 et 439.		
I. *Pyrus communis*, L.	—	—
IV. —— *communis*, L.	II	343

	tom.	pag.
PYRO similes exoticæ. 439.		
II. *Laurus Persea*, L.	—	—

Q.

QUERCUS. 419 et 420.		
I. *Quercus Robur*, L.	IV	127
IV. —— *Robur*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *Æsculus*, L.	IV	*ibid.*
VI. —— *Ægylops*, L.	IV	*ibid.*
VII. —— *Cerris*, L.	IV	*ibid.*
QUINQUEFOLIUM flore albo. 325.		
I. *Potentilla caulescens*, L.	II	369
II. —— *alba*, L.	II	*ibid.*
III. —— *alba*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *caulescens*, L.	II	*ibid.*
QUINQUEFOLIUM flore luteo. 325.		
I. *Potentilla reptans*, L.	II	369
II. —— *aurea?* L.	—	—
III. —— *verna*, L.	II	368
IV. —— *opaca*, L.	II	*ibid.*
V. —— *aurea*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *opaca*, L.	II	*ibid.*
QUINQUEFOLIUM erectum. 325 et 326.		
I. *Potentilla argentea*, L.	II	367
II. —— *recta*, L.	II	*ibid.*
III. —— *intermedia?* L.	—	—
IV. —— *rupestris*, L.	II	366
V. —— *supina*, L.	II	367
VI. *Comarum palustre*, L.	II	375
VII. *Cleome pentaphylla*, L.	III	205

R.

RANUNCULUS nemorosus. 178.		
I. *Anemone ranunculoïdes*, L.	II	444
II. *Ranunculus auricomus*, L.	II	455
III. *Isopyrum thalictroïdes*, L.	II	463
IV. *Adoxa Moschatellina*, L.	II	152

	tom.	pag.
RANUNCULUS pratensis et arvensis. 178 et 179.		
I. *Ranunculus acris*, L.	II	459
II. —— *polyanthemos*, L.	—	—
III. —— *repens*, L.	II	459
IV. —— *bulbosus*, L.	II	*ibid.*
V. —— *parvulus*, L.	II	460.
RANUNCULUS hortensis flore pleno. 179.		
I. *Ranunculus acris*, L. var.	II	459
VI. —— *aconitifolius*, L. var.	II	456
RANUNCULUS echinatus. 179.		
I. *Ranunculus arvensis*, L.	II	460
IV. —— *muricatus*, L.	II	461
RANUNCULUS palustris et aquaticus. 180.		
I. *Ranunculus sceleratus*, L.	II	456
II. —— *sceleratus*, L. var.	—	—
III. —— *hederaceus*, L.	II	461
IV. *Hydrocotyle vulgaris*, L.	I	440
V. *Ranunculus aquatilis*, L.	II	462
VI. —— *aquatilis*, L. var.	II	*ibid.*
RANUNCULUS folio longo, tàm palustris quàm montanus. 180 et 181.		
I. *Ranunculus Lingua*, L.	II	453
II. —— *Flammula*, L.	II	452
III. —— *Flammula*, L. var.	II	*ibid.*
IV. —— *amplexicaulis*, L.	II	454
V. —— *gramineus*, L.	II	453
VI. —— *gramineus*, L. var.	II	*ibid.*
VII. —— *gramineus*, L. var.	II	*ibid.*
RANUNCULUS grumosa vel etiam Asphodeli radice. 181.		
I. *Ranunculus Illyricus*, L.	II	456
II. —— *Illyricus*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *chærophyllos*, L.	II	460
V. —— *Asiaticus*, L. var.	II	456
VI. —— *Asiaticus*, L.	II	457
VII. —— *Asiaticus*, L. var.	II	456
VIII. —— *Asiaticus*, L. var.	II	*ibid.*
IX. —— *Asiaticus*, L. var.	II	*ibid.*
X. —— *Asiaticus*, L. var.	II	*ibid.*

	tom.	pag.
XI. *Ranunculus Creticus*, L.	II	455
XII. —— *bullatus*, L.	II	454
XIII. —— *chærophyllos*,	II	460
RANUNCULUS grumosâ radice, flore pleno. 181.		
I. *Ranunculus Asiaticus*, L. var.	II	456
II. —— *Asiaticus*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *Asiaticus*, L. var.	II	*ibid.*
RANUNCULUS montanus. 181 et 182.		
I. *Ranunculus rutæfolius*, L.	II	457
II. —— *Alpestris*, L.	II	458
III. —— *Alpestris*, L.	II	*ibid.*
IV. *Anemone narcissiflora*, L.	—	—
V. —— *narcissiflora*, L.	II	444
VII. *Ranunculus platanifolius*, L.	II	456
VIII. —— *aconitifolius*, L.	II	*ibid.*
IX. *Trollius Europæus*, L.	II	462
XIII. *Ranunculus lanuginosus*, L. var.	II	460
XIV. —— *lanuginosus*, L.	II	*ibid.*
RANUNCULUS saxatilis. 182.		
I. *Ranunculus Monspessulanus*, L.	II	459
III. —— *parvulus*, L.	II	460
RAPA. 89 et 90.		
I. *Brassica Rapa*, L.	III	194
II. —— *Rapa*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *Rapa*, L.	—	—
RAPHANUS. 96 et 97.		
I. *Raphanus sativus*, L.	III	200
II. —— *sativus*, L. var.	III	*ibid.*
III. —— *sativus*, L.	III	*ibid.*
V. *Cochlearia Armoracia*, L.	III	162
VI. *Sisymbrium amphibium*, L. var. *palustris*.	III	178
VII. —— *amphibium*, L. var. *aquatica*.	III	*ibid.*
RAPISTRUM. 95.		
I. *Sinapis arvensis*, L.	III	197
II. *Raphanus Raphanistrum*, L.	III	200
III. —— *Raphanistrum*, L.	III	*ibid.*
IV. *Hesperis verna*, L.	III	189
VI. *Myagrum perenne*, L.	III	148

	tom.	pag.
RAPUNCULUS *et* CAMPANULA glabra. 92 et 93.		
I. *Campanula Rapunculus*, L.	I	305
II. —— *Erinus*, L.	I	311
III. *Phyteuma spicata*, L.	I	313
IV. —— *orbicularis*, L.	I	312
V. *Jasione montana*, L.	I	638
VII. *Phyteuma orbicularis*, L. var.	I	313
VIII. —— *orbicularis*, L.	I	*ibid.*
IX. —— *hæmispherica*, L.	I	312
X. *Campanula persicifolia*, L.	I	305
XI. —— *persicifolia*, L.	—	—
XIV. —— *pyramidalis*, L.	I	305
XV. *Phyteuma pinnata*, L.	I	315
XVII. —— *comosa*, L.	I	312
XVIII. *Campanula pulla*, L.	I	304
XIX. —— *rotundifolia*, L. var.	—	—
XX. —— *rotundifolia*, L.	I	304
XXI. —— *patula*, L.	I	*ibid.*
XXII. —— *rotundifolia*, L.	—	—
XXIV. —— *hederacea*, L.	I	310
XXV. *Linnæa Borealis*, L.	III	123
RESEDA. 99 et 100.		
I. *Reseda alba*, L.	II	298
II. —— *lutea*, L.	II	*ibid.*
III. —— *glauca*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *canescens*, L.	II	297.
VI. —— *Phyteuma*, L.	II	298
RHAMNUS. 477 et 478.		
I. *Lycium Europæum*, L.	I	353
II. —— *Afrum*, L.	I	*ibid.*
III. *Rhamnus lycioïdes*, L.	I	363
IV. *Hyppophaë Rhamnoïdes*, L.	IV	196
V. *Rhamnus Paliurus*, L.	—	—
VI. —— *catharticus*, L.	I	362
VIII. —— *infectorius*, L.	I	*ibid.*
RHODIA RADIX. 286.		
Rhodiola rosea, L.	IV	217
RHUS. 414.		
I. *Rhus coriaria*, L.	I	498

	tom.	pag.
II. *Rhus glabrum*, L.	I	499
III. *Coriaria myrtifolia*. L.	IV	224
IV. *Myrica Gale*, L.	IV	197
RICINUS. 231 et 432.		
I. *Ricinus communis*, L.	IV	153
III. *Jatropha Curcas*, L.	IV	151
V. —— *gossypifolia*, L.	—	—
ROSMARINUS. 217.		
I. *Rosmarinus officinalis*, L.	I	45
II. —— *officinalis*, L.	—	—
ROSA sativa. 481 et 482.		
I. *Rosa Gallica*, L.	II	359
II. —— *Gallica*, L.	—	—
III. —— *Gallica*, L. var.	—	—
IV. —— *Gallica*, L. var.	—	—
V. —— *Gallica*, L. var.	—	—
VII. —— *centifolia*, L.	II	359
IX. —— *alba*, L.	II	360
X. —— *alba?* L. var.	—	—
XIII. —— *sempervirens*, L.	II	359
ROSA sylvestris. 482, 483 et 484.		
I. *Rosa canina*, L.	II	360
IV. — *rubiginosa*, L.	II	358
VII. — *cinnamomea*, L.	II	*ibid.*
VIII. — *cinnamomea*, L. var.	—	—
XI. — *Eglanteria*, L.	II	357
XII. — *Eglanteria*, L. var.	II	*ibid.*
XIII. — *spinosissima*, L.	II	358
XV. — *villosa*, L.	II	359
XVI. — *villosa*, L. var.	—	—
XVII. — *arvensis*, L.	II	358
XIX. — *Alpina*, L.	II	359
ROSA Hierochuntica dicta. 484.		
I. *Anastatica Hierochuntica*, L.	III	151
II. —— *Syriaca*, L.	III	*ibid.*
ROS SOLIS. 356 et 357.		
I. *Drosera rotundifolia*, L.	I	525
II. —— *longifolia*, L.	I	*ibid.*

	tom.	pag.
RUBIA. 333.		
I. *Rubia Tinctorum*, L. var.	I	186
II. —— *Tinctorum*, L.	I	*ibid.*
III. *Galium Mollugo*, L.	—	—
IV. —— *Boreale*, L.	I	184
V. —— *glaucum*, L.	I	183
VI. *Asperula cynanchica*, L.	I	179
VII. —— *Pyrænaïca*, L.	I	178
VIII. *Ortegia Hispanica*, L.	I	71
RUBUS. 479.		
I. *Rubus fruticosus*, L.	II	362
II. —— *cæsius*, L.	II	*ibid.*
III. —— *Idæus*, L.	II	361
IV. —— *Idæus*, L. var.	II	*ibid.*
V. —— *Idæus*, L. var.	II	*ibid.*
RUSCUS. 470.		
Ruscus aculeatus, L.	IV	338
RUTA. 335 et 336.		
I. *Ruta graveolens*, L. var.	II	187
II. —— *graveolens*, L. var.	II	*ibid.*
III. —— *graveolens*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *graveolens*, L. var.	II	*ibid.*
V. *Peganum Harmala*, L.	II	289
RUTA MURARIA *sive* SALVIA VITÆ. 356.		
Asplenium Ruta muraria, L.	IV	327

S.

SABINA. 486 et 487.		
I. *Juniperus Sabina*, L. var.	IV	230
II. —— *Sabina*, L.	IV	*ibid.*
III. —— *Sabina*, L.	—	—
SAGITTA. 194.		
I. *Sagittaria sagittifolia*, L. var.	IV	130
II. —— *sagittifolia*, L.	IV	*ibid.*
III. —— *sagittifolia*, L. var.	IV	*ibid.*
SALIX. 473 et 474.		
I. *Salix alba*, L.	IV	188
II. —— *purpurea*, L.	IV	185

	tom.	pag.
III. *Salix pentandra*, L.	IV	184
IV. —— *vitellina*, L.	IV	184
V. —— *amygdalina*, L.	IV	*ibid.*
VI. —— *viminalis*, L.	IV	188
VII. —— *rosmarinifolia*, L.	IV	*ibid.*
IX. —— *fragilis*, L.	IV	185
SALIX latifolia. 474.		
I. *Salix Caprea*, L.	IV	188
SALIX pumila latifolia. 474.		
I. *Salix lanata*, L.	IV	187
III. —— *repens*, L.	IV	*ibid.*
IV. —— *arenaria*, L.	IV	*ibid.*
V. —— *herbacea*, L.	IV	186
SALIX pumila angustifolia. 474.		
III. *Salix glauca*, L.	IV	186
IV. —— *retusa*, L.	IV	*ibid.*
SALIX exotica. 474 et 475.		
I. *Salix Ægyptiaca*, L.	IV	185
II. —— *Babylonica*, L.	IV	*ibid.*
SALSAPARILLA. *Voyez* SMILAX aspera.		
SALVIA. 237.		
I. *Salvia officinalis*, L.	I	46
II. —— *officinalis*, L. var.	—	—
III. —— *officinalis*, L. var.	—	—
IX. —— *pomifera*, L.	I	47
SAMBUCUS. 455 et 456.		
I. *Sambucus nigra*, L.	I	504
II. —— *nigra*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *racemosa*, L.	I	505
IV. —— *nigra*, L. var.	I	504
V. —— *Ebulus*, L.	I	503
VI. —— *Ebulus*, L. var.	I	*ibid.*
VII. *Viburnum Opulus*, L.	I	502
VIII. —— *Opulus*, L. var.	I	*ibid.*
SAMPSUCHUS *sive* AMARACUS, MARUM *sive* MAJORANA. 224.		
I. *Thymus Mastichina*, L.	III	58
II. *Origanum Syriacum*, L.	III	55

	tom.	pag.
IV. *Origanum Majorana*, L. var.	III	56
V. —— *Majorana*, L.	III	*ibid.*
SANICULA ALPINA foliis serratis. 242 et 243.		
I. *Primula Auricula*, L.	I	272
II. —— *Auricula*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *Auricula*, L. var.	I	*ibid.*
IV. —— *Auricula*, L. var.	I	*ibid.*
V. —— *Auricula*, L. var.	I	*ibid.*
VI. —— *Auricula*, L. var.	I	*ibid.*
VII. —— *minima*, L.	I	273
VIII. —— *minima*, L. var.	—	—
IX. *Verbascum Myconi*, L.	I	333
SANICULA foliis non serratis. 243.		
I. *Primula integrifolia*, L.	I	273
II. —— *integrifolia*, L. var.	—	—
SANICULA rotundifolia. 243.		
I. *Cortusa Matthioli*, L.	I	274
II. *Saxifraga rotundifolia*, L.	II	224
III. —— *Geum*, L.	II	223
V. *Pinguicula vulgaris*, L.	I	37
SANICULA. 319.		
Sanicula Europæa, L.	I	441
SANTALUM. 392 et 393.		
I. *Santalum album*, L.	I	214
VIII. *Cæsalpinia Sappan*, L.	II	182
SAPONARIA. 206.		
I. *Saponaria officinalis*, L.	II	251
II. —— *officinalis*, L. var.	II	*ibid.*
IV. *Gypsophylla Struthium*, L.	II	230
SASSAFRAS. 431.		
Laurus Sassafras, L.	II	158
SATUREIA. 218.		
I. *Saturcia hortensis*, L.	III	20
II. —— *montana*, L.	III	19
III. —— *Juliana*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *Thymbra*, L.	III	*ibid.*
SAXIFRAGA. 309.		
I. *Saxifraga granulata*, L.	II	224

	tom.	pag.
II. *Saxifraga bulbifera*, L.	II	225
III. *Chrysosplenium oppositifolium*, L.	II	220
SCABIOSA pratensis et arvensis. 269 et 270.		
I. *Scabiosa arvensis*, L.	I	170
II. *Centaurea Scabiosa*, L.	III	604
III. —— *Scabiosa*, L.	III	*ibid.*
IV. *Scabiosa Syriaca*, L.	I	169
V. —— *leucantha*, L.	I	*ibid.*
VI. —— *ochroleuca*, L.	—	—
VII. —— *ochroleuca*, L.	I	173
VIII. —— *leucantha*, L.	—	—
SCABIOSA montana. 270.		
I. *Scabiosa Alpina*, L.	I	168
IV. —— *sylvatica*, L.	—	—
VII. —— *graminifolia*, L.	I	172
SCABIOSA capitulo globoso. 270 et 271.		
I. *Scabiosa atro-purpurea*, L.	I	171
II. —— *columbaria*, L.	I	170
III. —— *Gramuntiana*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *Palestina*, L.	I	172
SCABIOSA stellata. 271.		
I. *Scabiosa stellata*, L.	I	171
II. —— *stellata*, L. var.	I	*ibid.*
III. —— *stellata*, L. var.	I	*ibid.*
IV. —— *Cretica*, L.	I	172
SCAMMONIA. 294.		
I. *Convolvulus Scammonia*, L.	I	292
II. *Cynanchum Monspeliacum*, L.	I	408
III. —— *acutum*, L.	I	407
SCANDIX. 152.		
II. *Scandix Pecten*, L.	I	482
IV. —— *Australis*, L.	I	483
SCILLA. 72 et 73.		
I. *Scilla maritima*, L.	II	43
II. —— *maritima*, L. var.	II	*ibid.*
SCOLYMUS *sive* CINARA. 383 et 384.		
I. *Cynara Scolymus*, L. var.	III	472
II. —— *Scolymus*, L. var.	III	*ibid.*

	tom.	pag.
III. *Cynara Scolymus*, L. var.	—	—
IV. —— *Cardunculus*, L.	—	—
V. —— *Scolymus*, L.	III	472
SCORDIUM. 247 et 248.		
I. *Teucrium Scordium*, L.	III	16
III. —— *Scorodonia*, L.	III	15
IV. *Nepeta scorditis*, L.	III	24
SCORPIOÏDES. 287.		
I. *Scorpuirus sulcata*, L.	III	343
II. *Ornithopus Scorpioïdes*, L.	III	340
SCORZONERA latifolia. 275.		
I. *Scorzonera Hispanica*, L.	III	423
IV. —— *humilis*, L.	III	425
SCORZONERA angustifolia. 275.		
I. *Scorzonera angustifolia*, L.	III	423
III. —— *purpurea*, L.	III	*ibid.*
SCROPHULARIA. 235 et 236.		
I. *Scrophularia nodosa*, L.	III	101
III. —— *aquatica*, L.	III	102
IV. —— *peregrina*, L.	III	104
V. —— *vernalis*, L.	III	103
VI. —— *sambucifolia*, L.	III	*ibid.*
VII. —— *lucida*, L.	III	*ibid.*
VIII. —— *Ruta canina*, L.	III	*ibid.*
SECALE *sive* ROGGA. 23.		
II. *Secale cereale*, L.	I	142
III. —— *cereale*, L. var.	—	—
SECURIDACA. 348 et 349.		
I. *Coronilla Securidaca*, L.	III	339
II. *Astragalus hamosus*, L.	III	360
III. *Bisserula Pelecinus*, L.	III	365
IV. *Coronilla varia*, L.	III	339
SEDUM majus. 282 et 283.		
I. *Sempervivum arboreum*, L.	II	312
III. —— *tectorum*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *hirtum*, L.	II	313
VI. —— *montanum*, L.	II	*ibid.*
SEDUM minus. 283.		
I. *Sedum album*, L.	II	262

	tom.	pag.
II. *Sedum album*, L. var.	—	—
IV. —— *dasyphyllum*, L.	II	260
V. —— *reflexum*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *reflexum*, L. var.	II	*ibid.*
VIII. —— *acre*, L.	II	261
IX. —— *sexangulare*, L.	II	*ibid.*
X. *Beaumuria vermiculata*, L.	II	433
SEDUM saxatile *et* Alpinum. 284.		
I. *Saxifraga Burseriana*, L.	II	222
II. —— *cæsia*, L.	II	221
IV. *Androsace lactea*, L.	I	270
(Il y dans le texte de notre Système des Plantes n.° 3 au lieu de 4, mais c'est une erreur de chiffres.)		
V. *Saxifraga aizoïdes*, L.	II	224
VI. *Androsace carnea*, L.	I	270
VII. *Aretia Vitaliana*, L.	I	269
IX. *Crassula rubens*, L.	I	529
XI. *Draba aizoïdes*, L.	—	—
XII. *Saxifraga aspera*, L.	II	224
XIII. —— *autumnalis*, L.	II	*ibid.*
XIV. *Sempervivum montanum*, L.	II	313
XVI. —— *arachnoideum*, L.	II	*ibid.*
XVII. *Saxifraga oppositifolia*, L.	II	223
SEDUM foliis laciniatis. 284 et 285.		
I. *Saxifraga hypnoïdes*, L.	II	227
IV. —— *ascendens*, L.	II	226
V. —— *cæspitosa*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *tridactylites*, L.	II	*ibid.*
SEDUM palustre. 285.		
I. *Sedum villosum*, L.	II	262
SENECIO. 131.		
I. *Senecio vulgaris*, L.	III	532
II. —— *sylvaticus*, L.	III	533
III. —— *viscosus*, L.	III	532
IV. *Crepis fœtida*, L.	III	445
SENNA. 397.		
I. *Cassia Senna*, L.	II	179
II. —— *Senna*, L. var.	II	*ibid.*

	tom.	pag.
SERPYLLUM. 220.		
I. *Thymus Serpillum*, L.	—	—
III. —— *Serpillum*, L.	—	—
IV. —— *Serpillum*, L. var.	III	57
V. —— *Serpillum*, L. var.	III	*ibid.*
VI. —— *Serpillum*, L.	III	*ibid.*
VII. —— *Serpillum*, L. var.	III	*ibid.*
VIII. —— *Serpillum*, L. var.	III	*ibid.*
IX. —— *Zygis*, L.	III	58
SERRATULA. 235.		
Serratula tinctoria, L.	III	459
SESAMUM veterum. 27.		
Sesamum Orientale, L.	III	130
SESELI. 161 et 162.		
I. *Ligusticum Austriacum*, L.	I	468
II. *Chærophyllum hirsutum*, L.	—	—
III. *Tordylium maximum*, L.	I	448
IV. —— *officinale*, L.	I	*ibid.*
VI. —— *Apulum*, L.	I	*ibid.*
VII. *Buplevrum fruticosum*, L.	I	445
VIII. *Seseli tortuosum*, L.	—	—
IX. —— *tortuosum*, L.	I	487
XI. *Selinum palustre*, L.	I	456
XII. *Peucedanum silaus*, L.	I	460
SIDERITIS hirsuta. 232 et 233.		
I. *Sideritis scordioides*, L.	III	29
II. —— *hirsuta*, L.	III	*ibid.*
IV. *Stachys recta*, L.	III	43
VII. *Sideritis montana*, L.	III	28
VIII. —— *hyssopifolia*, L.	III	29
X. *Stachys arvensis*, L.	III	43
SIDERITIS glabra. 233.		
I. *Stachys annua*, L.	III	43
III. *Galeopsis Ladanum*, L.	III	38
SINAPI. 99.		
I. *Sinapis nigra*, L.	III	199
III. —— *alba*, L.	III	*ibid.*
IV. *Sisymbrium tenuifolium*, L.	III	178
V. *Sisymbrium asperum*, L.	III	180

	tom.	pag.
SION. 154.		
I. *Sium angustifolium*, L.	I	471
II. —— *latifolium*, L.	I	*ibid.*
III. *Cicuta virosa*, L.	I	478
SISARUM. 155.		
I. *Sium Sisarum*, L.	I	471
SISON. 154.		
Sison Amomum, L.	I	473
SMILAX hortensis *sive* PHASEOLUS vulgaris. 339.		
I. *Phaseolus vulgaris*, L.	III	305
III. —— *nanus*, L.	III	306
SMILAX aspera. 296.		
I. *Smilax aspera*, L.	IV	210
II. —— *aspera*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *Bona-nox ?* L.	I IV	300 212
IV. —— *Salsaparilla*, L.	IV	211
SMILAX lævis. *Voyez* CONVOLVULUS.		
SOLANUM bacciferum. 166 et 167.		
I. *Solanum nigrum*, L.	I	346
II. *Physalis Alkekengi*, L.	I	342
III. —— *angulata*, L.	I	*ibid.*
IV. *Atropa Belladona*, L.	I	340
V. *Hyoscyamus Scopolia*, L.	I	337
VII. *Physalis somnifera*, L.	I	341
IX. *Solanum Pseudo-Capsicum*, L.	I	343
X. *Paris quadrifolia*, L.	II	151
XI. *Trilium erectum*, L.	II	88
XII. *Solanum Dulcamara*, L.	I	344
XIII. —— *tuberosum*, L.	I	345
XIV. —— *Lycopersicum*, L.	—	—
SOLANUM pomiferum. 167.		
I. *Solanum Lycopersicum*, L.	I	345
II. —— *Æthiopicum*, L.	I	346
IV. —— *Melongena*, L.	I	*ibid.*
V. —— *Melongena*, L. var.	—	—
SOLANUM pomiferum fructu spinoso. 167 et 168.		
II. *Solanum insanum*, L.	I	347

	tom.	pag.
IV. *Datura Metel*, L.	I	335
V. —— *Stramonium*, L.	I	334
VI. —— *fastuosa*, L.	I	335
VII. —— *fastuosa*, L.	—	—
SOLANIFOLIA. 168.		
I. *Circœa Lutetiana*, L.	I	23
II. —— *Alpina*, L.	I	24
III. *Mirabilis Jalappa*, L.	I	329
IV. —— *dichotoma*, L.	I	*ibid.*
SOLDANELLA. 295.		
II. *Convolvulus Soldanella*, L.	I	298
III. *Soldanella Alpina*, L.	I	274
SONCHUS. 123 et 124.		
II. *Sonchus oleraceus*, L. var. *aspera.*	III	427
III. —— *oleraceus*, L. var. *aspera.*	III	*ibid.*
IV. *Tragopogon picroïdes*, L.	III	421
V. —— *asperum*, L.	III	*ibid.*
VI. —— *asperum*, L.	III	*ibid.*
VII. *Sonchus palustris*, L.	III	426
SONCHUS lævis. 124.		
I. *Sonchus oleraceus*, L. var. *lævis.*	III	427
II. —— *tenerrimus*, L.	III	*ibid.*
III. *Prenanthes muralis*, L.	III	433
IV. *Sonchus oleraceus*, L. var. *lævis.*	III	427
V. *Scorzonera picroïdes*, L.	III	424
VI. *Sonchus maritimus*, L.	III	426
SONCHUS montanus. 124.		
I. *Sonchus Alpinus*, L.	III	428
SONCHUS hirsutus *sive* villosus. 124.		
I. *Andryala integrifolia*, L.	III	447
II. —— *lanata*, L.	—	—
SONCHO affinis Lampsana vulgò, sed malè. 124.		
I. *Lapsana communis*, L.	III	433
SORBUS. 415.		
I. *Sorbus domestica*, L.	II	340
II. —— *aucuparia*, L.	II	*ibid.*
SPARTIUM. 396.		
I. *Spartium junceum*, L.	III	281

	tom.	pag.
II. *Spartium sphœrocarpum*, L.	III	282
III. —— *monospermum*, L.	III	281
SPARGANIUM. 15.		
I. *Sparganium erectum*, L.	IV	76
II. —— *erectum*, L. var.	IV	*ibid.*
SPHONDYLIUM. 157.		
I. *Heracleum Sphondylium*, L.	I	466
II. —— *angustifolium*, L.	I	467
III. —— *Austriacum*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *Alpinum*, L.	I	*ibid.*
SPIRÆA. 475.		
Spiræa salicifolia, L.	II	355
STACHYS. 236.		
I. *Stachys Germanica*, L.	III	41
II. —— *Cretica*, L.	III	42
III. —— *Alpina*, L.	III	41
IV. *Sideritis Syriaca*, L. var.	III	28
VI. *Stachys spinosa*, L.	III	42
VII. —— *palustris*, L.	III	41
STAPHISAGRIA. 324		
Delphinium Staphysagria, L.	II	425
STOEBE foliis laciniatis. 273.		
I. *Centaurea Salmantica*, L.	III	611
II. —— *erucœfolia*, L.	III	601
III. —— *paniculata*, L.	III	603
V. *Stoebe splendens*, L.	III	606
VI. *Centaurea alba*, L.	III	*ibid.*
VII. —— *Stoebe*, L.	III	605
IX. —— *aspera*, L.	III	608
STŒCHAS ARABICA. 216.		
I. *Lavandula Stœchas*, L.	III	27
II. —— *Stœchas*, L. var.	III	*ibid.*
IV. —— *dentata*, L.	III	*ibid.*
STYRAX. 452 et 453.		
I. *Styrax officinale*, L.	II	215
IV. *Stehœlina arborescens*, L.	III	491
SUBER. 424.		
II. *Quercus Suber*, L.	IV	125

	tom.	pag.
SUCCISA *seu* MORSUS DIABOLI. 269.		
I. *Scabiosa Succisa*, L.	I	169
II. —— *Succisa*, L. var.	I	*ibid.*
SYLIBUM *sive* CARDUUS lacteus.		
I. *Carduus marianus*, L.	III	381
II. —— *Syriacus*, L.	III	*ibid.*
SYMPHYTUM. 259.		
I. *Symphytum officinale*, L.	I	258
II. —— *tuberosum*, L.	I	259
III. —— *tuberosum*, L. var.	—	—
V. *Cynoglossum Omphalodes*, L.	I	256
SYMPHYTUM maculosum *sive* PULMONARIA. 259 et 260.		
I. *Pulmonaria officinalis*, L.	I	257
II. —— *angustifolia*, L.	I	*ibid.*
III. —— *angustifolia*, L. var.	—	—
SYRINGA. 398.		
I. *Syringa vulgaris*, L.	I	22
II. *Nyctantes Sambac*, L.	I	17
III. *Philadelphus coronarius*, L.	II	322
SYSYRINCHIUM. 40 et 41.		
I. *Iris Sysyrinchium*, L.	I	82
III. — *Sysyrinchium*, L.	—	—
V. *Ixia Bulbocodium*, L.	I	74
VI. — *Bulbocodium*, L. var.	—	—

T.

TAMARIX *sive* TAMARISCUS. 484 et 485.		
I. *Tamarix Germanica*, L.	I	507
II. —— *Gallica*, L.	I	*ibid.*
TANACETUM odoratum. 132.		
I. *Tanacetum vulgare*, L.	III	499
II. —— *vulgare*, L. var.	III	*ibid.*
III. *Achillea nobilis*, L.	III	582
TANACETUM inodorum. 132.		
I. *Chrysanthemum corymbosum*, L.	III	567
II. —— *corymbosum*, L. var.	III	*ibid.*
TANACETUM Africanum. 132 et 133.		
I. *Tagetes patula*, L.	—	—

	tom.	pag.
II. *Tagetes erecta*, L.	III	561
III. —— *patula*, L.	III	*ibid.*
TEREBINTHUS. 399 et 400.		
I. *Pistacia Terebinthus*, L.	IV	199
II. —— *Narbonensis*, L.	IV	*ibid.*
TEUCRIUM. 247.		
I. *Teucrium flavum*, L.	III	17
IV. —— *fruticans*, L.	III	13
V. *Scutellaria Alpina*, L.	III	69
VI. *Bartzia Alpina*, L.	III	75
THALICTRUM *sive* RUTA pratensis. 336 et 337.		
I. *Thalictrum flavum*, L.	II	449
III. —— *flavum*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *aquilegifolium*, L.	II	450
VI. —— *angustifolium*, L.	—	—
VII. —— *angustifolium*, L.	II	449
VIII. —— *minus*, L.	II	*ibid.*
IX. —— *fœtidum*, L.	II	448
THAPSIA. 148 et 149.		
II. *Thapsia villosa*, L.	I	488
IV. *Seseli Turbith*, L.	I	487
V. *Thapsia fœtida*, L.	I	488
THLASPI arvense. 105 et 106.		
I. *Thlaspi arvense*, L.	III	158
II. —— *campestre*, L. var.	III	159
III. —— *alpestre*, L.	III	160
IV. —— *campestre*, L.	III	159
V. —— *campestre*, L. var.	III	*ibid.*
VI. —— *hirtum*, L.	III	*ibid.*
VII. —— *perfoliatum*, L.	III	*ibid.*
VIII. —— *Alpestre*, L.	III	160
THLASPI umbellatum. 106.		
I. *Iberis amara*, L.	III	164
II. —— *umbellata*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *odorata*, L.	III	*ibid.*
V. —— *pinnata*, L.	III	165
THLASPI montanum. 106 et 107.		
I. *Peltaria alliacea*, L.	III	170

	tom.	pag.
II. *Thlaspi montanum*, L.	III	159
IV. *Iberis sempervirens*, L.	III	163
V. *Myagrum saxatile*, L.	III	149
VI. —— *saxatile*, L.	III	*ibid.*
VII. —— *saxatile*, L.	III	*ibid.*
VIII. *Alyssum montanum*, L.	III	167
IX. *Iberis saxatilis*, L.	III	164
X. —— *saxatilis*, L.	III	*ibid.*
XI. —— *saxatilis*, L.	III	*ibid.*
XII. *Alyssum campestre*, L.	III	167
THLASPI ALYSSON dictum, *sive* ALYSSON. 107.		
I. *Alyssum calycinum*, L.	III	167
III. *Clypeola maritima*, L.	III	169
THLASPI clypeatum. 107.		
I. *Biscutella apula*, L.	III	170
III. —— *auriculata*, L.	III	*ibid.*
IV. *Clypeola Jonc-Thlaspi*, L.	III	169
THLASPI fruticosum. 108.		
III. *Iberis saxatilis*, L.	—	—
IV. *Alyssum spinosum*, L.	III	166
V. —— *incanum*, L.	III	*ibid.*
THLASPI exoticum. 108.		
II. *Lepidium perfoliatum*, L.	III	154
THYMUS. 219.		
I. *Thymus vulgaris*, L.	III	57
II. —— *vulgaris*, L. var.	III	*ibid.*
III. *Satureia capitata*, L.	III	20
THUYA. 487 et 488.		
Thuya Occidentalis, L.	III	141
TITHYMALUS CHARACIAS, *sive* AMYGDALOÏDES. 290.		
I. *Euphorbia amygdaloïdes*, L.	II	310
II. —— *Characias*, L.	II	311
V. —— *Characias*, L.	—	—
VI. —— *serrata*, L.	II	307
VII. —— *sylvatica*, L.	II	310
TITHYMALUS MYRSINITES, *sive* MYRTIFOLIUS. 290 et 291.		
I. *Euphorbia dendroïdes*, L.	II	310

	tom.	tom.
III. *Euphorbia myrsinites*, L.	II	309
V. —— *verrucosa*, L.	II	308
TITHYMALUS maritimus. 291.		
I. *Euphorbia Paralias*, L.	II	306
II. —— *Esula*, L.	II	309
III. —— *spinosa*, L.	II	306
IV. *Apocynum Venetum*, L.	I	409
TITHYMALUS latifolius. 291.		
I. *Euphorbia hyberna*, L.	II	310
II. —— *platyphyllos*, L.	II	308
TITHYMALUS HELIOSCOPIUS. 291.		
Euphorbia helioscopia, L.	II	307
TITHYMALUS CYPARISSIAS. 291.		
I. *Euphorbia Cyparissias*, L. var.	II	309
II. —— *Cyparissias*, L.	II	*ibid.*
III. —— *exigua*, L. var. *acuta*.	II	304
IV. —— *exigua*, L. var. *retusa*.	II	*ibid.*
TILIA. 426.		
II. *Tilia Europæa*, L. var.	II	402
III. —— *Europæa*, L.	II	*ibid.*
IV. —— *Europæa*, L. var.	II	*ibid.*
TORMENTILLA. 326.		
I. *Tormentilla erecta*, L.	II	371
II. —— *erecta*, L. var.	—	—
III. *Alchemilla Alpina*, L.	I	219
TRACHELIUM, *Voyez* CAMPANULA hirsuta.		
TRACAGANTHA. 388.		
I. *Astragalus Tracagantha*, L.	III	364
TRAGOPOGON luteo flore. 274.		
I. *Tragopogon pratense*, L.	III	420
II. —— *porrifolium*, L. var.	III	421
IV. *Scorzonera laciniata*, L.	III	424
VII. —— *hirsuta*, L.	III	*ibid.*
TRAGOPOGON purpureo flore. 274 et 275.		
I. *Tragopogon porrifolium*, L.	III	421
II. —— *crocifolium*, L. var.	III	*ibid.*
III. *Geropogon hirsutum*, L.	III	419

	tom.	pag.
TRAGORIGANUM. 223.		
II. *Teucrium Marum?* L.	—	—
III. *Sideritis incana*, L.	III	29
IV. *Thymus Tragoriganum*, L.	III	59
TRAGUM. 289.		
I. *Salsola Tragus*, L.	I	421
II. —— *Kali*, L.	I	420
TRIBULUS. 350.		
Tribulus terrestris, L.	II	198
TRICHOMANES *sive* POLYTRICHUM officinarum. 355 et 356.		
I. *Asplenium Trichomanoïdes*, L.	IV	326
II. —— *Trichomanes*, L. var.	IV	*ibid.*
III. —— *Trichomanes ramosum*, L.	IV	327
TRIFOLIUM. 327.		
I. *Psoralea bituminosa*, L.	III	367
II. *Menyanthes trifoliata*, L.	I	277
III. *Psoralea Americana*, L.	III	367
TRIFOLIUM pratense. 327 et 328.		
I. *Trifolium pratense*, L.	III	372
II. —— *repens*, L.	III	371
III. —— *hybridum*, L.	—	—
IV. *Medicago lupulina*, L.	III	384
V. *Trifolium agrarium*, L.	III	376
TRIFOLIUM montanum. 328.		
I. *Trifolium Alpestre*, L.	III	373
VI. —— *spadiceum*, L.	III	376
TRIFOLIUM ALPINUM. 328.		
I. *Trifolium Alpinum*, L.	III	371
II. *Potentilla nitida*, L.	II	369
III. *Trifolium striatum*, L.	III	374
TRIFOLIUM spicatum. 328 et 329.		
I. *Trifolium incarnatum*, L.	III	373
II. —— *rubens*, L. var.	III	372
III. —— *rubens*, L.	III	*ibid.*
IV. —— *angustifolium*, L.	III	373
V. —— *squarrosum*, L.	III	373
VI. —— *arvense*, L.	III	374
TRIFOLIUM capitulo stellato, folliculato, globoso. 329.		
I. *Trifolium stellatum*, L.	III	374

	tom.	pag.
II. *Trifolium resupinatum*, L.	III	375
III. —— *lapaceum*, L.	III	372
IV. —— *Cherleri*, L.	III	*ibid.*
V. —— *spumosum*, L.	III	375
VI. —— *tomentosum*, L.	—	—
VII. —— *fragiferum*, L.	—	—
VIII. —— *fragiferum*, L.	III	375
X. *Lotus Dorycnium*, L.	III	380
XI. *Trifolium scabrum*, L.	III	374

TRIFOLIUM peltatum, scutellatum, cochleatum et turbinatum. 329.

I. *Trifolium Melilotus Cretica*, L.	III	370
II. *Medicago polymorpha*, L. var. *orbicularis*.	III	385
III. —— *polymorpha*, L. var. *scutellata*.	III	*ibid.*
V. —— *polymorpha*, L. var. *turbinata*.	III	*ibid.*
VII. —— *marina*, L.	III	*ibid.*

TRIFOLIUM cochleatum, hispidum, echinatum et spinosum. 329 et 330.

I. *Medicago polymorpha*, L.	III	385
II. —— *polymorpha*, L. var. *Arabica*.	III	386
III. —— *polymorpha*, L. var. *coronata*.	III	*ibid.*
IV. —— *polymorpha*, L. var. *rigidula*.	III	*ibid.*
VI. —— *polymorpha*, L. var. *hirsuta*.	III	*ibid.*
VII. —— *polymorpha*, L. var. *minima*.	III	*ibid.*
VIII. —— *Fagonia Cretica*. L.	II	197

TRIFOLIUM siliquâ cornutâ et falcatâ. 330.

I. *Medicago sativa*, L.	III	384
II. —— *falcata*, L.	III	*ibid.*
III. —— *radiata*, L.	III	*ibid.*

TRIFOLIUM ACETOSUM. 330.

I. *Oxalis Acetosella*, L.	II	265
II. —— *corniculata*, L.	II	266

TRIFOLIUM HEPATICUM. 330.

I. *Anemone Hepatica*, L.	II	440
II. —— *Hepatica*, L. var.	II	*ibid.*

TRIORCHIS. *Voyez* MONORCHIS.

TRIPOLIUM. 267.

I. *Aster Tripolium*, L.	III	539
II. —— *Tripolium*, L. var.	—	—

	tom.	pag.
TRITICUM. 20 et 21.		
I. *Triticum hybernum*, L.	I	145
II. —— *æstivum*, L.	I	*ibid.*
TUBERA. 375 et 376.		
I. *Lycoperdon Tuber*, L.	IV	419
II. —— *cervinum*, L.	IV	420
TULIPA præcox, simplicis et unius coloris. 57.		
I. *Tulipa Gesneriana*, L.	II	38
(Presque toutes les espèces de ce genre ne sont que des variétés de la Tulipe de *Gesner.*)		
TULIPA minor. 63 et 64.		
I. *Tulipa sylvestris*, L.	II	38
V. —— *sylvestris*, L.	II	*ibid.*
VI. —— *sylvestris*, L.	—	—
TUSSILAGO. 197.		
I. *Tussilago Farfara*, L.	III	529
II. —— *Alpina*, L.	III	*ibid.*
III. —— *Alpina*, L. var.	III	*ibid.*
IV. *Senecio Doronicum*, L. var.	III	536
TYPHA. 20.		
I. *Typha latifolia*, L.	IV	75
II. —— *angustifolia*, L.	IV	*ibid.*
III. —— *angustifolia*, L. var.	IV	75

U.

ULMUS. 426.		
I. *Ulmus campestris*, L.	I	426
URTICA urens. 231 et 232.		
I. *Urtica dioica*, L.	IV	102
II. —— *dioica*, L.	—	—
III. —— *urens*, L.	IV	101
IV. —— *pilulifera*, L.	IV	*ibid.*
URTICA fatua aculeata. 232.		
I. *Galeopis Tetrahit*, L.	III	38
II. —— *Tetrahit*, L. var.	—	—

V.

VALERIANA. 164 et 165.		
I. *Valeriana Phu*, L.	I	64

	tom.	pag.
II. *Valeriana Calcitrapa*, L.	I	64
III. ——— *cornucopiæ*, L.	I	*ibid.*
IV. ——— *officinalis*, L.	I	*ibid.*
VI. ——— *officinalis*, L.	I	*ibid.*
VII. *Polemonium cœruleum*, L.	I	302
VIII. *Valeriana dioica*, L.	I	64
X. ——— *tripteris*, L.	I	65
XI. ——— *tripteris*, L.	I	*ibid.*
XII. ——— *montana*, L.	I	*ibid.*
XIII. ——— *montana*, L.	—	—
XVI. ——— *dioica*, L.	I	64
XVII. ——— *rubra*, L.	I	63
XVIII. ——— *rubra*, L.	—	—
XIX. ——— *Locusta*, L.	I	66
XX. ——— *echinata*, L.	I	67
XXI. ——— *Locusta*, L. var. *coronata*.	—	—
XVII. ——— *Calcitrapa?* L.	—	—
VERBASCULUM *seu* PRIMULA VERIS, simplici flore. 241 et 242.		
I. *Primula veris*, L. var. *officinalis*,	I	271
II. ——— *veris*, L. var. *elatior*.	I	*ibid.*
III. ——— *veris*, L. var. *acaulis*,	I	*ibid.*
VERBASCUM ALPINUM. 242.		
I. *Primula farinosa*, L.	I	272
II. ——— *farinosa*, L.	—	—
VERBASCULUM. 239 et 240.		
I. *Verbascum Thapsus*, L.	I	331
II. ——— *Lychnitis*,	I	332
III. ——— *phlomoïdes*, L.	I	*ibid.*
IV. ——— *phlomoïdes*, L. var.	—	—
V. ——— *Lychnitis*, L. var.	I	332
VI. ——— *sinuatum*, L.	I	233
VII. ——— *nigrum*, L.	I	332
IX. ——— *Celsia Arcturus*, L.	III	104
VERBASCUM salvifolium. 240.		
I. *Phlomis fruticosa*, L.	III	49
II. ——— *Lychnitis*, L.	III	*ibid.*
IV. ——— *purpurea*, L.	III	*ibid.*
VERBENA. 268 et 269.		
I. *Verbena officinalis*, L.	I	41

	tom.	pag.
II. *Verbena supina*, L.	I	41
IV. —— *nodiflora*, L.	I	40
VERONICA. 246 et 247.		
I. *Veronica officinalis*, L.	—	—
II. —— *officinalis*, L.	I	25
III —— *longifolia*, L.	I	*ibid.*
IV. —— *spuria*, L.	I	24
V. —— *spicata*, L.	I	25
VI. —— *serpillifolia*, L.	I	26
VII. —— *fruticulosa*, L.	I	*ibid.*
VIII. —— *bellidioïdes*, L.	I	*ibid.*
VIBURNUM vulgò. 428 et 429.		
Viburnum Lantana, L.	I	501
VICIA *et* APHACA. 344 et 345.		
I. *Vicia sativa*, L.	III	324
II. —— *sativa*, L.	III	*ibid.*
III. —— *dumetorum*, L.	III	323
IV. —— *sepium*, L.	III	325
V. —— *sativa*, L. var. *nigra.*	III	324
VI. —— *Cracca*, L.	III	323
VII. —— *onobrychoïdes*, L.	III	*ibid.*
VIII. —— *Cracca*, L.	III	*ibid.*
X. —— *lutea*, L.	III	324
XI. *Lathyrus Aphaca*, L.	III	318
VIOLA MARTIA rotundifolia. 199.		
I. *Viola odorata*, L.	IV	643
II. —— *canina*, L.	IV	644
III. —— *odorata*, L. var.	IV	643
IV. —— *odorata*, L. var.	IV	*ibid.*
V. —— *pinnata*, L.	IV	*ibid*
VI. —— *calcarata*, L.	IV	643
VII. —— *biflora*,	IV	*ibid.*
VIOLA MARTIA foliis oblongis. 199 et 200.		
I. *Viola arborescens*, L.	IV	646
II. —— *montana*, L.	IV	644
IV. —— *grandiflora*, L.	IV	645
V. —— *tricolor*, L. var.	IV	*ibid.*
VI. —— *tricolor*, L.	IV	645
VII. —— *grandiflora*, L.	IV	*ibid.*

	tom.	pag.
VIRGA AUREA. 268.		
I. *Senecio Doria*, L.	III	535
II. *Solidago Virga aurea*, L.	III	544
III. *Senecio Sarracenicus*, L.	III	535
IV. *Solidago Virga aurea*, L.	—	—
VI. *Senecio Doronicum*, L. var.	III	536
VISCUM arboreum. 423.		
I. *Viscum album*, L.	IV	195
V. *Tillandsia utriculata*, L.	II	8
VITIS IDÆA *sive* MYRTILLUS. 470 et 471.		
I. *Vaccinium Myrtillus*, L.	II	120
II. *Arbutus Alpina*, L.	II	212
IV. *Vaccinium Vitis Idæa*, L.	II	121
V. —— *uliginosum*, L.	II	120
VI. *Arbutus Uva ursi*, L.	—	—
VII. *Vaccinium Oxycoccus*, L.	II	121
VITIS VINIFERA. 298 et 299.		
I. *Vitis vinifera*, L.	I	383
VII. —— *Labrusca*, L.	I	284
X		
XYRIS. 30.		
I. *Iris fœtidissima*, L.	I	80
Y.		
YUCCA. 91.		
VII. *Yucca gloriosa*, L.	II	60
Z.		
ZEA. 21 et 22.		
I. *Triticum monococcum*, L.	I	146
II. —— *Spelta*, L.	I	*ibid.*
V. *Hordeum Zeocritum*, L.	I	144
ZEDOARIA. 35 et 36.		
II. *Kæmpferia rotunda*, L.	—	—
ZIMZIBER. 35		
I. *Amomum Zingiber*, L.	I	4
ZIZYPHUS *seu* JUJUBA. 446.		
I. *Rhamnus Zizyphus*, L. var.	I	365
II. —— *Zizyphus*, L.	I	*ibid.*

Fin de la huitième Table.

TABLE NEUVIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE LATINE

DES SYNONYMES des Genres de TOURNEFORT, *PLUMIER*, *MICHELI*, *DILLEN*, *VAILLANT*, *BOERRHAAVE*, *GLEDITSCH*, *BUXBAUM*, *JACQUIN*, *LAMARCK*, *cités dans le Système des Plantes, et ramenés à la nomenclature de* LINNÉ.

Le premier chiffre indique le *Tome*; le second le *Numéro du Genre*; le troisième l'*Espèce du Genre* à laquelle est appliqué le synonyme; le quatrième la *page du Tome* où sont indiqués tous les Synonymes qui se rapportent à chaque Genre (*).

A.

ABIES, *T. Pinus*, L.		IV	1175	11	136
Abrotanum, *T. Artemisia*, L.		III	1025	5	500
Absinthium, *T. Artemisia*, L.		III	1025	17	*ibid.*
Abutilon,	*T. Sida*, L.	III	902	17	233
	D. Malva, L.	III	906	—	239

(*) Cette Table des *Synonymes des Genres* présente trois espèces de noms génériques : 1.° Ceux que *Linné* a adoptés, et dont il a fait des espèces caractérisées par des noms triviaux, qui conservent le synonyme du genre, comme *Abies*, T. qu'il désigne sous le nom de *Pinus Abies*; 2.° ceux qu'il a reformés comme vicieux, et dont il n'a point fait de noms spécifiques, tel que *Staphylodendron*, qu'il a appellé *Staphylæa*: nous les désignons par des tirets (---) à la colonne des espèces; 3.° les noms de genres composés qu'il a adoptés en partie, ou avec quelque changement ou modification; (ils sont marqués par un astérisque), comme *Centaurium majus*, T. qui a été désigné sous le nom de *Gentiana Centaurium*, L. Dès-lors on voit par la disposition que nous avons suivie, les synonymes que *Linné* a adoptés en tout ou en partie, et ceux qu'il a réformés.

	tom.	gen.	esp.	pag.
Acacia, *T. Mimosa*, L.	IV	1171	—	281
Acajou, *T. Anacardium*, L.	II	546	—	158
Acarna, *V. Cnicus*, L.	III	1005	5	468
Acetosa, *T. Rumex*, L.	II	485	26	79
Achyrantha, *D. Achyranthes*, L.	I	311	—	387
Achyrophorus, *V. Seriola*, L.	III	996	—	450
Adhatoda, *T. Justicia*, L.	I	28	1	31
Ageratum, *Lam. Erinus*, L.	III	832	—	119
Agrimonoïdes, *T. Agrimonia*, L.	II	663	3	295
Ahouai, *T. Cerbera*, L.	I	319	1	396
Alaternus, *T. Rhamnus*, L.	I	284	16	361
Alchimilla, *T. Alchemilla*, L.	I	177	—	218
Alkékengi, *T. Physalis*, L.	I	267	7	341
Aloïdes, *V. Stratiotes*, L.	II	744	1	433
Alnus, *T. Betula*, L.	IV	1147	6	97
Alpina, *P. Alpinia*, L.	I	4	—	5
Alsine, *T. Stellaria*, L.	II	617	—	245
Alyssoïdes, *T. Alyssum*, L.	III	869	—	165
Alysson, *T. Alyssum*, L.	III	869	—	*ibid.*
Amaranthoïdes, *T. Gomphrena*, L.	I	343	—	424
Amberboï, *V. Centaurea*, L.	III	1066	—	599
Anacampseros, *T. Sedum*, L.	II	629	3	258
Ananas, *T. Bromelia*, L.	II	427	1	7
Ananthocyclus, *V. Cotula*, L.	III	1050	—	571
Anapodophyllum, *T. Podophyllum*, L.	II	702	—	389
Androsæmum, *T. Hypericum*, L.	III	981	8	397
Anguina, *M. Trichosanthes*, L.	IV	1190	1	157
Anguria, *T. Cucumis*, L.	IV	1193	3	163
Anonis, *T. Ononis*, L.	III	935	—	294
Aparine, *T. Galium*, L.	I	132	23	181
Aphaca, *T. Lathyrus*, L.	III	946	1	317
Apocynum, *T. Asclepias*, L.	I	333	—	409
Aquifolium, *T. Ilex*, L.	I	184	1	223
Arachidna, *P. Arachis*, L.	III	937	—	301
Arapabaca, *P. Spigelia*, L.	I	222	—	284
Arctheca, *V. Arctotis*, L.	III	1074	—	620
Armeniaca, *T. Prunus*, L.	II	675	7	330
Asarina, *T. Antirrhinum*, L.	III	808	39	89

	tom.	gen.	esp.	pag.
Ascyrum, *T. Hypericum*, L.	III	981	6	397
Aspergillus, *M. Byssus*, L.	IV	1324	—	407
Astericus, *T. Buphthalmum*, L.	III	1059	—	588
Astericus, *D. Silphium*, L.	III	1069	—	614
Asteroïdes, *V. Buphtalmum*, L.	III	1059	—	588
Asterophorus, *V. Leysera*, L.	III	1045	—	562
Astragaloïdes, *T. Phaca*, L.	III	964	—	356
Atractylis, *V. Carthamus*, L.	III	1010	—	475
Aurantium, *T. Citrus*, L.	III	974	2	392
Auricula ursi, *T. Primula*, L.	I	210	3	271

B.

Baccharis, *V. Athanasia*, L.	III	1023	—	496
Ballote, *T. Ballota*, L.	III	778	—	43
Balsamina, *T. Impatiens*, L.	III	1093	5	647
Balsamita, *V. Tanacetum*, L.	III	1024	8	408
Belladona, *T. Atropa*, L.	I	266	2	239
Bellidiastrum, *M. Doronicum*, L.	III	1039	3	555
Bellidiastrum, *V. Osmites*, L.	III	1063	—	596
Bellidioïdes, *V. Chrysanthemum*, L.	III	1048	—	564
Bellis, *Leucanthemum*, L.	III	1042	—	558
Bermudiana, *T. Sisyrinchium*, L.	IV	1103	1	28
Bihaï, *P. Heliconia*, L.	I	310	1	386
Bistorta, *T. Polygonum*, L.	II	137	1	140
Blattaria, *T. Verbascum*, L.	I	262	8	331
Boletus, *M. Phallus*, L.	IV	1328	—	415
Bonduc, *P. Guilandina*, L.	II	560	1	182
Borbonia, *P. Laurus*, L.	II	545	9	155
Breynia, *P. Capparis*, L.	II	699	10	383
Brunella, *T. Prunella*, L.	III	793	—	71
Bryonioïdes, *D. Scyos*, L.	IV	1195	—	167
Bucca ferrea, *M. Ruppia*, L.	I	187	—	226
Buglossum, *T. Anchusa*, L.	I	194	—	253
Bugula, *T. Ajuga*, L.	III	763	—	10
Bulbocastanum, *T. Bunium*, L.	I	366	1	454
Buphthalmum, *T. Anthemis*, L.	III	1052	—	574
Bursa pastoris, *T. Thlaspi*, L.	III	866	10	157

C.

	tom.	gen.	esp.	pag.
CAAPEBA, *P. Cissampelos*, L.	IV	1243	2	234
Cacalianthemum, *D. Cacalia*, L.	III	1013	—	481
Cacao, *T. Theobroma*, L.	III	972	1	390
Caïnito, *P. Chrysophyllum*, L.	I	282	1	359
Calaba, *P. Calophyllum*, L.	II	716	2	402
Calamintha, *T. Melissa*, L.	III	786	3	59
Calamus aromaticus, *M. Acorus*, L.	II	467	1*	64
Calceolus, *T. Cypripedium*, L.	IV	1100	1	23
Calcitrapa, *V. Centaurea*, L.	III	1066	47	599
Calcitrapoïdes, *V. Centaurea*, L.	III	1066	48	*ibid.*
Caltha, *T. Calendula*, L.	III	1073	—	618
Camara, *P. Lantana*, L.	III	824	4	112
Camphorata, *T. Camphorosma*, L.	I	176	—	217
Cannacorus, *T. Canna*, L.	I	1	—	3
Capnoïdes, *T. Fumaria*, L.	III	920	7	266
Caprifolium, *T. Lonicera*, L.	I	250	1	321
Caragana, *Lam. Robinia*, L.	III	953	5	333
Caraguata, *P. Tillandsia*, L.	II	428	—	8
Cardamindum, *T. Tropæolum*, L.	II	502	—	104
Cardiaca, *T. Leonurus*, L.	III	780	1	47
Carpobolus, *M. Lycoperdon*, L.	IV	1333	6	419
Carthamoïdes, *V. Carthamus*, L.	III	1010	—	475
Carvi, *T. Carum*, L.	I	395	1	493
Caryophyllata, *T. Geum*, L.	II	692	—	372
Caryophyllus, *T. Dianthus*, L.	II	614	7	253
——— aromaticus, *T. Caryophyllus*, L.	II	727	1	409
Casia, *T. Osyris*, L.	IV	1203	—	190
Cassida, *T. Scutellaria*, L.	III	732	—	69
Castanea, *T. Fagus*, L.	IV	1170	1	129
Castorea, *P. Duranta*, L.	III	849	—	134
Cassuvium, *Lam. Anacardium*, L.	II	546	—	158
Cassytha, *Lam. Cassyta*, L.	II	548	—	160
Catanance, *T. Catananche*, L.	III	999	—	454
Cataria, *T. Nepeta*, L.	III	768	1	22
Cedrus, *T. Juniperus*, L.	IV	1240	—	229
Ceïba, *P. Bombax*, L.	III	901	2	232

	tom.	gen.	esp.	pag.
Centaurium majus, *T. Centaurea*, L.	III	1066	6*	599
——— minus, *T. Gentiana*, L.	I	352	19	430
Cepa, *T. Allium*, L.	II	442	33	23
Cerasus, *T. Prunus*, L.	II	675	10	330
Ceratocephaloïdes, *V. Coreopsis*, L.	III	1062	—	594
Ceratocephalus, *V. Bidens*, L.	III	1012	—	479
Chamæ-Buxus, *T. Polygala*, L.	III	921	20	269
Chamæ-Cerasus, *T. Lonicera*, L.	I	250	—	321
Chamædrys, *T. Teucrium*, L.	III	764	26	11
Chamælea, *T. Cneorum*, L.	I	52	—	69
Chamæmelum, *T. Anthemis*, L.	III	1052	—	574
Chamænerion, *T. Epilobium*, L.	II	507	—	108
Chamæpythis, *T. Teucrium*, L.	III	764	4	11
Chamærhododendros, *T. Rhododendrum*, L.	II	592	—	206
Christophoriana, *T. Actæa*, L.	II	700	—	387
Chrysanthemoïdes, *T. Osteospermum*, L.	III	1075	—	622
Cicuta, *T. Conium*, L.	I	367	—	454
Cicutaria, *T. Ligusticum*, L.	I	376	—	467
Cinara, *T. Cynara*, L.	III	1007	—	471
Cirsium, *D. Serratula*, L.	III	1003	—	459
Cirsium, *T. Carduus*, L.	III	1004	—	462
Citreum, *T. Citrus*, L.	III	974	—	392
Clandestina, *T. Lathræa*, L.	III	801	1	81
Clematitis, *T. Clematis*, L.	II	754	—	445
Clitorius, *D. Clitoria*, L.	III	943	—	312
Clymenum, *T. Lathyrus*, L.	III	946	13	317
Colocynthis, *T. Cucumis*, L.	IV	1193	1	163
Conocarpodendron, *Boer. Protea*, L.	I	117	29	161
Conyza, *T. Baccharis*, L.	III	1029	—	518
Corallodendron, *T. Erythryna*, L.	III	926	2	278
Corallo-Fungus, *V. Clavaria*, L.	IV	1332	—	418
Coralloïdes, *D. Lichen*, L.	IV	1319	—	377
Coralloïdes, *T. Clavaria*, L.	IV	1332	6	418
Corindum, *T. Cardiospermum*, L.	II	540	—	149
Corona-imperialis, *T. Fritillaria*, L.	II	444	1*	34
Corona solis, *T. Helianthus*, L.	III	590	—	160
Coronopus, *T. Plantago*, L.	I	148	16*	194
Coronopus, *T. Cochlearia*, L.	III	867	5	160
Cortusa, *P. Thalia*, L.	I	8	—	8

	tom.	gen.	esp.	pag.
Cotinus, *T. Rhus*, L.	I	399	17	498
Cotula, *T. Anacyclus*, L.	III	1051	—	573
Courbaril, *T. Hymenæa*, L.	II	555	1	175
Crepis, *V. Sonchus*, L.	III	987	—	425
Crocodilium, *V. Centaurea*, L.	III	1066	62	599
Crocodilodes, *V. Atractylis*, L.	III	1009	—	474
Cruciata, *T. Valantia*, L.	IV	1258	6	264
Cujete, *P. Crescentia*, L.	III	820	1	110
Cuminoïdes, *T. Lagoëcia*, L.	I	306	1	384
Cururu, *P. Paullinia*, L.	II	539	4	147
Cyanus, *T. Centaurea*, L.	III	1066	15	599
Cyathoïdes, *M. Peziza*, L.	IV	1331	—	416
Cydonia, *T. Pyrus*, L.	II	682	6	343
Cynocrambe, *T. Theligonum*, L.	IV	1166	1	122
Cynomorion, *M. Cynomorium*, L.	IV	1126	—	70
Cyperella, *M. Schœnus*, L.	I	71	—	86
Cyperoïdes, *M. Carex*, L.	IV	1137	5	80

D.

DAMASONIUM, *T. Alisma*, L.	II	495	3	91
Dens canis, *T. Erythronium*, L.	II	447	1	37
—— leonis, *T. Leontodon*, L.	III	991	—	433
Dimorphoteca, *V. Calendula*, L.	III	1073	—	618
Doria, *D. Solidago*, L.	III	1035	—	542
Dracunculus, *T. Arum*, L.	IV	1119	1	45

E.

ECHINOPUS, *T. Echinops*, L.	III	1084	—	633
Elvela, *G. Helvella*, L.	IV	1330	—	416
Elychrysum, *T. Gnaphalium*, L.	III	1026	—	507
Emerus, *T. Coronilla*, L.	III	956	1	337
Ephemerum, *T. Tradescantia*, L.	II	430	—	10
Eresia, *P. Theophrasta*, L.	I	221	—	283
Erinacea, *T. Anthyllis*, L.	III	936	13	298
Erinaceus, *M. Hydnum*, L.	IV	1327	—	414
Eriocephalus, *V. Carduus*, L.	III	1004	—	462
Eriophorus, *V. Andryala*, L.	III	994	—	447

	tom.	gen.	esp.	pag.
Erucago, *T. Bunias*, L.	III	887	3	201
Eupatoriocephalacron, *D. Verbesina*, L.	III	1058	—	566
Evax, *Lam. Filago*, L.	III	1079	—	627

F.

FABA, *T. Vicia*, L.	III	947	18	322
Fabago, *T. Zygophyllum*, L.	II	577	2	194
Fagopyrum, *T. Polygonum*, L.	II	537	24	140
Ferrum equinum, *T. Hippocrepis*, L.	III	958	—	341
Ficoïdea, *D. Aizoon*, L.	II	685	—	353
Ficoïdes, *T. Mesembryanthemum*, L.	II	684	—	347
Filipendula, *T. Spiræa*, L.	II	686	11	354
Fluvialis, *M. Naïas*, L.	IV	1198	—	180
Fœniculum, *T. Anethum*, L.	I	394	3	491
Fœnum-Græcum, *T. Trigonella*, L.	III	970	9	380
Franca, *M. Frankenia*, L.	II	481	—	76
Frangula, *T. Rhamnus*, L.	I	284	14	361
Fraxinella, *T. Dictamnus*, L.	II	564	—	186
Fungoïdaster, *M. Helvella*, L.	IV	1330	—	416
Fungoïdes, *M. Helvella*, L.	IV	1330	—	*ibid.*
Fungoïdes, *V. Peziza*, L.	IV	1331	—	*ibid.*

G.

GALEOPSIS, *T. Galeopsis*, L.	III	777	—	40
Gallium, *T. Galium*, L.	I	132	—	181
Geaster, *M. Lycoperdon*, L.	IV	1333	—	419
Genista, *T. Spartium*, L.	III	929	—	280
Genista-spartium, *T. Ulex*, L.	III	932	—	290
Genistella, *T. Genista*, L.	III	930	—	283
Geoffræa, *Lam. Geoffroya*, L.	III	952	—	332
Gesnera, *P. Gesneria*, L.	III	807	—	88
Geum, *T. Saxifraga*, L.	II	608	17	220
Glaucium, *T. Chelidonium*, L.	II	703	2	389
Glaucoïdes, *M. Peplis*, L.	II	482	—	77
Gnaphalium, *V. Filago*, L.	III	1079	—	627
Gnaphalodes, *T. Micropus*, L.	III	1080	—	629
Granadilla, *T. Passiflora*, L.	IV	1110	—	32
Grossularia, *T. Ribes*, L.	I	301	5	378

	tom.	gen.	esp.	pag.
Guaiacana, *T. Diospyros*, L.	IV	1274	—	290
Guaiava, *T. Psidium*, L.	II	670	—	322
Guanabanus, *P. Annona*, L.	II	751	—	458
Guazuna, *P. Theobroma*, L.	III	972	2	390

H.

HACUB, *V. Gundelia*, L.	III	1085	—	634
Harmala, *T. Peganum*, L.	II	656	1	289
Hedipnois, *T. Hyoseris*, L.	III	995	7	448
Helianthemum, *T. Cistus*, L.	II	728	39	410
Helichrysoïdes, *V. Seriphium*, L.	III	1087	—	635
Helichrysum, *V. Gnaphalium*, L.	III	1026	—	507
Helleborine, *T. Serapias*, L.	IV	1097	—	19
Helleborus, *Lam. Isopyrum*, L.	II	759	—	463
Helminthotheca, *V. Picris*, L.	III	986	—	424
Hepatica, *M. Marchantia*, L.	IV	1315	—	372
Herba Paris, *T. Paris*, L.	II	542	1*	151
Hermodactylus, *T. Iris*, L.	I	65	—	78
Hieracioïdes, *V. Crepis*, L.	III	993	—	443
Hippocastanum, *T. Æsculus*, L.	II	498	1	95
Horminum, *T. Salvia*, L.	I	41	9	45
Hydraceratophyllon, *V. Ceratophyllum*, L.	IV	1162	—	118
Hydrophace, *Buxb.*	IV	1130	—	73
Hypericoïdes, *P. Ascyrum*, L.	III	982	2	403
Hypocistis, *T. Cytinus*, L.	IV	1115	1	43
Hypophyllocarpodendron, *Boer. Protea*, L.	I	117	15	161

I.

ICACO, *P. Chrysobolanus*, L.	II	677	1	337
Ilex, *T. Quercus*, L.	IV	1168	3	124
Inga, *P. Mimosa*, L.	IV	1271	1	261
Isertia, *Lam. Guettarda*, L.	IV	1161	—	117
Isora, *P. Helicteres*, L.	IV	1114	2	42

J.

JABOTAPITA, *P. Ochna*, L.	II	714	2	402
Jacæa, *T. Centaurea*, L.	III	1066	29	599

	tom.	gen.	esp.	pag.
Jacobæa, *T. Senecio*, L.	III	1033	26	530
Jacobæastrum, *V. Othonna*, L.	III	1076	—	624
Jalappa, *T. Mirabilis*, L.	I	259	2	328
Jan-Raja, *P. Rajania*, L.	IV	1226	—	212
Jonthlaspi, *T. Clypeola*, L.	III	870	1	168
Juncago, *T. Triglochin*, L.	II	488	—	86

K.

Kahile, *T. Bunias*, L.	III	887	5	201
Kali, *T. Salsola*, L.	I	339	1	420
Karatas, *P. Ananas*, L.	II	427	3	7
Ketmia, *T. Hibiscus*, L.	III	911	—	249
Ketmia, *D. Hibiscus*, L.	III	911	—	*ibid.*
Knoxia, *Lam. Knoxia*, L.	I	130	—	179
Koddapail, *P. Pistia*, L.	IV	1112	—	40

L.

Lacryma Job, *T. Coix*, L.	IV	1134	1	79
Lampsana, *T. Lapsana*, L.	III	998	—	452
Lapathum, *T. Rumex*, L.	II	485	—	79
Lappa, *T. Arctium*, L.	III	1002	1	457
Larix, *T. Pinus*, L.	IV	1175	7	136
Laurentia, *M. Lobelia*, L.	III	1091	20	618
Lauro-Cerasus, *T. Prunus*, L.	II	675	5	330
Lausonia, *Lam. Lawsonia*, L.	II	521	—	118
Ledum, *M. Andromeda*, L.	II	593	—	207
Lens, *T. Cicer*, L.	III	949	—	328
Lenticula, *M. Lemna*, L.	IV	1130	—	73
Lenticularia, *M. Lemna*, L.	IV	1130	—	73
Lentiscus, *T. Pistacia*, L.	IV	1212	5	198
Leontodontoïdes, *M. Hyoseris*, L.	III	995	—	448
Leontopetalon, *T. Leontice*, L.	II	456	2	48
Lepidocarpodendron, *Boër. Protea*, L.	I	117	13	161
Leucanthemum, *T. Chrysanthemum*, L.	III	1048	5	564
Leucoïum, *T. Cheiranthus*, L.	III	879	—	182
Lichen, *D. Marchantia*, L.	IV	1315	—	372
Lichen, *D. Riccia*, L.	IV	1317	—	375
Lichenastrum, *D. Jungermannia*, L.	IV	1313	—	368

	tom.	gen.	esp.	pag.
Lichenoïdes, *D. Lichen*, L.	IV	1319	—	377
Lilac, *T. Syringa*, L.	I	22	—	21
Lilio-Asphodelus, *T. Hemerocallis*, L.	II	467	—	64
Lilio-Hyacinthus, *T. Scilla*, L.	II	452	2	42
Lilio-Narcissus, *T. Amaryllis*, L.	II	439	—	20
Lilium convallium, *T. Convallaria*, L.	II	459	—	53
Limodorum, *T. Orchis*, L.	IV	1094	—	5
Limon, *T. Citrus*, L.	III	974	—	392
Limonium, *T. Statice*, L.	I	418	1	516
Linagrostis, *M. Eriophorum*, L.	I	74	—	98
Lingua cervina, *T. Asplenium*, L.	IV	1295	—	324
Linaria, *T. Antirrhinum*, L.	III	808	31	89
Linokarpon, *M. Linum*, L.	I	419	—	519
Lobelia, *P. Scævola*, L.	I	244	1	317
Lonchitis, *T. Polypodium*, L.	IV	1096	27	328
Lunularia, *M. Marchantia*, L.	IV	1315	—	372
Lupulus, *T. Humulus*, L.	IV	1221	1	206
Luteola, *T. Reseda*, L.	II	664	1	296
Lychnidea, *D. Phlox*, L.	I	229	—	289
Lycogala, *M. Mucor*, L.	IV	1334	—	421
Lycoperdastrum, *M. Lycoperdon*, L.	IV	1333	—	419
Lycoperdoïdes, *M. Lycoperdon*, L.	IV	1333	—	419
Lycopersicon, *T. Solanum*, L.	I	268	13	343
Lycopodioïdes, *D. Lycopodium*, L.	IV	1302	—	435

M.

MALACHRODENDRUM, *Lam. Stewartia*, L.	III	912	1	253
Malacoïdes, *T. Malope*, L.	III	908	1	246
Malva, *T. Alcœa*, L.	III	905	—	238
Malvaviscus, *D. Hibiscus*, L.	III	911	10	249
Malus, *T. Pyrus*, L.	II	682	3	343
Mameï, *P. Mammea*, L.	II	713	—	400
Mancanilla, *P. Hippomane*, L.	IV	1186	1*	154
Mandragora, *T. Atropa*, L.	I	266	1	339
Mangles, *P. Rhizophora*, L.	II	646	5*	282
Manihot, *T. Jatropha*, L.	IV	1183	5	150
Matricaria, *Lam. Chrysanthemum*, L.	III	1048	—	564
Mays, *T. Zea*, L.	IV	1133	1	72

	tom.	gen.	esp.	pag.
Medica, *T. Medicago*, L.	III	971	—	383
Melanoschœnus, *M. Schœnus*, L.	I	71	—	86
Melilotus, *T. Trifolium*, L.	III	968	1-7	368
Melo, *T. Cucumis*, L.	IV	1193	5	163
Melocactus, *T. Cactus*, L.	II	668	2	318
Melongena, *T. Solanum*, L.	I	268	19	343
Melopepo, *T. Cucurbita*, L.	IV	1192	5	160
Meum, *T. Æthusa*, L.	I	385	5	479
Millefolium, *T. Achillea*, L.	III	1053	17	578
Moldavica, *T. Dracocephalum*, L.	III	787	9	61
Molle, *T. Schinus*, L.	IV	1234	1	223
Molucca, *T. Molucella*, L.	III	782	—	51
Monbin, *P. Spondias*, L.	II	627	1	256
Monilifera, *V. Osteospermum*, L.	III	1075	3*	622
Morisona, *P. Morisonia*, L.	III	916	—	255
Moschatellina, *T. Adoxa*, L.	II	543	1	152
Mucilago, *M. Mucor*, L.	IV	1334	—	421
Murucuia, *T. Passiflora*, L.	IV	1110	12	32
Muscari, *T. Hyacinthus*, L.	II	461	9	56
Muscoïdes, *M. Jungermannia*, L.	IV	1313	—	368
Myosotis, *T. Cerastium*, L.	II	637	—	370
Myriophyllon, *V. Myriophyllum*, L.	IV	1163	—	119

N.

Nacibea, *L. Manettia*, L.	I	171	—	214
Narcisso-Leucoïum, *T. Leucoïum*, L.	II	434	—	13
Nasturtium, *T. Lepidium*, L.	III	865	—	154
Nelumbium, *Lam. Nymphæa*, L.	II	709	—	397
Nelumbo, *T. Nymphæa*, L.	II	709	4	*ibid.*
Nhandiropa, *P. Fewillea*, L.	IV	1223	—	208
Nux, *T. Juglans*, L.	IV	1169	—	127
Nymphoïdes, *T. Menyanthes*, L.	I	215	1	276

O.

Obeliscotheca, *V. Rudbeckia*, L.	III	1061	—	593
Ochrus, *T. Pisum*, L.	III	944	4	313
Ocimum, *T. Ocymum*, L.	III	790	—	65
Omphalodes, *T. Cynoglossum*, L.	I	195	8	255

	tom.	gen.	esp.	pag.
Onagra. *T. Oenothera*, L.	II	505	—	106
Onobrychis, *T. Hedysarum*, L.	III	961	48	345
Ophris, *T. Ophrys*, L.	IV	1096	—	14
Opulus, *T. Viburnum*, L.	I	400	7	500
Opuntia, *T. Cactus*, L.	II	668	18	318
Oreoselinum, *T. Athamantha*, L.	I	369	5	458
Ornithopodium, *T. Ornithopus*, L.	III	957	—	339
Ornus, *M. Fraxinus*, L.	IV	1273	2	289
Ostrya, *M. Carpinus*, L.	IV	1171	2	131
Oxycoccus, *T. Vaccinium*, L.	II	523	11	119
Oxys, *T. Oxalis*, L.	II	634	—	264

P.

PALIURUS, *T. Rhamnus*, L.	I	284	17	361
Panicastrella, *M. Cenchrus*, L.	IV	1255	—	260
Papaya, *T. Carica*, L.	IV	1232	1	221
Papia, *M. Lamium*, L.	III	774	—	35
Papyrius, *Lam. Morus*, L.	IV	1150	3*	104
Paronychia, *T. Illecebrum*, L.	I	313	8	390
Patagonica, *D. Patagonula*, L.	I	277	—	356
Pavia, *Boër. Æsculus*, L.	II	498	2	95
Pelargonium, *Lam. Geranium*, L.	III	897	—	217
Pelecinus, *T. Bisserula*, L.	III	966	1	365
Penæa, *P. Polygala*, L.	III	921	16	269
Pentaphylloïdes, *T. Potentilla*, L.	II	690	—	365
Pepo, *T. Cucurbita*, L.	IV	1192	3	160
Pereschya, *P. Cactus*, L.	II	668	24	318
Periclymenum, *T. Lonicera*, L.	I	250	4	321
Persea, *P. Laurus*, L.	II	545	8	155
Persica, *T. Amygdalus*, L.	II	674	1	328
Persicaria, *T. Polygonum*, L.	II	137	9	140
Pervinca, *T. Vinca*, L.	I	322	—	398
Petasites, *T. Tussilago*, L.	III	1032	10	527
Phalangium, *T. Anthericum*, L.	II	455	—	46
Phallo-Boletus, *M. Phallus*, L.	IV	1328	—	415
Pilosella, *V. Hieracium*, L.	III	992	6	436
Pimpinella, *T. Poterium*, L.	IV	1167	—	122
Pistachia, *Lam. Pistacia*, L.	IV	1212	—	198

	tom.	gen.	esp.	pag.
Pittonia, *P. Tournefortia*, L.	I	205	—	266
Polium, *T. Teucrium*, L.	III	764	32	11
Polyacantha, *V. Carduus*, L.	III	1004	—	462
Polygonatum, *T. Convallaria*, L.	II	459	3	53
Polyporus, *M. Boletus*, L.	IV	1326	—	412
Populago, *T. Caltha*, L.	II	761	—	466
Porophyllum, *V. Cacalia*, L.	III	1013	1	481
Porrum, *T. Allium*, L.	II	442	2	23
Primula veris, *T. Primula*, L.	I	110	—	271
Pseudo-Acacia, *T. Robinia*, L.	III	953	1	333
Pseudo-Cyperus, *M. Schœnus*, L.	I	71	—	86
Pseudo-Dictamnus, *T. Marrubium*, L.	III	779	9	44
Pseudo-Ruta, *M. Ruta*, L.	II	565	—	186
Psyllium, *T. Plantago*, L.	I	148	18	194
Ptarmica, *T. Achillea*, L.	III	1053	12	578
Pterophorus, *V. Pteronia*, L.	III	1017	—	489
Pulsatilla, *T. Anemone*, L.	II	752	6	439

Q.

Quamoclit, *T. Ipomœa*, L.	I	232	1	299
Quinquefolum, *T. Potentilla*, L.	II	690	—	363

R.

Ranunculoïdes, *V. Ranunculus*, L.	II	757	—	451
Rapa, *T. Brassica*, L.	III	884	6	192
Raphanistrum, *T. Raphanus*, L.	III	886	3	199
Rapistrum, *T. Crambe*, L.	III	889	—	202
Rapunculus, *T. Phyteuma*, L.	I	236	—	313
Rapuntium, *T. Lobelia*, L.	III	1091	—	638
Renealmia, *P. Tillandsia*, L.	II	428	—	8
Rhabarbarum, *T. Rheum*, L.	II	549	2	160
Rhagadioloïdes, *V. Hyoseris*, L.	III	995	8	448
Rhagadiolus, *T. Lapsana*, L.	III	998	4	452
Rhaponticoïdes, *V. Centaurea*, L.	III	1066	—	599
Rhaponticum, *V. Centaurea*, L.	III	1066	33*	599
Ricinoïdes, *T. Croton*, L.	IV	1181	—	146
Ros solis, *T. Drosera*, L.	I	421	—	525

	tom.	gen.	esp.	pag.
Royoc, *P. Morinda*, L.	I	252	3	325
Rubeola, *T. Crucianella*, L.	I	133	—	185
Ruta-muraria, *T. Acrosticum*, L.	IV	1290	—	316

S.

SALICARIA, *T. Lythrum*, L.	II	660	1	292
Salvinia, *M. Marsilea*, L.	IV	1299	—	343
Santolinoïdes, *V. Anacyclus*, L.	III	1051	—	573
Sapota, *P. Achras*, L.	II	473	2	71
Saracena, *T. Sarracenia*, L.	II	708	—	396
Scirpo-Cyperus, *M. Scirpus*, L.	I	73	—	93
Sclarea, *T. Salvia*, L.	I	42	32	45
Scorodoprasum, *M. Allium*, L.	II	442	12	23
Scorpioïdes, *T. Scorpiurus*, L.	III	959	—	342
Scorzoneroïdes, *V. Scorzonera*, L.	III	985	—	422
Sebestena, *D. Cordia*, L.	I	276	3	355
Securidaca, *Lam. Coronilla*, L.	III	956	8	337
Selaginoïdes, *D. Lycopodium*, L.	IV	1302	6	345
Selago, *D. Lycopodium*, L.	IV	1302	9	*ibid.*
Senna, *T. Cassia*, L.	II	557	15	176
Serratula, *Lam. Stehælina*, L.	III	1018	—	490
Sesamoïdes, *T. Reseda*, L.	II	664	5	296
Sicyoïdes, *T. Sicyos*, L.	IV	1195	—	167
Siliqua, *T. Ceratonia*, L.	IV	1282	1	298
Siliquastrum, *T. Cercis*, L.	II	553	1	173
Silybum, *V. Carduus*, L.	III	1004	—	462
Sinapi, *T. Sinapis*, L.	III	885	—	197
Sinapistrum, *T. Cleome*, L.	III	890	—	204
Sirium, *Lam. Santalum*, L.	I	169	—	213
Sisarum, *T. Sium*, L.	I	378	4	471
Sisyrinchium, *T. Iris*, L.	I	65	23	78
Sloana, *P. Sloanea*, L.	II	711	—	399
Spargonophorus, *V. Ethulia*, L.	III	1014	2	484
Spartium, *T. Genista*, L.	III	930	—	283
Sphondylium, *T. Heracleum*, L.	I	375	1	466
Staphyllodendron, *T. Staphyllea*, L.	I	404	—	505
Stœchas, *T. Lavandula*, L.	III	769	4	25
Stramonium, *T. Datura*, L.	I	263	2	334

	tom.	gen.	esp.	pag.
Strigilia, *Lam. Tinus*, L.	II	547	—	159
Strumpfia, *Lam. Strumphia*, L.	III	1088	—	636
Suber, *T. Quercus*, L.	IV	1168	4	124
Suillus, *M. Boletus*, L.	IV	1326	—	412
Suriana, *P. Paullinia*, L.	II	539	2	147
(On a imprimé par erreur, dans le nom spécifique, *Seriana* pour *Suriana*.)				
Symphoricarpos, *T. Lonicera*, L.	I	250	11	321
Syringa, *T. Philadelphus*, L.	II	669	—	322

T.

Tamariscus, *T. Tamarix*, L.	I	405	—	506
Tamnus, *T. Tamus*, L.	IV	1224	—	209
Tapia, *P. Cratœva*, L.	II	654	2	287
Taraxaconastrum, *V. Hyoseris*, L.	III	995	—	448
Tarchonanthus, *V. Iva*, L.	IV	1155	—	110
Telephiastrum, *D. Portulaca*, L.	II	659	—	291
Telephioïdes, *T. Andrachne*, L.	IV	1196	1	168
Terebinthus, *T. Pistacia*, L.	IV	1212	4	198
Thlaspidium, *T. Biscutella*, L.	III	872	—	170
Thymælea, *T. Daphne*, L.	II	526	2	132
Thysselinum, *T. Selinum*, L.	I	368	—	456
Tinus, *T. Viburnum*, L.	I	400	1	500
Tithymaloïdes, *T. Euphorbia*, L.	II	665	—	299
Tithymalus, *T. Euphorbia*, L.	II	665	—	*ibid.*
Toxicodendron, *T. Rhus*, L.	I	399	10	498
Tragacantha, *T. Astragalus*, L.	III	965	42	357
Tragopogonoïdes, *V. Tragopogon*, L.	III	984	—	419
Tragoselinum, *T. Pimpinella*, L.	I	396	—	493
Tribuloïdes, *T. Trapa*, L.	I	165	—	210
Trichomanes, *T. Asplenium*, L.	IV	1295	12*	324
Trifoliastrum, *M. Trifolium*, L.	III	968	—	368
Triosteospermum, *D. Triosteum*, L.	I	251	—	324
Tuber, *M. Lycoperdon*, L.	IV	1333	1	419
Tuna, *D. Cactus*, L.	II	668	20	318
Tunica, *D. Dianthus*, L.	II	614	—	233

U.

	tom.	gen.	esp.	pag.
ULMARIA, *T. Spiræa*, L.	II	686	12	354
Unifolium, *D. Convallaria*, L.	III	459	—	53
Usnea, *D. Lichen*, L.	IV	1319	93	377
Uva-ursi, *T. Arbutus*, L.	II	596	5	211

V.

VALDIA, *P. Ovieda*, L.	III	850	—	135
Valerianella, *T. Valeriana*, L.	I	48	—	63
Vallisnerioïdes, *M. Vallisneria*, L.	IV	1199	—	180
Vanilla, *P. Epidendrum*, L.	IV	1101	1	24
Van-Rheedia, *P. Rheedia*, L.	II	698	—	385
Vesicaria, *T. Alyssum*, L.	III	869	16	165
Virga-aurea, *T. Solidago*, L.	III	1035	11	542
Vitis-Idæa, *T. Vaccinium*, L.	II	523	10	119
Vulneraria, *T. Anthyllis*, L.	III	936	2	298

X.

XERANTHEMOÏDES, *D. Xeranthemum*, L.	III	1027	—	515
Xiphion, *T. Iris*, L.	I	65	21	78
Xylon, *T. Gossypium*, L.	III	910	—	247
Xylosteum, *T. Lonicera*, L.	I	250	7	323

Z.

ZACINTHA, *T. Lapsana*, L.	III	998	2	452
Zanonia, *P. Commelina*, L.	I	68	7	84
Zizyphus, *T. Rhamnus*, L.	I	284	23	361

Fin de la neuvième Table.

TABLE DIXIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE

des Auteurs de Botanique cités dans le Système des Plantes.

A

ALDROV. *Dendr.* Ulyssis Aldrovandi Dendrologiæ naturalis, scilicet Arborum historiæ, libri duo. *Francofurti*, 1671 ; un vol. in-folio, avec environ 170 Figures sur bois, en noir, ombrées, mauvaises. (Ouvrage posthume publié par *Ovidius Montalbanus.*)

Collecteur et Descripteur.

Aldrovande a été non-seulement un des plus infatigables rédacteurs en histoire naturelle, mais un des premiers collecteurs des productions des trois Règnes. Guidé par les vues du grand *Gesner*, il forma dans sa jeunesse le plan du plus grand travail qu'on ait exécuté en histoire naturelle. Non-seulement il se proposa de décrire et de faire connoître par des dessins toutes les espèces qu'il avoit pu se procurer, mais encore d'y ajouter tout ce que ses prédécesseurs, Poëtes, Orateurs, Antiquaires, Historiens, avoient annoncé relativement à ces espèces. Nous ne possédons qu'un seul Ouvrage d'*Aldrovande*, rédigé d'après ce plan publié par lui-même ; savoir son *Ornithologie*. Ce n'est point un Ouvrage indifférent pour les Botanistes, l'Auteur ayant souvent fait graver le végétal sur lequel chaque oiseau se repose ou dont il se nourrit. Tous les autres traités d'*Aldrovande* ont été publiés par ses Élèves d'après ses manuscrits ; aussi n'offrent-ils pas la même perfection de rédaction que son Ornithologie. Sa *Dendrologie* sur-tout (le seul fragment de botanique qui ait été publié) mérite à peine de fixer l'attention des Botanistes. Ses Figures peu exactes et ses descriptions peu détaillées, sont en quelque façon perdues dans un fatras d'érudition. D'ailleurs il s'en faut de beaucoup que la Dendrologie d'*Aldrovande* fasse connoître tous les arbres et arbustes décrits par ses prédécesseurs ou ses contemporains.

ALLION. *Flor. Pedem.* Flora Pedemontana, auctore Carolo Allionio. *Aug. Taurinorum*, 1785 ; trois vol. in-fol. avec 92 Planches, sur cuivre, renfermant 239 Figures en noir, ombrées, ou coloriées, bonnes et en partie complètes.

Systématique orthodoxe ; Inventeur , Collecteur , Descripteur , et Dénominateur nouveau.

Allioni considéré comme systématique , s'est proposé de combiner les Systèmes de *Tournefort* et de *Rivin* , avec celui de *Ludwig* , de manière cependant à conserver le plus grand nombre de Familles naturelles possible. A ce titre , on doit regarder son Système comme un des meilleurs , offrant aux Élèves une clef qui peut les conduire avec facilité à la connoissance des genres et des espèces. Comme Collecteur , *Allioni* a été un des plus laborieux Botanistes , et a le plus contribué à déterminer d'une manière précise les Plantes Européennes. Ceux même qui , d'après les principes de *Linné* , adoptent avec plus de difficulté les prétendues espèces neuves , ne peuvent disconvenir que l'Ouvrage d'*Allioni* n'en présente un grand nombre de telles. Nous lui sommes encore redevables de plusieurs bonnes Figures des Espèces rares déjà publiées par les Anciens , tels que *Matthiole* , *l'Écluse*. Mais la partie de son Ouvrage qui est peut-être la mieux travaillée , c'est l'indication des propriétés des plantes , également éloignée d'un scepticisme trop hardi , et d'une trop grande crédulité. *Allioni* n'assigne aux plantes que les vertus véritablement reconnues par les plus célèbres Praticiens.

ALP. *Ægypt.* Prosperi ALPINI de Plantis exoticis libri duo. *Venetiis* , 1656 ; un vol. in-4° , avec 145 Planches sur cuivre , renfermant 145 figures en noir , ombrées , médiocres et bonnes , et 141 Plantes disposées sans ordre.

Ejusd. de Pl. Ægyp. Prosperi ALPINI , Historia naturalis Ægypti , pars secunda , sive de Plantis Ægypti. *Lugduni Batavorum* , 1735 ; un vol. in-4° , avec 54 Planches sur cuivre , renfermant 54 Figures en noir , ombrées , médiocres et bonnes , et 54 Plantes disposées sans ordre. Le premier volume qui a pour titre , *Prosperi ALPINI Historiæ Ægypti naturalis pars prima* , contient 3 Planches sur cuivre , renfermant 5 Figures en noir , ombrées.

Inventeur , Descripteur , et Dénominateur ancien.

Prosper Alpin a été du petit nombre des Médecins qui ont mené de front avec un égal succès , la médecine clinique et les différentes parties de l'Histoire naturelle. Il est célèbre parmi les Praticiens par plusieurs Ouvrages bien rédigés sur diverses parties de la Médecine proprement dite , savoir par son admirable traité *de Præsagiendâ vitâ et morte ; de Medicinâ methodicâ ; de Medicinâ Ægyptiorum.* Ce savant ayant eu occasion de parcourir la Grèce , et ayant long-temps séjourné en Egypte , on devoit attendre de sa sagacité qu'il enrichiroit sur-tout la Botanique de plusieurs découvertes précieuses. En effet , ses Ouvrages nous offrent une foule d'espèces absolument neuves qu'il a fait connoître par des descriptions assez exactes , accompagnées de Figures gravées au burin , si non complètes comme celles de *Co-*

Iumna son contemporain, du moins très-exactes, comme nous nous en sommes assurés, en en confrontant plusieurs avec les échantillons de nos herbiers.

AMM. *Ruth.* Stirpium rariorum in Imperio Ruthenico sponte provenientium, Icones et Descriptiones, collectæ à Joanne AMMANO. *Petropoli*, 1739; un vol in-4°, avec 35 Planches sur cuivre, renfermant 41 Figures en noir, ombrées, médiocres, bonnes et en partie complètes; et 285 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Descripteur, Collecteur, et Dénominateur nouveau.

Cet Auteur ne peut être regardé que comme éditeur, n'ayant publié que les nouvelles espèces de plantes découvertes en Sibérie par *Gmelin*, et les Elèves de l'Académie de Pétersbourg qui accompagnoient ce célèbre Voyageur. Quoique ses Figures soient exactes, on peut lui reprocher avec raison, que dans ses descriptions il n'a point connu l'art de les rendre précises et caractéristiques. Cependant quelques-unes de ses Figures dessinées d'après des individus vivans cultivés dans le Jardin de l'Académie, méritent les plus grands éloges.

* AUBL. *Guyan.* Histoire des Plantes de la Guyane Françoise, rangées suivant la Méthode sexuelle, par M. AUBLET FUSET, à *Londres* et à *Paris*, 1775; quatre volumes in-4°, avec 392 Planches sur cuivre, renfermant 408 Figures en noir, ombrées, bonnes et en très-grande partie complètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Cet Ouvrage d'*Aublet Fuset*, est une des collections les plus considérables de Plantes exotiques publiées dans le dernier siècle. L'Auteur étoit si passionné pour la science, que nous l'avons vu après son retour d'Amérique, passer la plus grande partie des journées dans le Jardin botanique de Paris; et là il ne se contentoit pas d'examiner avec un soin extrême les plantes les plus rares, mais il les soignoit avec un zèle infatigable. On doit à ses recherches non-seulement un très-grand nombre d'espèces nouvelles, mais encore une foule de genres qui avoient échappés aux recherches de ses prédécesseurs. Ses descriptions sont très-exactes, et ses figures presque toutes dessinées par lui-même, répondent à l'exactitude des descriptions. Peut-être auroit-on desiré, que moins subordonné pour la nomenclature aux idées d'*Adanson*, il n'eût pas donné si souvent à ses genres et à ses espèces des noms barbares très-difficiles à retenir; ce qui a obligé ceux qui ont travaillé au nouveau Pinax Linnéen, de changer presque tous ses noms.

B

BARREL. *Icon.* Jacobi BARRELIERI Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatæ. *Paris*, 1714; un vol. in-folio, avec 1324 Planches sur cuivre, renfermant 1416 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes. [Edition publiée par *Antoine*

de Jussieu.] Dans le nombre de ces Figures ne sont pas comprises 54 Figures représentant des corallines, insectes marins, etc. et 37 Figures de coquilles; ce qui fait en tout 1507 Figures.

Inventeur, (*rarement Descripteur, ses descriptions ayant été perdues*) *et Dénominateur ancien.*

L'ouvrage de *Barrelier* est devenu très-précieux pour la connoissance d'une multitude de plantes Méridionales, Alpines et sous-Alpines; mais il ne faut pas croire que toutes les espèces qu'il a fait graver soient neuves. Un grand nombre de ses Figures sont calquées sur celles de l'*Ecluse*, *Columna* et autres. Un plus grand nombre encore n'offre que des variétés, comme celles qui représentent les *Narcisses*, *Hyacinthes*, *Ancolies*, etc. mais plusieurs sont originales et rendent avec exactitude le port et l'ensemble d'un grand nombre d'espèces neuves, observées non-seulement en France, en Italie, en Espagne, mais encore dans les vastes plaines de Pologne et de Lithuanie. Ces dernières furent fournies à *Barrelier* par un Amateur distingué, le Chevalier *Corvin*, Secrétaire d'ambassade en Pologne; il y en a quelques-unes même qui n'ont pu être déterminées par *Ant. Jussieu* son éditeur; comme celle que *Barrelier* a intitulée *Grebigne*, qui est le *Calla palustris*, L.; une belle variété du *Galeopsis Ladanum*, à grande fleur jaune, etc.

L'on trouve parmi les plantes de *Barrelier* une série considérable de Graminées qu'il a le premier reconnues et fait dessiner; mais ce qui rend sur-tout sa collection précieuse, c'est que long-temps avant *Tournefort*, il a accompagné ses Figures des parties de la fructification, dessinées séparément.

BAUH. *Prod.* Gaspari BAUHINI Prodromus Theatri Botanici. *Basileæ*, 1671; un vol. in-4°, avec 141 Figures sur bois, en noir, ombrées, bonnes et médiocres.

BAUH. *Pin.* ou G. B. P. BAUHINI Pinax Theatri Botanici. *Basileæ*, 1671; un vol. in-4° sans Figures, renfermant 5992 espèces ou variétés de Plantes.

Systématique hétérodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Le *Pinax* de *G. Bauhin* est un livre absolument nécessaire aux Botanistes qui veulent recourir aux sources. Cet Auteur très-versé dans la lecture des Ouvrages de ses prédécesseurs et de ses contemporains, et connoissant parfaitement le très-grand nombre de plantes dont ils ont donné les notices ou les Figures, pouvoit seul ramener à une nomenclature uniforme les différens noms des plantes connues de son temps. En général ses descriptions sont moins exactes et moins caractéristiques que celles de son frère *J. Bauhin*; mais ses Figures sont meilleures et rendent très-bien, (comme nous nous en sommes assurés en confrontant avec les échantillons de nos herbiers), les plantes qu'il a fait dessiner.

BAUH. ou J. B. *Hist.* Joannis Bauhini Historia Plantarum universalis. *Ebroduni*, 1650; trois vol. in-folio, avec environ 3337 Figures sur bois, mauvaises, médiocres et bonnes.

Systématique hétérodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

L'ouvrage de *J. Bauhin* peut encore aujourd'hui être considéré comme une des meilleures sources en Botanique, sur-tout pour les plantes Européennes. Ses descriptions sont la plupart caractéristiques, et même plusieurs sont complètes, c'est-à-dire expriment toutes les parties de la plante, même les étamines et les pistils. Elles portent toutes sur des caractères trop négligés par les Botanistes modernes, savoir la grandeur des plantes et de leurs différentes parties, l'odeur et la saveur. Ses discussions critiques annoncent un savoir profond et un jugement exquis. Les propriétés qu'il indique sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont rarement infectées de superstition. Il désigne avec candeur les plantes qu'il a examinées vivantes et leur véritable localité. Les amateurs de la Flore Lyonnoise, vérifient avec satisfaction la station de plusieurs espèces rares qui se trouvent encore dans les lieux indiqués par *J. Bauhin* qui, né à Lyon, y avoit fait un long séjour et avoit même travaillé pendant plusieurs années au grand ouvrage de l'Histoire des Plantes, exécuté sous la direction de *Dalechamp*.

Nous prévenons qu'il s'est glissé une erreur dans les citations des Figures de *J. Bauhin*, dans le premier volume de notre *Système des Plantes;* elles ont été indiquées dans le sens de l'écriture de gauche à droite en ligne pleine; mais dans les trois autres volumes on a eu égard à la division du texte et des Figures sur deux colonnes, de sorte qu'il faut toujours compter les Figures de la première colonne du texte, et ensuite celles de la seconde. Cette dernière méthode qui est plus simple, évite toute équivoque.

BELLEV. *Opusc.* Opuscules de Pierre Richier de Belleval, par *Broussonet*, *Paris*, 1785; un vol. in-8°, avec 5 Planches sur cuivre, renfermant 5 Figures en noir, ombrées, bonnes, dont une complète.

Cet Ouvrage renferme 1.° *Onomatologia* seu *Nomenclatura Stirpium quæ in Horto regio Monspeliensi recens constructo, coluntur, auctore* Richerio de Belleval. *Monspelii*, 1598; 2.° Dessein touchant la recherche des plantes du pays de Languedoc, dédié à Messieurs les Gens des trois états dudit pays. *A Montpellier*, 1605.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien par des phrases grecques.

Richier de Belleval doit être regardé comme le véritable restaurateur de la Botanique en France. Il avoit entrepris, aidé par les bienfaits de *Henri IV*, des voyages considérables non-seulement dans la ci-devant province du Languedoc, mais encore aux Pyrenées, en Provence. Il avoit parcouru avec beaucoup de

soin toute la chaîne des Alpes, depuis Nice jusqu'en Piémont. Il s'étoit sur-tout long-temps arrêté sur les Alpes qui avoisinent Grenoble, et notamment à la Grande-Chartreuse. Il paroît par ses manuscrits, qui sont déposés dans la bibliothèque du Dr *Gilibert*, qu'il étoit toujours accompagné dans ses excursions botaniques, par un habile Dessinateur. Il a laissé, à sa mort, plus de 500 dessins des plantes qui lui paroissoient nouvelles, et environ 360 cuivres. Le Dr *Gilibert* a publié toutes celles dont il avoit acheté les cuivres en 1773 à Montpellier ; mais il conserve encore 150 épreuves dont les cuivres ont été perdus, et qui n'ont jamais été publiés. Il paroît que ces 150 épreuves avoient été séparées par *Magnol* qui se proposoit de les publier comme un *Prodromus*, puisqu'elles portent à la marge la traduction latine des phrases grecques de *Belleval*, écrites de la main de *Magnol*.

Ces épreuves offrent les plantes les plus rares de la collection de *Belleval*, et il est de fait par l'examen critique que nous en avons fait avec le Dr *Gilibert*, que *Belleval* est l'inventeur d'une centurie entière. Il seroit à desirer pour l'honneur de l'École de Montpellier et des Botanistes François, que ces Figures fussent bientôt publiées avec le texte original de *Belleval*, qui offre le journal exact de ses excursions botaniques, et près de 500 descriptions de plantes rares tracées de main de maître, et rédigées la plupart avec une si grande élégance qu'on peut les regarder comme de vrais tableaux des espèces indiquées par l'Auteur. Comme le Dr *Gilibert* n'a jamais laissé échapper l'occasion de se procurer les espèces et les variétés indiquées par *Belleval*, nous pouvons affirmer, d'après la confrontation rigoureuse que nous avons faite des échantillons conservés en herbier, que quoique les Figures de *Belleval* soient gravées au burin d'une manière souvent très-dure, elles sont presque toutes très-exactes, et que plusieurs d'entr'elles doivent être regardées comme complètes, offrant non-seulement les parties de la fructification isolées, suivant le plan exécuté long-temps après par *Tournefort*, mais encore (ce qui est particulier à notre Auteur) les racines dans tout leur développement, sur-tout lorsqu'elles offrent une configuration propre à l'espèce énoncée.

En nous résumant, d'après ce manuscrit et d'après les Figures publiées ou non publiées, il résulte que *Richier de Belleval* doit être assimilé, pour le nombre des espèces qu'il a le premier découvert, à *l'Ecluse ;* et pour les détails relatifs aux parties de la fructification, qui sont devenues les fondemens de toute disposition méthodique, à *Gesner*, *Cæsalpin* et *Columna*.

Nous citerons ici une observation qui nous paroît importante. La Nature, dans le développement des espèces des végétaux, est en général très-uniforme ; mais comme dans le

Règne végétal les causes accidentelles dérangent quelquefois sa marche, ce qui produit des monstruosités végétales, *Richier de Belleval* crut devoir publier toutes les aberrations de ce genre qu'il avoit observées, et qui ne sont pas en petit nombre; ce qui a rendu la détermination de plusieurs de ses Figures très-difficile, parce que les individus qui présentent ces monstruosités, étant aussi rares que ceux des animaux, on n'a peut-être pas eu occasion depuis lui, de rencontrer de semblables variétés.

BOERRH. *Lugd.* Index alter Plantarum quæ in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur, conscriptus ab Hermanno BOERRHAAVE. *Lugduni-Batavorum*, 1727; deux vol. in-4°, avec 39 Planches sur cuivre, renfermant 39 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Quoique le grand *Boerrhaave* soit moins célèbre parmi les Botanistes que parmi les Médecins, cependant il mérite de fixer l'attention des premiers par le Système qu'il a publié; par les Caractères naturels de ses Genres, dans lesquels il a le premier indiqué pour la plupart, le nombre et la situation des étamines; par quelques Genres qu'il a constitués, comme l'*Hottonia*; par la belle série des *Protæa*, qui se trouve dans le second volume de son Ouvrage, et qu'il a fait graver d'après les dessins d'un Voyageur. *Boerraave* n'ayant point voyagé et n'ayant étudié les plantes que dans son jardin de Leyde, étoit très-foible sur le diagnostique des plantes qui croissent spontanément en Europe, comme l'anecdote de *Scheuchzer* le Graministe en fait foi. Ce professeur avoit traité assez durement le jeune *Scheuchzer* qui lui demandoit le nom de quelques nouvelles espèces de plantes Africaines. Le lendemain *Scheuchzer* ayant fait une herborisation autour de Leyde, pria *Boerrhaave* de lui dénommer plusieurs graminées qu'il lui présentoit, et ce savant Professeur n'en put caractériser aucune.

BOCCON. *Sic.* Icones et descriptiones Plantarum Siciliæ, Melitæ, Galliæ et Italiæ, auctore Paule BOCCONE; un vol. in-4°, avec 52 Planches sur cuivre, renfermant 129 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

* *Ejusd.* Mus. Museo di piante rare della Sicilia, Maltha, Corsica, Italia, Piemonte, e Germania, di Paolo BOCCONE. *Venezia*, 1697; un vol. in-4°, avec . . . Planches sur cuivre, renfermant . . . Figures en noir, ombrées. . . .

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Quoiqu'*Antoine de Jussieu* ait reproché avec amertume à *Boccone* de n'avoir presque publié que les Figures que *Barrelier* lui avoit communiquées, cependant il est regardé aujourd'hui comme un des Botanistes qui a travaillé le plus avantageusement pour les progrès de la Botanique

Européenne. Nous ne croyons pas qu'on doive le regarder comme plagiaire pour le plus grand nombre des Figures qu'il a insérées dans son Ouvrage intitulé, *Plantæ Siculæ*, dont plusieurs n'ont été caractérisées suivant le plan de *Linné*, que par le Dr *Cyrilli*, et qui nous paroissent très-exactes, les ayant confrontées avec les échantillons cueillis sur les lieux.

* BREYN. *Prodr.* Jacobi Breynii Prodromus Plantarum rariorum. . . . . 1680 et 1689; deux vol. in-4°, avec . . . Planches sur . . . renfermant . . . . Figures. . . .

Inventeur, Collecteur, et Dénominateur ancien.

Non-seulement *Breyn* a décrit et fait dessiner plusieurs nouvelles espèces de plantes étrangères, mais il a été encore un des Botanistes qui a le plus contribué à faire connoître les plantes de la partie septentrionale de l'Europe; savoir, celles qui croissent spontanément autour de Dantzick. Nous savons positivement qu'il a fourni une partie des notes et des dessins des Ouvrages d'*Elving*, pour les plantes de la Prusse.

BRID. *Musc.* Muscologia recentiorum *seu* Analysis, Historia et Descriptio methodica omnium Muscorum frondosorum hucusque cognitorum ad normam Hedwigii, à Sam. Et. Bridel. *Gothæ*, 1797, quatre vol. in-4°, avec 14 Planches sur cuivre, renfermant 463 Figures en noir, bonnes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

L'Ouvrage de *Bridel* présente non-seulement l'ensemble de toutes les connoissances acquises jusqu'à ce jour sur les *Mousses*, mais encore une nouvelle disposition des Genres et des Espèces d'après les vues d'*Hedwig*. Cet Ouvrage peut être regardé comme complet, soit pour la description des Genres, soit pour la synonymie, les descriptions les plus soignées et les plus exactes des Espèces. Ses phrases caractéristiques énoncent toujours des attributs constans et faciles à saisir.

BRUNS. *Icon.* Herbarum vivæ Icones, auctore Peroth Brunsfeld. *Argentorati*, 1530, tome premier, avec 85 Figures sur bois, au trait, médiocres et bonnes.

Inventeur.

Quoique *Brunsfeld* n'ait pas été le premier des modernes qui ait publié les Figures des Plantes, puisque l'on en trouve plusieurs centuries dans l'*Hortus sanitatis* de *Cuba*, et dans quelques autres; cependant on regarde *Brunsfeld* comme le premier des Auteurs à citer pour les Figures. Il en a publié en trois temps différens et en trois petits vol. in-folio, 238 dont 16 sont répétées. Les Figures adoptées pour la plupart par *Fuchs* et par *Tragus*, sont dessinées au trait, et d'une vérité si frappante qu'elles sont encore aujourd'hui les meilleures. L'exactitude du dessin a été si rigoureuse que l'artiste s'est piqué de rendre quelques feuilles telles qu'il les observoit après

avoir été attaquées par les insectes. mais le texte de cet Auteur mérite encore moins d'être étudié que celui de *Fuchs*, n'offrant qu'un farago de passages des Anciens assez mal coordonné, et plus mal appliqué encore. Cette manie des Auteurs Allemands de vouloir trouver sur leur sol les plantes de la Grèce et de l'Asie mineure, a donné lieu à cette discordance de nomenclature qui n'a pu être débrouillée dans la suite que par *G. Bauhin*.

BUL. *Paris.* Flore de Paris par BULLIARD. *Paris*... six vol. in-8°, avec 640 Planches sur cuivre, renfermant 640 Figures enluminées, médiocres, bonnes et en très-grande partie complètes, (quelques-unes mal déterminées) et 640 Plantes rangées selon le système de *Linné*.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Quoique *Bulliard* n'eût pas acquis une grande pratique pour la détermination des plantes, lorsqu'il a publié sa Flore de Paris, cependant cet Ouvrage est devenu précieux pour les Elèves en Botanique, parce qu'il offre d'assez bonnes descriptions caractéristiques des Espèces les plus vulgaires, et des Figures le plus souvent correctes, quoiqu'assez mal coloriées. Nous regrettons que la mort prématurée de ce laborieux Botaniste l'ait empêché de conduire à sa fin son grand Ouvrage, intitulé, *l'Herbier de la France*. Les plantes vénéneuses et les champignons sont exécutés de manière à ne rien laisser à desirer, soit pour l'exactitude des dessins, la vérité des teintes, et la précision du signalement de chaque espèce. Il ne s'est pas rendu moins utile par son *Dictionnaire de Botanique*, qui est un des plus complets que nous possédions dans notre langue.

BURM. *Thes.* Thesaurus Zeylanicus, exhibens plantas in insulâ Zeylanicâ nascentes, curâ et studio Joann. BURMANNI. *Amstelodami*, 1737; un vol. in-4°, avec 110 Planches sur cuivre, renfermant 157 figures en noir, ombrées, bonnes et complètes.

Ejusd. Afric. Joannis BURMANNI rariorum Africanarum Plantarum ad vivum delineatarum, iconibus ac descriptionibus illustratarum, decades X. *Amstelodami*, 1738; un vol. in-4°, avec 100 Planches sur cuivre, renfermant 217 Figures en noir, ombrées, bonnes, et en partie complètes.

Collecteur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Quoique *Burmann* ne doive pas être cité comme un véritable inventeur, n'ayant point voyagé dans les pays dont il a décrit et fait dessiner les plantes, il a cependant rendu un grand service à la science, en publiant les descriptions et les Figures d'une multitude d'espèces neuves découvertes, mais non publiées par de célèbres voyageurs ses contemporains.

BUX. *Cent.* Plantarum minus cognitarum, circa Byzantinum et in Oriente observatarum, centuriæ V, per J. C. BUXBAUM. *Petropoli*, 1728, in-4°,

avec 326 Planches sur cuivre, renfermant environ 576 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Quoique *Buxbaum* ait été un des plus célèbres voyageurs en Botanique, et qu'il ait eu occasion d'examiner une multitude de nouvelles espèces dans ses voyages en Grèce et dans le Levant, cependant on lui reproche avec raison d'avoir travaillé ses Ouvrages avec très-peu de soin, et de n'avoir point surveillé ses Dessinateurs et ses Graveurs. En général ses descriptions ont été rédigées à la hâte, et annoncent rarement un Botaniste qui sait saisir les véritables attributs distinctifs de chaque espèce. Aussi la plupart de celles qu'il a publiées sont devenues inutiles comme tant d'autres, par l'impossibilité où s'est trouvé *Linné* de les déterminer, n'ayant pas sous les yeux les échantillons pour les comparer avec les figures.

(Nous n'avons vérifié que les figures des quatre premières centuries, les seules que nous possédions).

C

CAMER. *Epit.* Joachimi CAMERARII Epitome de Plantis. *Francofurti ad Mœnum*, 1586; un vol. in-4°, avec environ 1018 Figures sur bois, en noir, ombrées, médiocres, bonnes et en partie complètes.

Ejusd. Hort. Hortus medicus et philosophicus, in quo plurimarum stirpium breves descriptiones, novæ icones non paucæ, indicationes locorum natalium, etc. continentur; auctore Joachimo CAMERARIO. *Francofurti ad Mœnum*, 1588; un vol. in-4°, avec 47 Planches sur bois, renfermant 50 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Les Ouvrages, les Manuscrits et les Figures de *Gesner*, relatifs à la Botanique, ayant été achetés par *Wulf* qui avoit promis de les publier, cette précieuse collection fut acquise par *Camerarius* qui n'en tira pas le parti que l'on pouvoit en attendre. Il se contenta d'en employer un grand nombre dans la dernière édition de son *Epitome* ou Abrégé de *Matthiole*, et quelques autres dans son *Hortus*. Il ne faut cependant pas croire que toutes les Figures caractéristiques que cet Auteur a publiées, appartiennent à *Gesner*. Il est certain que *Camerarius* ayant adopté les principes de *Gesner*, avoit fait dessiner plusieurs espèces qui n'ont été découvertes que longtemps après sa mort, d'après le plan adopté par ce grand homme, savoir en faisant dessiner à part avec beaucoup de soin, la fleur et le fruit.

Quoi qu'il en soit, les Figures de *Camerarius* sont de véritables chefs-d'œuvre de gravure sur bois. Plusieurs cependant ne méritent aucune attention, n'étant que des copies de celles de *Matthiole*.

* CATESB. *Carol.* Histoire naturelle de la Caroline, de la Floride,

Floride, et des isles de Bahama, par feu M. Marc CATESBY, et revu par M. *Edwards*. A *Londres*, 1754; deux vol. in-fol. atlas, avec 220 Planches sur cuivre, dont 160 relatives à la Botanique, renferment 167 Figures coloriées, bonnes et incomplètes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Le magnifique Ouvrage de *Catesby* est plus estimé pour les Oiseaux que pour les Plantes, cet Auteur ayant fait graver à côté de chaque oiseau, la plante dont il se nourrit ou sur laquelle il se repose.

CAVANIL. *Diss. Bot.* Dissertationes Botanicæ, auctore Antonio-Josepho CAVANILLES. *Paris*, 1785. Huit dissertations en deux vol. in-4, avec 243 Planches sur cuivre, renfermant 536 Figures en noir, ombrées, bonnes et en très-grande partie complètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur moderne.

Cavanilles peut être comparé à *Plukenet*, pour le nombre des plantes exotiques dont il a publié les figures et les descriptions. Toutes celles sur lesquelles il a travaillé à Paris, ont été gravées d'après les individus cultivés dans les jardins ou conservés dans les riches herbiers de *Jussieu*, etc.

Nous devons à ce Savant laborieux, un autre Ouvrage plus considérable encore, qui présente une foule de Plantes d'Amérique et plusieurs espèces de Plantes rares d'Espagne non encore ramenées par *Linné* à l'ordre systématique, absolument neuves ou encore flottantes parmi les Figures de *l'Ecluse* et *Barrelier*. En général les phrases caractéristiques de *Cavanilles* portent sur des attributs constans; ses descriptions sont assez détaillées pour fournir une image exacte de l'espèce. La plupart de ses Figures sont dessinées avec vérité, et plusieurs sont précieuses par les détails de la fructification, qui peuvent seuls caractériser les genres.

CLUS. *Hist.* Caroli CLUSII Atrebatis rariorum Plantarum Historia. *Antuerpiæ*, 1610; un vol. in-folio, avec 1161 Figures sur bois, en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

CLUS. *Exot.* Caroli CLUSII Atrebatis, Exoticorum libri decem. *Lugduni Batavorum*, 1605; un vol. in-folio, avec 300 Figures sur bois, en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

Inventeur et Descripteur.

L'Ecluse, quoique non Médecin, a été un des Botanistes les plus zélés du 16e siècle, et un des martyrs les plus célèbres de cette science. Il se fit d'abord connoître dans le monde savant par la traduction françoise du premier Ouvrage de *Dodoens*, intitulé *Histoire des Plantes*, rédigé en flamand. Son zèle pour la Botanique lui fit bientôt après entreprendre le voyage de la France, pendant lequel il parcourut nos hautes Alpes du Dauphiné et des Pyrénées. Pénétrant ensuite en Espagne, il visita cette région féconde en plantes rares, de même que le

Portugal. Ses recherches dans ces pays nous ont procuré ses *Plantæ rariores per Hispaniam observatæ ;* ouvrage dans lequel on ne sauroit assez louer l'exactitude du dessin, la beauté et la finesse des gravures sur bois de 230 Espèces nouvelles pour la plupart ; les descriptions de ces Espèces portent presque toutes non-seulement sur l'ensemble des parties de chaque plante, mais sur leur nombre, leur figure, et souvent même sur les parties les plus minutieuses, comme les étamines et les pistils, dont l'examen paroît avoir été réservé aux modernes.

Quoique *l'Ecluse* ne paroisse pas au premier coup d'œil s'être occupé dans cet Ouvrage des grands rapports des végétaux entr'eux, qui constituent ce que nous appelons *Méthode*, on voit cependant par ces rapprochemens, que ce que nous appelons *Genres* et *Espèces*, et même *Ordres*, n'avoient point échappé à la sagacité de cet Auteur. On en peut dire autant de son second Ouvrage, intitulé *Stirpes rariores per Pannoniam et Austriam observatæ*. Mais dans ce dernier, les Graveurs qu'il a employés n'ont point imité comme les premiers, la finesse des dessins de l'Auteur. C'est sur-tout dans les *Plantæ Pannonicæ* que se trouvent une multitude de Plantes Alpines très-rares, dont il a donné le premier, les Figures et les descriptions, et dont il est réputé l'inventeur, quoique la plupart de ces plantes eussent été déjà dessinées, mais non publiées par *Gesner*. *L'Ecluse* retiré à Leyde où il avoit été appelé par les Curateurs de l'Université de cette ville pour y enseigner la Botanique, recueillit sur la fin de sa vie tous ses *Adversaria*, et les publia sous le titre de *Rariorum Plantarum Historia*.

Son zèle pour les progrès de la science s'étant toujours soutenu, il ajouta dans la suite deux opuscules, sous le titre de *Curæ posteriores*.

Nous devons encore à cet infatigable Naturaliste, des traductions libres de plusieurs Ouvrages sur les plantes et les animaux exotiques, comme 1.° les traités de *Garzias* sur les aromates, écrits en portugais ; 2.° le traité de *Monard* sur les médicamens d'Amérique, écrit en espagnol ; 3.° le traité d'*Acosta* sur plusieurs plantes exotiques, rédigé en espagnol. Il a publié avec des additions considérables quelques Ouvrages de *Belon*. Toutes ces traductions ont été réunies en un seul vol. in-folio, sous le titre de *Libri decem exoticorum*. Ils annoncent que *l'Ecluse* avoit des connoissances très-variées sur toutes les parties de l'Histoire naturelle, et que presque toutes les langues de l'Europe lui étoient familières.

COLUMN. *Ecphras.* Fabii Columnæ Lyncei minùs cognitarum rariorumque nostro cœlo orientium stirpium, Ecphrasis. *Romæ*, 1616 ; un vol. in-4°, dont la première partie contient 101 Planches sur cuivre, renfermant 155 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes ; en outre, une Planche à

la suite de la première partie, à la fin des *Observationes*, représentant l'*Hypomea Quamoclit*, L.; la seconde partie contient 29 Planches, renfermant 46 Figures.

Ejusd. Phyt. Fabii COLUMNÆ Lyncei Phytobazanos. *Florentiæ*, 1744; un vol. in-4°, avec 38 Planches sur cuivre, dont 33 relatives à la Botanique, renferment 35 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

(*Gesner*, *Columna* et *Camerarius* ont été les premiers Botanistes qui ont présenté isolées les parties de la fructification qui doivent servir à constituer les Genres.)

Inventeur, *Descripteur*, *et Dénominateur ancien.*

Fabius Columna peut être regardé, après *Gesner*, comme l'un des Botanistes dont les vues ont été les plus profondes. Il ne faut pas croire qu'il ait d'abord saisi l'ensemble de la science et découvert les vrais principes des dispositions méthodiques. Dans son premier Ouvrage, savoir dans son *Phytobazanos*, publié en 1592, il paroît n'avoir eu d'autre vue que de déterminer les véritables espèces signalées par les Anciens, spécialement par *Dioscoride*. Frappé d'une maladie affreuse (l'*épilepsie*) quoique non médecin, il crut pouvoir à force de recherches, découvrir les plantes indiquées par *Dioscoride*, comme pouvant le soulager ou le guérir de cette maladie. Le *Phu* de cet Auteur qui est la *Valeriana officinalis*, L. lui procura effectivement une guérison inattendue. Mais ce ne fut que dans ses derniers Ouvrages, savoir dans la seconde partie de son *Ecphrasis* qu'il insista sur la nécessité d'observer avec soin, même à la loupe, les différentes parties de la fructification qui pouvoient, selon lui, servir à coordonner d'après le véritable plan de la Nature, les végétaux entr'eux. Nous pouvons même dire, que ce n'est que dans la dernière partie de son *Ecphrasis* publiée en 1616, qu'il a constamment développé, décrit et fait graver les parties de la fructification, et ce ne fut que quelques années après qu'il a développé et publié ce dogme fondamental, dans ses notes sur l'Histoire naturelle de *Fernandez*.

COMM. *Præl.* Gaspari COMMELINI Præludia botanica. *Lugduni Batavorum*, 1703; un vol. in-4°, avec 33 Planches sur cuivre, renfermant 33 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

Ejusd. Bar. Gaspari COMMELINI Horti Medici Amstelodami Plantæ rariores et exoticæ. *Lugduni Batavorum*, 1715; un vol. in-4°, avec 48 Planches sur cuivre, renfermant 48 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

Inventeur, *Descripteur*, *et Dénominateur ancien.*

Cet Auteur, quoique non voyageur, a rendu de grands services à la Botanique, en décrivant et faisant graver plusieurs plantes rares cultivées dans les différens jardins de Hollande.

CORN. *Canad.* Jac. CORNUTI Canadensium Plantarum aliarumque nondùm editarum Historia. *Parisiis*, 1735; un vol. in-4°, avec 67 Planches sur cuivre, renfermant 67 Figures en noir, ombrées, bonnes et incomplètes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Cornutus a été le premier Botaniste qui ait fait connoître un certain nombre de plantes de l'Amérique Septentrionale: mais son Ouvrage a aujourd'hui peu de valeur, ayant été rédigé dans un temps où la Botanique n'avoit aucun principe fixe, aucun plan de recherches raisonné. Il est encore le premier qui ait ébauché la Flore des environs de Paris.

CRANTZ *Stirp. Aust.* Henrici-Joan. Nepom. CRANTZ Stirpium Austriacarum pars. 1 et 2, continens fasciculos sex, editio altera. *Viennæ*, 1769; deux vol. in-4°, avec 18 Planches sur cuivre, renfermant 50 Figures en noir, ombrées, bonnes et incomplètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur moderne.

Ce professeur de Vienne ayant voué à l'immortel *Linné* une haine implacable, n'a négligé aucune occasion d'attaquer ses dogmes fondamentaux; et tout en le critiquant avec amertume, il n'a rédigé ses *Institutiones Rei herbariæ*, et n'a proposé une prétendue méthode naturelle, que d'après les caractères génériques et spécifiques de *Linné*. Dans ses Fascicules, on ne peut disconvenir qu'il n'ait décrit et figuré plusieurs plantes très-rares et même quelques espèces nouvelles observées sur les Alpes des environs de Vienne. Ses Figures sont assez exactes, quoique gravées d'une manière dure; mais ses descriptions sont rédigées d'un style qui n'annonce que trop par son âpreté, le caractère de l'Auteur.

D

DALECH. *Lugd.* ou *Lugd. Hist.* Jacobi DALECHAMPII Historia generalis Plantarum. *Lugduni*, 1587; deux vol. in-folio, avec 2709 Figures sur bois, en noir, ombrées, médiocres, mauvaises et bonnes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Daléchamp sera toujours regardé comme un des plus savans Médecins et des plus laborieux Naturalistes de son temps. Ses notes sur *Pline* établissent la prodigieuse variété de ses connoissances. L'*Histoire des plantes de Lyon*, dont il a été le premier rédacteur, prouve qu'il avoit voyagé en véritable observateur sur toutes les hautes Alpes du Dauphiné et de la Savoie, et qu'il avoit parcouru avec soin tous les cantons qui avoisinent la ville de Lyon. Il est probable que *Daléchamp* détermina le célèbre et savant Imprimeur *Roville*, à faire rédiger une histoire complète de toutes les plantes connues de son temps. *G. Bauhin* a eu tort de reprocher à *Daléchamp* d'avoir fait un double emploi de près de 600

Figures. S'il avoit bien lu la Préface de *Roville*, il se seroit assuré que ce double emploi n'a point été l'effet de l'ignorance, mais que *Roville* voulant concentrer dans un seul Ouvrage toutes les Figures originales des différens Auteurs, il avoit dû faire regraver par exemple, celles de *Fuchs* au trait, et celles de *Matthiole* ombrées.

On trouve dans l'*Histoire des Plantes de Lyon*, plusieurs centuries d'espèces dont le nom est terminé par celui de *Daléchamp*. Ce sont en effet des espèces qu'il a le premier décrites, dessinées et fait graver, et parmi ces espèces il y en a plusieurs très-bien exprimées, telle que l'*Erinus Alpinus*, L. etc. Quelques-unes même qui n'ont été reconnues et ramenées à la disposition systématique que par les Botanistes très-modernes, telles que la *Berardia subacaulis*, Vil., la *Valeriana Saliunca*, Allion. D'autres très-rares que nous trouvons encore dans les lieux indiqués par *Daléchamp*, telles que la *Centaurea conifera*, L. l'*Antirrhinum bellidifolium*, L. etc. Et malgré les travaux des plus savans Naturalistes de nos provinces, nous trouvons encore dans ce grand Ouvrage de *Daléchamp*, plusieurs plantes décrites et figurées dont on n'a pu encore retrouver l'espèce qui avoit servi de modèle à cet Auteur.

DAMB. *Teint.* Recueil de procédés et d'expériences sur les teintures solides que nos Végétaux indigènes communiquent aux laines et aux lainages, par M. L. A. Dambourney. *Paris*, 1786; un vol. in-8.° sans Planches.

L'Ouvrage de *Dambourney* sur les Plantes qui peuvent fournir aux Teinturiers des couleurs différentes, renferme une multitude de nouvelles observations et de nouveaux résultats. Avant les travaux de cet estimable Auteur, on n'avoit essayé qu'un très-petit nombre de Plantes pour le bon et le faux teint. La Dissertation de *Linné*, intitulée *Plantæ tinctoriæ*, dont nous avons indiqué les résultats dans notre texte, n'est pas comparable aux recherches de *Dambourney*. Aussi avons-nous cru devoir, dans notre table sur les Plantes qui servent à la teinture, indiquer toutes celles que notre Auteur a manipulées, et qui peuvent fournir des résultats satisfaisans. Il paroît par les recherches de *Dambourney*, que toutes les Plantes peuvent fournir des parties colorantes, mais que la grande difficulté consiste à trouver un mordant pour les fixer.

DEL. *Flor. d'Auv.* Flore d'Auvergne ou recueil des Plantes de cette ci-devant province, par A. Delarbre. A *Clermont-Ferrand*, 1797 (an 5); un volume in-8.° sans Figures, renfermant 1684 Plantes, rangées par ordre alphabétique.

On doit à ce Botaniste le premier Catalogue des Plantes de l'Auvergne, dont les plus rares ne sont guères que des sous-Alpines. La Gentiane des neiges, qui ne croît que sur les Hautes-

Alpes, nous avoit fait juger que les montagnes de l'Auvergne ne s'élèvent guères qu'à 1000 toises, et ce n'est pas la première fois que nous avons pu évaluer à peu près la hauteur d'une montagne par les Plantes qu'elle produit.

DESF. *Flor. Atlant.* Renatus DESFONTAINES Flora Atlantica, *sive* Historia Plantarum quæ in Atlante, Agro Tuneto et Algeriensi crescunt. *Parisiis*, 1798; 2 vol. grand in-4°, avec... Planches sur cuivre, renfermant... Figures en noir, ombrées.....

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Quoique nous n'ayons point cité les Figures du *Flora Atlantica* de *Desfontaines*, que nous n'avons pu nous procurer, nous ne pouvons cependant nous dispenser d'indiquer aux Élèves un Ouvrage qui annonce dans son Auteur, non-seulement la plus grande sagacité, mais qui peut servir de modèle pour l'exactitude rigoureuse des descriptions et des figures. Les extraits des leçons de ce modeste professeur, que l'on trouve dans différens journaux, nous prouvent qu'il pouvoit seul présenter l'enseignement de la Botanique d'une manière philosophique. Sa logique est sévère et vraiment Linnéenne. Il insiste beaucoup dans ses leçons sur la connoissance des caractères génériques. *Desfontaines* pense avec raison que les Élèves qui possèdent bien une méthode, et qui connoissent un grand nombre de genres dans telle méthode donnée, pourront, en ayant bien saisi les caractères d'une, deux ou trois espèces de ces genres, déterminer facilement tous les autres genres et les espèces non démontrées. Les Amateurs de la science attendent avec impatience un Catalogue raisonné de toutes les Espèces qui sont cultivées dans le Jardin national de Paris. Si *Desfontaines* rédige ce Catalogue, comme on nous le fait espérer, on sera convaincu chez les étrangers, que le jardin de Paris est sans contredit celui qui offre le plus grand nombre de Genres et d'Espèces.

DILL. *Elth.* Horti Elthamensis Plantarum rariorum icones et nomina à Joh. Jac. DILLENIO. *Lugduni-Batavorum*, 1774; deux vol. in-fol. avec 324 Planches sur étain, renfermant 417 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

Ejusd. Hist. Musc. Historia Muscorum, auctore Joanne Jacobo DILLENIO. *Londini*, 1768; un vol. in-4.° avec 85 Planches sur étain, renfermant 586 Figures d'espèces en noir, ombrées, bonnes, et 1000 Figures en comprenant les variétés.

Systématique orthodoxe pour les Cryptogames; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Vaillant et *Dillen* ont été les premiers Botanistes qui aient fait connoître, d'après des principes sûrs, les Plantes cryptogamiques. Nous devons à *Dillen* quelques genres et plusieurs espèces nouvelles Européennes,

qu'il a publiés, soit dans les *Ephémérides de la Nature*, soit dans sa *Flora Ienensis*. Les nouveaux genres qu'il a constitués se trouvent dans l'*Appendix* de ce dernier Ouvrage devenu très-rare; mais *Lamarck* les a adoptés dans ses *Illustrationes*.

DODART *Mém.* Mémoires pour servir à l'Histoire Naturelle des Plantes, par DODART. *Amsterdam* et *Leipzig*, 1758; un volume in-4°, avec 38 Planches sur cuivre, renfermant 41 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

Collecteur, et Dénominateur ancien.

L'Ouvrage cité sous le nom de *Dodart*, ne lui appartient qu'en partie; il en a seulement rédigé l'introduction. Mais les descriptions des Plantes que présente ce volume, ont été dirigées par les différens Botanistes de l'Académie. On regrettera toujours que le premier plan de l'ancienne Académie n'ait pas été continué. Elle avoit projeté de publier une Histoire critique des Plantes et des Animaux: mais les guerres perpétuelles de *Louis XIV* ayant fait tarir les fonds destinés pour cette entreprise, nous ne possédons que des Essais exécutés d'après ce beau plan. Dans la collection que nous venons de citer, se trouvent plusieurs espèces rares nouvellement introduites dans les jardins d'Europe, aussi bien décrites que figurées, parmi lesquelles on observe quelques nouvelles espèces Européennes.

DOD. *Pempt.* Remberti Dodonæi Pemptades Stirpium, libri VI. *Antuerpiæ*, 1583; un vol. in-folio, avec 1328 Figures sur bois, en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

Inventeur, Descripteur, Collecteur, et Dénominateur ancien.

Quoique *Tournefort* ait eu raison d'avancer que *Dodoens* ne pouvoit être comparé pour la sagacité à son ami *l'Ecluse*, cependant la Botanique lui a de grandes obligations comme Collecteur et Inventeur. Quoique ses descriptions soient peu détaillées et par conséquent le plus souvent incomplètes, nous lui devons quelques centuries de Plantes, dont il a le premier publié de très-bonnes Figures. Comme *l'Ecluse*, il avoit d'abord rédigé différens petits Ouvrages in-8.° Tels sont ses *Frugum Historia*, 1552; *Florum et Purgantium Historia; Stirpium Historia*, en flamand, traduite par *l'Ecluse*, 1553. Comme *l'Ecluse*, il rassembla tout ce qu'il avoit donné dans ses différens Ouvrages, et les publia in-folio sous le nom de *Pemptades*, en 1583. Cet Ouvrage qui est le seul cité, offre toutes les bonnes Figures des précédens et plusieurs nouvelles espèces, sur-tout des Plantes marécageuses. Comme *Lobel* et par la même raison, il s'appropria dans cet Ouvrage une partie des Figures de *l'Ecluse*. Il ne faut pas croire, comme la plupart des Auteurs qui l'ont cité, qu'il présente la Figure de toutes les Plantes qu'il a décrites. Souvent à la suite de l'espèce figurée, il propose sans Figures, par un

simple signalement, quelques espèces congénères. En général, cet Ouvrage est écrit d'un style pur, et doit être regardé comme une des principales sources de l'histoire des Plantes.

DUHAM. *Arb.* Traité des Arbres et Arbustes qui se cultivent en France en pleine terre, par DUHAMEL DU MONCEAU. *Paris*, 1755; deux volum. in-4°, avec 1.° 193 Planches sur cuivre, représentant 193 Figures de genres, dont 137 copiées sur ceux de *Tournefort*, et 56 propres à *Duhamel* ou copiées des autres Auteurs; 2.° avec 250 Planches sur bois, renfermant 281 Figures, médiocres et bonnes, sur lesquelles 156 sont tirées des grandes Figures de *Matthiole*; les autres appartiennent à *Duhamel*, et quelques-unes sont dessinées d'après nature.

Systématique orthodoxe et hétérodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Cet Auteur est plus recommandable par son anatomie physiologique des Végétaux, que comme Botaniste praticien. Son *Traité des Arbres et Arbustes* sera cependant toujours recherché, parce qu'il offre des détails très-intéressans sur les végétaux naturalisés en France ou qui y croissent spontanément. Une partie des Figures qu'il a employées sont celles de la grande édition de *Matthiole*, dont il s'étoit procuré par hasard une partie des bois. Les vignettes qui offrent les caractères génériques, sont en grande partie calquées sur celles de *Tournefort*; mais il en a ajouté plusieurs pour signaler les nouveaux genres inconnus au Botaniste François. Nous lui devons encore des Figures exactes de plusieurs Arbrisseaux nouvellement introduits dans nos jardins.

DURANDE *Flor. de Bourg.* Flore de Bourgogne, *ou* Catalogue des Plantes naturelles à cette province, par DURANDE. *Dijon*, 1782; deux vol. in-8°, sans Figures, renfermant 1284 Plantes.

Systématique orthodoxe.

Cet Auteur a cherché à combiner la méthode naturelle avec l'examen de la corolle considérée comme monopétale, polypétale, régulière et irrégulière. Cette méthode mixte est bien tracée, et peut faciliter aux Élèves la connoissance des Plantes. Comme Floriste, *Durande* ne nous paroît pas toujours exact dans la détermination de ses espèces. Il en indique plusieurs que l'on a vainement cherchées depuis dans cette Province. La partie de son Ouvrage qui traite des usages et des vertus des Plantes, peut être regardé comme une bonne compilation.

F.

* FEUIL. *Per.* Histoire des Plantes médicinales qui sont le plus en usage aux Royaumes de l'Amérique Méridionale du Pérou et du Chili, imprimé à la suite des tomes 2 et 3 du Journal des observations Physiques, Mathématiques et Botaniques, par le père FEUILLÉE, minime. *Paris*, 1714 et 1715; trois vol. in-4°, avec 100 Planches sur cuivre,

renfermant 145 Figures, bonnes et presque toutes incomplètes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Quoique le père *Feuillée* soit plus recommandable par ses connoissances physiques et astronomiques, cependant son Ouvrage mérite l'attention des Botanistes, comme présentant de très-bonnes Figures de Plantes Américaines, qui presque toutes devroient être connues des Botanistes Européens, par leurs propriétés médicinales.

Observ. L'ouvrage de *Feuillée* ne nous étant parvenu qu'après l'impression des deux premiers volumes de notre *Système des Plantes*, nous prévenons que les citations de cet Auteur que nous avons faites d'après *Reichard*, présentent des erreurs, comme celles de tome I, au lieu de tome II ou III, vû que le premier volume de *Feuillée* ne renferme point de Planches.

*FORSK. *Ægyp.* Flora Ægyptiaco-Arabica *sive* Descriptiones Plantarum quas per Ægyptum inferiorem et Arabiam felicem detexit, illustravit, Petrus FORSKAL. *Hanniæ*, 1775; un volum. in-4°, avec 43 Planches sur cuivre, dont 20 relatives à la Botanique, renferment 27 Figures en noir, ombrées, bonnes, dont deux complètes.

Ouvrage posthume, publié par *Carster Niebuhr.*

Systématique Orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Forskal est un des principaux Naturalistes de la fameuse expédition conseillée par *Linné*, et qui fut si malheureuse; presque tous ceux qui la composoient périrent misérablement. L'Ouvrage posthume de *Forskal* offre une foule d'observations neuves, non-seulement sur le Règne végétal, mais encore sur les Animaux. Il présente, outre plusieurs Catalogues de Plantes des pays qu'il a parcourus, des descriptions détaillées de plusieurs espèces neuves, et rédigées d'après les principes et la nomenclature de *Linné.*

FUCHS. *Hist.* Leonardi FUCHSII Historia Plantarum Germaniæ. *Basileæ*, 1543; un vol. in-folio, avec 511 Figures sur bois, au trait ou sans ombre, médiocres et bonnes.

Inventeur et Descripteur.

L'Ouvrage de *Fuchs* a été publié sous deux formats, in-folio et in-8.° Les éditions in-8° sont nombreuses. *Fuchs*, après *Brunsfels*, doit être regardé comme un des fondateurs de la Botanique parmi les modernes. Son texte ne mérite pas de fixer notre attention, n'offrant qu'une compilation des noms des anciens, le plus souvent mal appliqués à des plantes du Nord, dont les pères de l'art n'ont eu aucune connoissance. Mais son Ouvrage est précieux par les Figures qui la plupart sont encore aujourd'hui aussi exactes que celles des plus modernes. Comme elles sont dessinées d'après un module étendu, elles présentent plus distinctement la figure des Fleurs que

celles de ses successeurs, qui ont adopté un module beaucoup plus petit.

G.

GARID. *Aix* ou *Prov.* Histoire des Plantes qui naissent aux environs d'Aix et dans plusieurs autres endroits de la Provence, par GARIDEL. A *Aix*, 1715; un vol. in-folio, avec 100 Planches sur cuivre, renfermant 99 Figures, en noir, ombrées, médiocres et bonnes, (une Planche représente le *Kermès* dans ses différens états), et environ 1497 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Ouvrage intéressant, pour la notice historique et critique des Auteurs, qui est si bien rédigée qu'*Adanson* en a tiré plusieurs articles, notamment celui de *Gesner*; mais foible pour la synonymie, n'offrant presque aucune observation neuve, et indiquant un très-petit nombre d'espèces nouvelles, dans un pays qui en a offert un si grand nombre au savant *Gérard*.

GÆRTN. *De fruct.* Josephus GÆRTNER de fructibus et seminibus Plantarum. *Stutgardiæ*, 1788; trois vol. in-4°, avec 180 Planches sur cuivre, renfermant 1377 Figures, en noir, ombrées, bonnes, dont 989 Figures de genres.

Systématique orthodoxe; Inventeur, et Dénominateur nouveau.

L'Ouvrage de *Gœrtner* considéré dans son ensemble et examiné dans ses détails, doit être regardé en Botanique comme une des meilleures productions de ce siècle. On peut même le comparer à l'Ouvrage le plus parfait dans ce genre, savoir; aux *Institutiones rei herbariæ* de *Tournefort*. L'Auteur paroît avoir presque toujours travaillé d'après la nature vivante; aussi s'apperçoit-on pour chaque genre, tant dans ses descriptions que dans le détail de ses Figures caractérisques, qu'il n'a rien omis d'essentiel pour la formation des caractères naturels, relativement aux semences et aux enveloppes dans chaque genre. Il seroit même difficile de nombrer la multitude d'observations neuves que cet Ouvrage précieux peut offrir aux Botanistes les plus exercés. Les genres que l'on regardoit, d'après le travail de *Tournefort* et de *Linné*, comme parfaitement établis, ont cependant offert à notre Auteur des attributs nouveaux, sur-tout relativement à l'enveloppe des semences (Périsperme) et au pédicule ou cordon ombilical qui les lie, soit avec les diaphragmes des capsules, des baies, etc., soit avec le réceptacle, lorsque ce sont des semences nues. Tous ces faits ont suggéré à l'Auteur une nouvelle distribution méthodique des genres, rédigée d'après les fruits. Nous l'avons énoncé comme Inventeur, parce qu'il ne s'est pas contenté d'enrichir par des observations et des Figures neuves, les genres déjà constitués par *Tournefort*, *Linné* et autres, mais parce qu'il en a caractérisé plusieurs d'absolument nouveaux d'après ses propres ob-

servations ; et ce qui confirme la haute idée que nous avons du travail de *Gærtner*, c'est que tous ses contemporains qui se sont occupés de l'illustration des genres, ont cru devoir copier ses caractères génériques relativement aux fruits et aux semences. Si nous n'avons pas cité les Figures de *Gærtner*, c'est que nous avons vérifié qu'elles ont toutes été copiées, de même que celles de *Tournefort*, *Dillen*, etc. dans les *Illustrations des genres*, exécutées par les soins du professeur *Lamarck*. La cherté et la rareté du prix de l'ouvrage de *Gærtner*, nous ont déterminés à citer en faveur des Élèves un Ouvrage plus répandu et plus intelligible pour eux. Nous observerons que *Gærtner* a toujours indiqué, décrit et fait graver, non-seulement l'espèce d'après laquelle il a constitué chaque genre, mais encore plusieurs espèces de chaque genre. Il eût été à desirer que *Tournefort*, *Linné*, etc. eussent eu la même idée qui est très-philosophique.

GER. *Prov.* Ludovici GERARDI Flora Gallo-Provincialis. *Paris*, 1761 ; un volum. in-8°, avec 19 Planches sur cuivre, renfermant 25 Figures, en noir, ombrées, bonnes et incomplètes.

Systématique orthodoxe ; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

L'Ouvrage de *Gérard* sera toujours recherché, parce qu'il a présenté le premier, le plan de la méthode naturelle de *Bernard de Jussieu*. D'ailleurs, sa Flore nous offre quelques espèces neuves, dont les figures et les descriptions annoncent un Botaniste très-exercé.

* GESN. *Oper. Bot.* Conradi GESNERI Opera Botanica. *Norimbergæ*, 1751 ; un vol. in-fol. avec 1.° vingt-deux Planches, sur bois, renfermant 198 Figures, en noir, ombrées, bonnes et en grande partie complètes ; 2.° vingt Planches sur cuivre, renfermant 175 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes ; 3.° quinze Planches sur cuivre, renfermant 50 Figures coloriées, bonnes et en partie complètes. (Ouvrage posthume, publié par Christophe SCHMIDEL.)

Inventeur et Descripteur.

Les deux ouvrages de *Gesner* qu'il a publiés de son vivant, savoir ; *de Lunariis et Noctulucentibus*, avec 5 Figures ; *de Hortis Germaniæ*, avec 5 Figures, avoient fait connoître sa manière originale de travailler en Botanique. Il avoit déjà pressenti dès 1550, la nécessité de décrire avec soin et de faire figurer les parties de la fructification pour la coordination des genres et des espèces ; dogme qu'il a développé par une assertion positive dans une de ses lettres publiées après sa mort. Mais, pour juger l'étendue du travail de *Gesner* en Botanique, il faut consulter avec soin l'*Epitomé* de *Camérarius*, dont presque toutes les Figures avoient été exécutées sous la direction de *Gesner*, et dont un grand nombre présente les parties de la fructification toutes dessinées séparément. On s'en convaincra

encore plus, en parcourant cette multitude considérable de Figures gravées sur bois, et plusieurs Figures coloriées publiées en 1751 par *Schmidel*. Il résulte, après la savante Table rédigée par cet éditeur, que *Gesner* a laissé à sa mort dans ses porte-feuilles, près de 2000 Figures exécutées d'après son plan. Aussi *de Haller* qui nous a fourni de très-grands détails sur les recherches de *Gesner* comme Naturaliste, soit dans son *Methodus studii Medici*, soit dans sa *Bibliotheca Botanica*, a-t-il eu raison de conclure que si *Gesner* eût vécu assez longtemps pour pouvoir publier ses Ouvrages de Botanique, il auroit enlevé aux plus célèbres de ses successeurs, même à *l'Ecluse*, une grande partie de leurs découvertes.

GILIB. *Démonst.* Démonstrations élémentaires de Botanique, 4.e édition, partie des Figures. *Lyon*, 1796; deux vol. in-4°, avec 282 Planches sur cuivre, renfermant 313 Figures en noir, ombrées, mauvaises, médiocres et bonnes.

Le plus grand nombre des Figures de *Belleval;* quelques-unes de *Loësel*, et quelques-unes de *Gilibert* d'après nature.

Id. Fl. d'Europ. Histoire des Plantes d'Europe *ou* Elémens de Botanique-pratique, par Jean-Emmanuel GILIBERT. *Lyon*, 1798 (an 6); deux vol. in-8°, avec 656 Figures sur bois, en noir, ombrées, et une Figure sur cuivre en noir, ombrée. La plupart des Figures tirées de *Matthiole*, quelques-unes de *Camerarius* réduites.

Systématique orthodoxe, et Dénominateur nouveau.

Dans la première partie se trouve la véritable *Flore du Lyonnois;* la seconde présente l'énumération des *Plantes de Lithuanie*, disposées d'après la méthode mixte de l'Auteur. On y trouve plusieurs observations sur les Plantes rares de Lithuanie, et même sur les Plantes Européennes communes, qu'on chercheroit en vain dans les Ouvrages des autres Botanistes.

Cet Auteur, qui est du très-petit nombre des Médecins qui ont eu le courage de mener de front l'exercice de leur profession et les recherches d'Histoire Naturelle, est le fondateur du Jardin de Botanique de l'université de Wilna, ce qui a été récemment reconnu par l'administration de cette université qui a nommé le D.r *Gilibert* professeur honoraire d'Histoire Naturelle, en reconnoissance des services qu'il lui a rendus pendant plusieurs années. Il est aussi fondateur du Jardin de Botanique de Lyon, qui par ses soins et ceux de ses Coopérateurs, offre aujourd'hui plus de 4000 espèces de Plantes. Sera-t-on donc surpris que ce Savant ait obtenu, après trente ans de professorat, la seule récompense réservée aux Botanistes? Son nom a été attaché en même temps à deux Genres; l'un constitué par le célèbre *Gmelin* dans son *Systema Naturæ*, et l'autre par les Auteurs de la Flore du Péron, *Ruiz*

et *Pavon*, professeurs au Jardin Botanique de Madrid.

GLEDIST. *Fung.* D. Joan. Gottlieb GLEDISTCH Methodus Fungorum. *Berolini*, 1753; un volume in-8°, avec six Planches sur cuivre, renfermant 129 Figures en noir, ombrées, bonnes.

Systématique orthodoxe; Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Gleditsch directeur du Jardin de Botanique de Berlin, et un des membres les plus laborieux de l'Académie de cette ville, s'est rendu recommandable par quelques Ouvrages et par plusieurs Mémoires. Son système de Botanique devient très-utile pour ceux qui veulent connoître les attributs des étamines et des pistils relativement à leur insertion. Dans son *Traité* sur les Champignons de Brandebourg, *Gleditsch* a cru devoir augmenter le nombre des genres de *Linné* et encore plus celui des espèces. Ses phrases diagnostiques sont claires, et portent sur des attributs véritablement caractéristiques. On trouve dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, quelques Essais bien rédigés qui offrent des observations neuves sur ce que nous appelons la *Botanique appliquée*, sur-tout relativement à l'économie rurale et domestique.

* GMEL. *Sibir.* Flora Sibirica *sive* Historia Plantarum Sibiriæ, auctore J. Georgio GMELIN. *Petropoli*, 1768; quatre vol. in-4°, avec 300 Planches sur cuivre, renfermant 425 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes. Les Planches des trois premiers volumes, format in-fol.; celles du quatrième, in-4.°

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Gmelin, dans sa *Flore de Sibérie*, a adopté la disposition méthodique de *Van-Royen*, ou une espèce de méthode naturelle. Quoique ses descriptions ne soient pas tracées d'après les vues et le plan lumineux de *Linné*, cependant ce Livre offre un si grand nombre d'espèces neuves et d'observations intéressantes sur des plantes déjà connues, qu'on peut le regarder comme un des Ouvrages qui ont le plus contribué aux progrès de la science.

GMEL. *Syst. Nat.* Caroli *Linnæi* Systema Naturæ, per tria Regna Naturæ, secundùm classes, ordines, genera et species, curâ J. Frid. GMELIN (Ed. 14). *Lugduni*, 1796; la partie Botanique, deux vol. in-8°, sans Figures, renfermant 2070 genres et 16589 espèces.

Systématique orthodoxe, et Dénominateur nouveau.

L'Ouvrage de *Gmelin* suppose, pour la rédaction, une si prodigieuse variété de connoissances en Histoire Naturelle, et un travail si opiniâtre, vû la rapidité avec laquelle cet Ouvrage a été exécuté, que l'on doit considérer l'Auteur comme un des plus savans Naturalistes de nos jours. On lui a reproché quelques inexactitudes dans la citation des synonymes et quel-

ques doubles emplois dans la disposition des espèces ; erreurs qu'on pouvoit excuser, si on considère l'étendue de son travail, vû l'impossibilité absolue à quelque Naturaliste que ce soit, de coordonner une si effrayante multitude de productions naturelles, sans commettre quelques fautes. Le grand *Linné* avoit déja annoncé cette vérité dans une lettre écrite à *Haller*. Le reproche que les sectateurs passionnés de *Linné* ont fait à *Gmelin*, d'avoir altéré le système de cet Auteur, en adoptant toutes les vues de *Thunberg*, est peut-être mieux fondé. Mais si on considère l'ensemble de son travail, sur la Zoologie et la Minéralogie, et même son Tableau du Règne Végétal, on ne pourra disconvenir que ce Savant n'ait rendu un service important à la science, en coordonnant cette multitude de nouveaux genres et de nouvelles espèces reconnues depuis *Linné*.

GOUAN *Hort.* Antonii GOUAN Hortus regius Monspeliensis *Lugduni*, 1762; un vol. in-8°, avec 3 Planches sur cuivre, renfermant 4 Figures en noir, ombrées, exactes, et 1014 Plantes rangées suivant le système de *Linné*, dans le nombre desquelles ne sont pas comprises les Variétés.

Ejus. Flor. Monsp. Antonii GOUAN Flora Monspeliaca. *Lugduni*, 1765; un vol. in-8°, avec 3 Planches sur cuivre, renfermant 3 Figures en noir, ombrées, exactes.

Ejusd. Illust. Bot. Antonii GOUAN Illustrationes et Observationes Botanicæ. *Tiguri*, 1773; un vol. in-folio avec 26 Planches sur cuivre, renfermant 54 Figures en noir, ombrées, bonnes, et 309 Plantes rangées selon le système de *Linné*. (Un des Ouvrages de Botanique le mieux fait du siècle dernier. Descriptions caractéristiques, discussions profondes des synonymes, savans rapprochemens des nouvelles espèces Pyrénéennes avec les espèces connues de *Linné*.)

Ejusd. Herb. Herborisations des environs de Montpellier *ou* Guide Botanique à l'usage des Élèves de l'École de santé; Ouvrage destiné à servir de supplément à la *Flora Monspeliaca*, par Antoine GOUAN. A Montpellier, 4.e année; un vol. in-8°, sans Fig. renfermant 301 Plantes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Ce savant Professeur s'étoit d'abord annoncé par deux bons Ouvrages, l'*Hortus Regius* et la *Flora Monspeliaca*. Dans le premier, il a non-seulement facilité aux Élèves la connoissance des genres par les caractères secondaires qui, comme l'avoit déjà annoncé *Ray*, sont absolument nécessaires pour la coordination des méthodes naturelles, mais encore par la description et l'indication caractéristiques de plusieurs espèces qu'il avoit découvertes en Languedoc, et qui avoient échappées à *Magnol* et à *Sauvages*. On trouve même la description ou le dessin de quelques nouvelles espèces exotiques, comme la *Ne-*

lana prostrata, L. qu'il avoit ramenée au genre des *Atropa*. Dans sa *Flore* disposée rigoureusement suivant la méthode de *Ludwig*, il nous paroit avoir rendu un grand service à la science, en faisant connoître à dessein que toutes les méthodes artificielles suivies avec rigueur, rompent les affinités naturelles les plus prononcées, comme dans les familles des Ombelliféres, dans les Caryophyllées, les Polyandres, les Icosandres, etc. Dans cette Flore, il a encore considérablement augmenté le nombre des espèces de nos Provinces Méridionales. Les additions sont encore plus fréquentes dans un Ouvrage publié depuis quelques années, intitulé: *Herborisations des environs de Montpellier*, dans lequel il a confirmé la vérité de l'assertion de *Latourette*, qui prétendoit avec raison que les Cryptogames des Provinces Méridionales étoient beaucoup plus nombreuses qu'on ne l'avoit d'abord pensé.

Mais ce qui rend sur-tout notre Professeur recommandable, c'est d'avoir enseigné sans altération, pendant quarante ans, les dogmes inébranlables et lumineux de *Linné*, et d'avoir formé, d'après ses dogmes, plusieurs Botanistes célèbres qui se glorifieront toujours de le reconnoître pour maître.

H.

HALL. *Hist.* Alberti V. HALLER Historia Stirpium indigenarum Helvetiæ. *Bernæ*, 1768; trois vol. in-fol. avec 48 Planches sur cuivre, renfermant 116 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes, parmi lesquelles se trouvent toutes les *Orchidées* de Suisse, dessinées de grandeur naturelle, avec les caractères isolés de la fructification de chaque espèce.

Ejusd. Opusc. Alberti V. HALLER Opuscula Botanica. *Gottingæ*, 1749; un vol. in-8°, avec 5 Planches sur cuivre, renfermant 15 Figures en noir, ombrées, bonnes. Cet Ouvrage offre une monographie précieuse du genre *Allium*, des descriptions, une synonymie complète, et d'excellentes Figures des espèces rares et nouvelles.

Ejusd. ad Scheuchz. Appendix synonyma ad Scheuchzeri gramina. *Bernæ*, 1772; un volume in-4.° (Descriptions de plusieurs espèces de Graminées inconnues à *Scheuchzer*, et discussions critiques des genres des Graminées de *Linné*, comparés à ceux de *Haller*.)

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

De Haller ne peut être comparé, pour la variété des connoissances et pour la profonde érudition, qu'à *Gesner*. Si on le considère comme Anatomiste et Physiologiste, le nombre de ses découvertes et de ses observations lui assurent une des premières places. Comme Botaniste, on ne sauroit trop admirer ses discussions critiques, comparables à celles de *J. Bauhin*. Ses descriptions, les seules peut-être qui soient caractéristiques, ses

phrases qui présentent un diagnostique si facile à saisir, le jugement sain qu'il porte toujours sur la formation des genres, sur le rapprochement des espèces et des variétés, et sur-tout pour l'évaluation des propriétés des Plantes dans la médecine et les arts. Pour se former une idée de l'étendue des connoissances botaniques de *Haller*, il faut avoir présent à l'esprit tous les Ouvrages qu'il a publiés sur cette science. Dans son *Hortus Goettingensis*, dans son *Enumeratio* et dans son *Historia*, il a tracé d'une main hardie le plan d'une méthode naturelle. Dans ses *Itinera Alpina* et dans sa dissertation intitulée *Allium*, de même que dans son *Enumeratio*, on le voit lutter avec avantage pour la synonymie contre les frères *J.* et *G. Bauhin*. La section de son *Historia* qui comprend la famille des *Orchidées*, est un des Ouvrages les plus savans et les mieux faits que nous connoissions, soit pour la discussion des synonymes, soit pour les descriptions, soit pour les caractères minutieux tirés des différentes parties de la fructification.

On ne peut faire à ce grand homme que deux reproches en Botanique. Le premier, c'est celui de n'avoir pas été assez uniforme dans l'emploi des termes techniques, se servant par exemple du mot *Pétiole* pour exprimer les supports de la fleur et de la feuille. Le second, de s'être opiniâtré à récuser les noms triviaux de *Linné*, reconnus de son temps par tous les Botanistes de l'Europe, comme absolument nécessaires pour simplifier et accélérer la correspondance entr'eux. On pourroit encore déplorer l'espèce de jalousie qui a régné pendant plus de vingt ans entre ces deux hommes célèbres, si *de Haller*, dans sa *Bibliotheca Botanica*, n'avoit pas rendu une justice éclatante à *Linné*, et n'avoit pas jugé ses différens Ouvrages avec impartialité.

C'est sur-tout dans ce dernier Ouvrage, (sa *Bibliotheca Botanica*) que *de Haller* a déployé la plus vaste érudition. Il avoit déjà donné une analyse des principaux Ouvrages de Botanique dans son *Methodus studii medici* et au commencement de son *Enumeratio*. Mais dans sa *Bibliothèque Botanique*, il a beaucoup étendu son plan, faisant non-seulement connoître les Ouvrages des Botanistes proprement dits, mais encore ceux des Agronomes et des Médecins qui ont évalué les propriétés des Végétaux. En général, on peut assurer que les jugemens que *de Haller* porte sur chaque Auteur, sont énoncés avec une rare impartialité. Il rend justice à ses ennemis comme à ses amis. On auroit peut-être desiré qu'en énonçant les Plantes découvertes par chaque Auteur, il les eût toujours signalées par les noms Linnéens, ce qui abrégeant beaucoup la diction, lui auroit donné la facilité d'indiquer les espèces que chaque Auteur a le premier fait connoître.

HASSEL. *It.* HASSELQUIST Iter Palestinum. *Holmiæ*, 1757; un vol.

vol. in-8°, sans Figures. Ouvrage traduit en françois par extrait.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Hasselquist, un des meilleurs Élèves de *Linné*, fut chargé par ce grand homme de voyager, en nouvel Observateur, dans toutes les contrées que *Tournefort* avoit visitées et devoit parcourir. Les isles de l'Archipel et toute l'Égypte entrèrent dans le plan de ses excursions. Les Mémoires de l'académie de Stockholm et surtout son Itinéraire publié en suédois par *Linné*, et traduit en françois, prouve qu'il n'avoit négligé aucune branche de l'Histoire Naturelle. Les Animaux rares de ces contrées, les Drogues médicinales, tous les Végétaux, avoient successivement fixé son attention, et presque tous lui avoient suggéré des vues nouvelles. Ses descriptions des Plantes et des Animaux rares, sont toutes Linnéennes. Nous lui devons des Notices sur plusieurs Plantes médicinales inconnues avant lui. Aussi *de Haller* a-t-il eu raison, après avoir donné une courte analyse de son *Voyage en Palestine*, d'ajouter : *Egregius liber, et ex quo plurima discas. Hasselquist* fut victime de son zèle. Emporté à Smyrne par la phtysie pulmonaire, il a grossi le catalogue des martyrs de la Botanique.

HERM. *Parad.* Pauli HERMANNI Paradisus Batavus. *Lugduni-Batavorum*, 1698; un vol. in-4°, avec 111 Planches sur cuivre, renfermant 114 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes; et environ 326 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Si *Hermann* qui avoit beaucoup voyagé sur-tout en Afrique, avoit publié lui-même toutes les Plantes dont il avoit fait les dessins ou les descriptions, ses Ouvrages seroient peut-être les plus considérables et les plus précieux; mais nous ne possédons presque de cet Auteur que des Essais qui annoncent une grande exactitude dans les descriptions et une grande vérité dans ses dessins. Comme Méthodiste, il avoit rectifié les plans de recherches de *Morison*, surtout relativement à la nature des fruits. Aussi sa méthode porte-t-elle spécialement sur cette partie de la fructification. Elle a servi en grande partie à celle de *Boerrhaave*, un de ses successeurs dans la chaire Botanique de Leyde. *Hermann* étoit si passionné pour la science, qu'il fit les plus grands efforts pour attirer en Hollande l'immortel *Tournefort*. Si nous le considérons comme Médecin, cherchant à déterminer les propriétés des Plantes, son *Cynosura materiæ medicæ* est le premier Ouvrage où l'on ait distribué les Plantes relativement à leurs vertus, suivant les principes chimiques qui les constituent. Mais à cette époque la chimie n'étoit pas assez avancée pour offrir une semblable distribution.

HILL. *Hort. Kew.* Hortus Kewensis, sistens Herbas exoticas indigenasque rariores etc. auctore Joanne HILL. *Londini*, 1768; un vol. in-8°. avec 20 Planches sur cuivre, renfermant 20 Figures en noir, ombrées, bonnes et incomplètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Hill est de tous les Botanistes celui qui a publié le plus grand nombre d'Ouvrages et les plus considérables. Mais les deux principaux n'ont point été achevés, savoir: son *Histoire générale des Végétaux*, et sa *Flora Britannica*. Cet Auteur a dessiné lui-même la plupart des espèces qu'il a publiées. Il s'étoit formé un système mixte, combiné d'après ceux de *Tournefort* et de *Rivin*. Dans son grand Ouvrage publié en anglois, la première Planche de chaque genre offre toutes les parties de la fructification isolées, et deux, trois ou quatre Figures des espèces dans chaque Planche. C'est la collection de Figures la plus nombreuse pour les classes, qu'il a achevée. Le plus souvent cet Auteur a adopté les genres et les espèces de *Linné*, excepté cependant dans les Syngénèses, surtout pour la famille des *Chardons*, dans laquelle il a constitué plusieurs genres particuliers.

Quoique ce grand Ouvrage de *Hill* offre plusieurs défauts, soit dans la rédaction du texte, soit relativement aux Figures; cependant il faut convenir avec *de Haller* que cette collection est précieuse, et qu'une multitude de ses Figures représentent avec vérité les espèces qu'il a énoncées. On peut citer en preuve les *Gentianes*. Sa *Flora Britannica* doit être regardée comme un extrait de son grand Ouvrage anglois: ce sont les mêmes Figures réduites, et les mêmes descriptions écrites en latin.

HOFFM. *Salic.* Historia Salicum Iconibus illustrata, à Georgio-Francisco HOFFMANN, fasciculi IV. *Lipsiæ*, 1787; un vol. in-folio, avec 30 Planches sur cuivre, renfermant 64 Figures en noir ou enluminées, bonnes et complètes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Cet Ouvrage d'*Hoffmann* et ses recherches sur les *Lichens* lui ont mérité la place de professeur de Botanique dans l'université de Gottingue. Sa monographie sur les *Saules* avoit été desirée par *Linné*, qui dans une lettre avoit engagé notre célèbre *Gouan* à s'en occuper. Ce Botaniste en avoit effectivement recueilli tous les matériaux; *Linné* et *de Haller* avoient senti et annoncé la difficulté qu'offroient les espèces et les variétés des *Saules* pour une détermination rigoureuse. Ces difficultés proviennent sur-tout de la différente grandeur et des différentes formes qu'affectent les feuilles dans les individus mâles et femelles et suivant leurs différens âges. Les chatons mâles et femelles diffèrent aussi considérablement, suivant le temps de leur développement. Aussi le travail d'*Hoffmann* est-il précieux en ce qu'il a décrit

et dessiné toutes les espèces qu'il a publiées, et leurs parties, suivant les différentes époques de leur développement.

Comme Cryptogamiste, nous devons à ce savant Botaniste plusieurs espèces neuves de *Lichens* et des Figures admirables d'une foule d'espèces déjà connues. Sur-tout il a déterminé, par une suite d'expériences très-précieuses, les propriétés de ces substances, auparavant si négligées, pour la teinture. Son mémoire *de Usu Lichenum* remporta le prix à l'académie de Lyon, et cette Compagnie crut devoir le publier avec une Analyse en françois, rédigée par son directeur le professeur *Gilibert*.

J.

* JACQ. *Aust.* Nicolaï-Josephi JACQUIN Flora Austriaca. *Vindobonæ*; 1771; cinq vol. in-folio, avec 500 Planches sur cuivre, renfermant 500 Figures enluminées, bonnes; et autant de Plantes décrites sans ordre.

* *Ejusd. Hort.* Nicolaï Josephi JACQUIN Hortus Vindobonensis; quatre vol. in-folio, avec 400 Planches sur cuivre, renfermant 400 Figures enluminées, bonnes et complètes; et 400 Plantes décrites sans ordre.

* *Ejusd. Obs.* Nicolaï-Josephi JACQUIN Observationum Botanicarum, Iconibus ab Auctore delineatis, illustratarum, partes IV. *Vindobonæ*, 1764; un volume in-folio avec 100 Planches sur cuivre, renfermant 117 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

* *Ejusd. Misc.* Nicolaï-Josephi JACQUIN Miscellanea Austriaca, ad Botanicam, Chimiam, et Historiam Naturalem spectantia. *Vindobonæ*, 1778; deux vol. in-4°, avec 43 Planches sur cuivre, renfermant 160 Figures coloriées, bonnes et en partie complètes.

Ejusd. Amer. Nicolaï-Josephi JACQUIN selectarum Stirpium Americanarum Historia; un vol. in-folio, avec 183 Planches sur cuivre, renfermant 215 Figures en noir, ombrées, exactes, mais mal gravées.

Systématique ortodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Le célèbre *Jacquin* s'étoit déjà fait connoître, étant très-jeune, par des Ouvrages considérables qui annonçoient un Botaniste très-exercé. Ayant été envoyé par l'Empereur en Amérique, il publia à son retour, non-seulement la description très-exacte des nouvelles Plantes qu'il avoit signalées, mais encore leurs Figures dessinées par lui, mais assez mal exécutées par les Graveurs qu'il avoit été obligé d'employer. Sa *Flora Vindobonensis* et ses *Observationes Botanicæ*, qui offrent plusieurs espèces neuves exotiques et un grand nombre d'indigènes observées sur les Alpes de Vienne, soit en Hongrie, présentent la même vérité dans les dessins et la même exactitude pour les descriptions. Mais ces Ouvrages ne doivent être regardés aujourd'hui que comme

les préludes de recherches plus importantes. En effet, dès 1770 il entreprit de publier, par centuries, toutes les Plantes rares cultivées dans les jardins de Vienne, sous le titre d'*Hortus Vindobonensis ;* et celles de la Flore d'Autriche, sous le titre de *Flora Austriaca.* Ces deux Ouvrages qui offrent neuf centuries, sont sans contredit un des plus grands monumens que nous connoissions en Botanique, soit pour l'exactitude du dessin, soit pour la teinte des couleurs, soit enfin pour la vérité et la précision des descriptions. Nous devons encore à cet infatigable Naturaliste plusieurs Opuscules Botaniques rédigés d'après son *Hortus* et sa *Flora*, et un Ouvrage aussi considérable, plus magnifique encore, des Plantes rares qui ont été cultivées dans le Jardin impérial de Schœnbrunn. Enfin une 2e édition de ses *Plantæ Americanæ* exécutée d'après ses dessins primitifs, dont les figures sont coloriées avec la plus grande exactitude.

* JONST. *Plant.* Joannis JONSTONI Historiæ Naturalis de Arboribus et Plantis libri decem. *Francofurti ad Mœnum*, 1768, deux vol. in-folio, avec 137 Planches sur cuivre, renfermant environ 1200 Figures en noir, ombrées, mauvaises, médiocres et bonnes.

Collecteur et Descripteur.

Jonston, Ecrivain correct, convaincu qu'il étoit difficile de se former des idées nettes des productions de la Nature, telles que les avoient présentées *Gesner, Aldrovande, etc.*, se proposa d'extraire de ces vastes collections, la nomenclature, les descriptions et les propriétés de chaque substance indiquée. On peut lui reprocher de n'avoir pas été guidé par le doute philosophique en faisant ses extraits, présentant du même ton d'assertion les faits réels et les fables consignées dans les Auteurs.

Les Ouvrages de *Jonston*, recherchés pour la beauté des gravures qui sont toutes en taille-douce, offriroient un cours complet d'Histoire Naturelle telle qu'elle étoit connue vers la fin du 16e siècle, si le Régne végétal étoit complet ; mais il n'a publié que la Dendrologie *ou* l'Histoire naturelle des Arbres et Arbustes, en dix livres. Cette compilation assez bien faite pour le temps de sa rédaction, peut servir de supplément à l'Histoire des Plantes de *Morison.* Les Figures calquées sur celles des Inventeurs, sont assez bien gravées, quoique pour la plupart réduites d'après le module adopté par *J. Bauhin*, qui lui-même avoit copié celles de ses prédécesseurs.

JUSS. *Gen.* Antonii Laurentii de JUSSIEU Genera Plantarum secundùm Ordines naturales disposita, etc. *Parisiis*, 1789 ; un vol. in-8, sans Figures, renfermant 1754 Genres.

Systématique orthodoxe ; Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Linné, dans ses Prélecons sur les Ordres naturels, déclaroit à ses Disciples que de tous les Botanistes qui avoient travaillé

à la formation des Ordres naturels, *Bernard de Jussieu* son ami étoit le seul qui avoit eu des vues profondes sur la coordination des végétaux; cependant il ne pouvoit juger des recherches de *Bernard de Jussieu* sur ce sujet, que par sa correspondance littéraire et par quelques Essais publiés par les Disciples de *Jussieu*, tels que *Gérard*, *Adanson*, etc. S'il avoit connu le développement de la Méthode de *Jussieu*, telle qu'elle a été proposée par le neveu de *Bernard* dans l'Ouvrage intitulé *Genera Plantarum*, il auroit pu reconnoitre qu'on peut grouper le très-grand nombre des végétaux connus, même en liant tous les groupes par la considération de quelques attributs des parties de la fructification. L'Ouvrage de *Laurent de Jussieu* est non-seulement recommandable par le nouveau plan d'une méthode naturelle qu'il présente, mais encore par une multitude d'observations absolument neuves, rédigées avec précision, modestie et élégance. Plusieurs genres nouveaux y sont caractérisés d'après les principes de la plus sévère logique botanique. Quelques genres Linnéens sont divisés en plusieurs d'après des attributs saillans. Une foule de plantes exotiques sont rectifiées d'après des observations faites sur les espèces vivantes. La méthode adoptée par l'Auteur, est très-précieuse pour des Botanistes déjà exercés. Nous dirons même que ceux qui veulent saisir les véritables rapprochemens des végétaux entr'eux, devroient disposer leurs herbiers d'après cette méthode. Mais pour la pratique, c'est-à-dire pour déterminer les espèces et les genres, la plupart des Botanistes pensent avec *Linné* que les Méthodes artificielles offrent plus de facilité aux Élèves, sur-tout si d'après le conseil de *Linné* ils s'accoutument de bonne heure à en faire l'application suivant le plus ou moins de difficultés qu'offrent certains genres : car il est de fait que plusieurs genres peuvent être promptement déterminés plutôt par une méthode que par une autre. En effet, lorsque les étamines et les pistils sont à peine visibles, les Elèves doivent avoir recours aux méthodes tracées d'après le calice, la corolle ou le fruit.

K.

KNORR *Icon. Pl. Med.* Icones Plantarum medicinalium, centuriæ VI, auctore KNORR. *Nurimbergæ*, 1779-1785; six vol. in-8°, avec 600 Planches sur cuivre, renfermant 600 Figures en noir, ombrées ou enluminées, bonnes et complètes; et 600 Plantes disposées sans ordre ou système.

Collecteur.

Cette collection est très-précieuse pour les Élèves en Médecine, qui pour un prix assez modique, peuvent se procurer la suite complète des Plantes médicinales, signalées par des caractères précis, d'après le plan et le système de *Linné*, et qui, quoique gravées d'une manière un peu dure, présentent non-seulement l'ensemble de chaque

espèce, mais encore des détails très-précieux sur les parties de la fructification, conformes aux descriptions génériques de *Linné*.

* KŒMPF. *Amœn.* Amœnitatum exoticarum politico-physico-medicarum, fasciculi V; auctore Engelberto *Kœmpfero*. *Lemgoviæ*, 1712; un vol. in-4°, avec 32 Planches sur cuivre, renfermant 64 Figures en noir, ombrées, médiocres.

Inventeur et Descripteur.

Si *Kœmpfer* a peu contribué à enrichir la Botanique, on doit cependant le regarder comme un des meilleurs observateurs, relativement aux mœurs, aux usages et aux productions naturelles utiles des pays qu'il a parcourus.

L.

LAM. *Tab. encyclop.* Tableau encyclopédique et méthodique des trois Règnes de la Nature, partie botanique, par LAMARCK. *Paris*, 1800 (an 8); neuf vol. in-4°, avec 900 Planches sur cuivre, renfermant environ 1691 Figures en noir, ombrées, rangées d'après le système sexuel: la partie des Figures, achevée; celle des descriptions, incomplète.

Ouvrage excellent dont aucun Botaniste ne peut se passer, renfermant plusieurs Figures caractéristiques d'après nature, le plus grand nombre calquées sur celles de ses prédécesseurs *Tournefort*, *Plumier*, *Dillen*, *Micheli*, *Gœrtner*, etc.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Nous devons à cet infatigable Botaniste une grande partie des descriptions des plantes renfermées dans le Dictionnaire botanique de l'Encyclopédie méthodique. Nous lui devons encore l'Ouvrage intitulé la *Flore Françoise*, dans lequel il a tracé une méthode analytique très-ingénieuse et très-simple. Cet Ouvrage a été travaillé avec soin. Il est rare de trouver l'Auteur en défaut pour la synonymie. Ses descriptions rédigées d'après le plan et les vues de *Haller*, sont vraiment caractéristiques, n'offrant que les attributs qui peuvent conduire au diagnostique certain de la plante. Il n'a point imité nos Botanistes très-modernes qui ont élevé à la dignité d'espèces, une multitude de variétés. Plus sévère encore que *Linné*, il a ramené à des espèces fondamentales plusieurs espèces que ce prince des Botanistes regardoit comme telles. Quoique cette Flore ne soit pas complète dans l'état actuel de la science en France, elle sera toujours regardée comme un des meilleurs Ouvrages publiés dans le dix-huitième siècle.

LATOURR. *Chlor.* Chloris Lugdunensis, auctore C. FLEURIEU DE LA TOURRETTE. *Lugduni*, 1785; un vol. in-8°, sans Figures, renfermant 2573 Plantes, rangées d'après le Système de *Linné*.

Ejusd. Bot. Pil. Voyage au Mont-Pilat dans la province du Lyonnois. *Avignon*, 1770; un vol. in-8°, sans figures, renfermant 510 plantes, rangées d'après le Système de *Linné*.

Systématique orthodoxe.

Quoique *Goiffon* ami de *Tournefort*, eût déja signalé plus de 1700 espèces de plantes soit autour de la ville de Lyon, soit sur les montagnes sous-Alpines qui entourent cette ville, cependant les Botanistes Lyonnois doivent regarder *la Tourrette* comme le véritable restaurateur de la Botanique dans le Département du Rhône, (les manuscrits de *Goiffon* n'ayant point été publiés, nous les avons vérifiés de même qu'une partie de ses herbiers dans la bibliothèque du Dr *Gilibert*). En séparant les plantes exotiques de sa *Chloris* et en examinant avec soin le manuscrit de cet Ouvrage qu'il a légué au Dr *Gilibert*, nous trouvons que ce Savant a laissé dans ses herbiers près de 1800 espèces de plantes véritablement Lyonnoises, dont la détermination est d'autant plus sûre que nous nous sommes assurés, en parcourant son herbier, que toutes les espèces difficiles ont passé sous les yeux de *Linné*, de *Gouan*, de *Bernard de Jussieu* et de *Haller*.

Dans son *Botanicon Pilatense*, on trouve d'excellentes annotations sur nos plantes sous-Alpines les plus rares, et même quelques-unes sur les plantes de nos plaines, qu'il a le premier découvert en France, comme sur l'*Illisma parnassifolia*, L. Si ce dernier Ouvrage offre quelques fautes de détermination, telle que sa fameuse *Valeriana Pyrænaïca*, qui est la *Valeriana elongata* de *Jacquin*, et non la *V. Pyrenaica* de *Tournefort* et de *Linné*, nous avons trouvé dans un exemplaire qu'il a légué au Dr *Gilibert*, un nombre considérable d'additions et de corrections, dans lesquelles il a rectifié toutes les erreurs qui lui étoient échappées dans la première rédaction de cet Ouvrage. Nous pouvons même assurer qu'une seule des espèces qu'il annonce comme Lyonnoise, savoir la *Lysimachia thyrsiflora*, L. a été mal déterminée. Ce n'est qu'une variété de la *Lysimachia vulgaris*, L. qui même comparée avec cette plante, n'en offre aucun des caractères.

LEERS *Herb.* Joannis-Daniel LEERS Flora Herbornensis, etc. *Herbornæ Nassoviorum*, 1775; un vol. in-8°, avec 16 Planches sur cuivre format in-4°, renfermant 104 Figures en noir, ombrées, bonnes et complètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Ce petit Ouvrage de *Leers* offre une multitude d'observations neuves. Son travail sur les *Graminées*, relativement aux descriptions et aux Figures, ne sauroit être trop recommandé. Depuis *Scheuchzer*, nous n'avions sur cette partie difficile de la botanique aucun Ouvrage qui pour les Figures vraiment caractéristiques pût fixer l'attention des Botanistes. Celles de *Leers* qui offrent les plus grands détails des parties de la fructification grossies à la loupe, ont toutes été dessinées et gravées par l'Auteur d'après des individus vivans.

LINDERN *Hort. Alsat.* Hortus Alsaticus Plantas in Alsaciâ nobili, imprimis circa Argentinam spontè provenientes, designans, etc. à Franco Balthasare Von LINDERN. *Argentorati*, 1747; un vol. in-12, avec 12 Planches sur cuivre, renfermant 12 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes; et 1196 Plantes rangées par ordre alphabétique selon les mois de la floraison.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Les deux Ouvrages de cet Auteur, son *Hortus* et son *Tournefortius Alsaticus* annoncent un Observateur exercé. Mais quoique inventeur de quelques espèces dont une a constitué un genre qui porte son nom, cependant ses descriptions sont incomplètes et rarement caractéristiques. Ses Figures assez bien dessinées pour faire reconnoître la plante, ont été très-mal gravées, étant surchargées d'ombres.

Flor. Lapp. Caroli LINNÆI Flora Lapponica, exhibens plantas per Lapponiam crescentes. *Amstelodami*, 1737; un vol. in-8, avec 12 Planches sur cuivre, renfermant 64 Figures en noir, ombrées, bonnes; et 534 Plantes rangées selon le Système sexuel.

Ejusd. Hort. Cliff. Hortus Cliffortianus, exhibens Plantas quas in hortis tam vivis quàm siccis, Hartecampi in Hollandiâ, coluit vir nobilissimus et generosissimus Georgius *Cliffort*, auctore Carolo LINNÆO. *Amstelodami*, 1737; un vol. in-folio, avec 36 Planches sur cuivre, renfermant 37 Figures en noir, ombrées, bonnes et complètes, et environ 2500 Plantes rangées selon le Système sexuel. Les deux premières Planches représentent 87 Figures de feuilles.

Ejusd. Flor. Sùec. Caroli LINNÆI Flora Suecica, exhibens Plantas per regnum Sueciæ crescentes. *Stockholmiæ*, 1745; un vol. in-8°, avec une Planche sur cuivre, renfermant une Figure en noir, ombrée, bonne, et 1140 Plantes rangées selon le Système sexuel.

Ejusd. Flor. Zeyl. Caroli LINNÆI Flora Zeylanica, sistens Plantas Indicas Zeylanæ insulæ. *Holmiæ*, 1747; un vol. in-8°, avec trois Planches sur cuivre, renfermant 4 Figures en noir, ombrées, complètes; et 1052 Plantes rangées selon le Système sexuel.

Ejusd. Hort. Ups. Caroli LINNÆI Hortus Upsaliensis, exhibens Plantas exoticas, Horto Upsaliensis Academiæ à sese illatas, ab anno 1742 in annum 1748. *Stockholmiæ*, 1748; un vol. in-8°, avec 4 Planches sur cuivre, renfermant 4 Figures en noir, ombrées, bonnes et complètes; et 657 Plantes, rangées en très-grande partie selon le Système sexuel.

Ejusd. Spec. Plant. Caroli LINNÆI Species Plantarum. *Holmiæ*, 1762 et 1763; deux vol. in-8°, sans Figures, renfermant 7653 Plantes, rangées selon le Système sexuel.

Ejusd. Mat. Med. Caroli LINNÆI Materia medica, editio quinta, curante D. J. Christ. Dan. *Schrebero. Lipsiæ* et *Erlangæ*, 1787; un vol. in-8°, sans Fi-

gures, renfermant 672 Plantes, rangées selon le Système sexuel.

Ejusd. Amœn. Acad. Caroli LINNÆI Amœnitates Academicæ, *seu* Dissertationes variæ, physicæ, medicæ, botanicæ, editio tertia, curante J. C. Dan. *Schrebero. Erlangæ*, 1787; dix vol. in-8°, avec 31 Planches sur cuivre, renfermant 266 Figures, bonnes et complètes.

Ejusd. Ord. Nat. Caroli LINNÆI Prælectiones in Ordines naturales Plantarum, quas edidit Paulus Diet GISÈKE. *Hamburgi*, 1792; un vol. in-8°, avec quatre Planches sur cuivre, renfermant 40 Figures en noir, ombrées.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Ceux qui ayant étudié les différens Ouvrages de *Linné*, ne seront pas pénétrés de respect et d'enthousiasme pour ce grand homme, ne parviendront jamais à connoître les vrais fondemens d'une science dont cet immortel Botaniste a été le restaurateur.

LIN. *Fil. Suppl.* Supplementum Plantarum Systematis Vegetabilium editionis XV, Generum Plantarum, editionis VI, et Specierum Plantarum editionis II, editum à Carolo LINNÆO Fillo. *Brunsvigæ*, 1781; un vol. in-8°, sans Figures, renfermant 93 Genres, et 519 Espèces, rangées selon le Système sexuel.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Linné fils succéda presque à toutes les places de son père. Il s'étoit proposé de donner de nouvelles éditions de tous ses Ouvrages; et en attendant l'exécution de ce plan, il publia son *Supplementum*, Ouvrage qui fut accueilli avec empressement par tous les Botanistes, comme présentant une multitude de nouveaux genres et les caractères d'une foule d'espèces constituées par son père depuis la publication de ses *Mantissa*. On distingue facilement dans cet Ouvrage les articles rédigés par *Linné* le père et par *Linné* le fils. Les Décades de ce dernier qui l'avoient annoncé au monde savant comme Botaniste, offrent des modèles parfaits pour les descriptions des nouvelles espèces. Tous les manuscrits des *Linné* père et fils, et leurs immenses collections en Histoire naturelle, furent achetés un an après la mort de ce dernier, par le savant *Smith*, et ces trésors n'ont point été enfouis, l'acquéreur ayant regardé comme un devoir sacré, de lever tous les doutes que les Botanistes pouvoient avoir, en confrontant les échantillons des espèces Linnéennes avec ceux de *Linné*.

LOB. *Icon.* LOBELII Icones Stirpium seu Plantarum, tàm exoticarum quàm indigenarum. *Antuerpiæ*, 1591; deux vol. in-4° oblong, avec 2186 Figures sur bois, en noir, ombrées, mauvaises, médiocres et bonnes.

Inventeur, Collecteur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Lobel a été un des plus laborieux collecteurs du 16e siècle,

Il s'étoit d'abord annoncé dans sa jeunesse par un Ouvrage très-intéressant, ayant pour titre : *Illustrationes Plantarum*, dont il avoit ramassé les matériaux avec son ami *Penq*. On peut lui reprocher avec raison de n'avoir pas rendu justice dans la suite à ce collaborateur. En général les Figures des *Illustrationes* sont la plupart trop réduites, et comme telles mauvaises ; mais elles deviennent précieuses pour l'histoire de l'art, offrant des espèces absolument neuves. Dans la suite, *Lobel* profitant des vues de l'*Ecluse* et de *Dodoens*, a publié de meilleures Figures ; mais comme son Imprimeur étoit celui de ces deux Auteurs, il n'hésita pas de s'approprier la plupart des Figures qui avoient été gravées sous leur direction. Si l'on veut donc reconnoître celles qui lui appartiennent, il faut, comme nous l'avons fait, confronter toutes ses Figures avec celles de *Dodoens* et de *l'Ecluse*. En général, le style de *Lobel* est dur et incorrect ; ses descriptions peu détaillées, et laissant souvent à desirer les attributs caractéristiques, ne peuvent être comparées à celles de *l'Ecluse* et de *J. Bauhin*. *Rai* lui a reproché avec raison de s'être trop fié à sa mémoire dans un âge très-avancé, pour la station des Plantes, sur-tout pour celles d'Angleterre.

LOES. *Prus.* Flora Prussica, *sive* Plantæ in regno Prussiæ spontè nascentes à Joanne LOESELIO primùm collectæ. *Regiomonti*, 1703 ; un vol. in-4°, avec 83 Planches sur cuivre, renfermant 85 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes ; et 761 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Nous devons à cet Auteur, plusieurs Espèces neuves observées dans les plaines du Nord de l'Europe. La *Synonymie* de son Ouvrage est très-exacte et assez complète, indiquant non-seulement les noms des Auteurs, mais encore la page de leurs Ouvrages : méthode que *G. Bauhin* auroit dû adopter dans son *Pinax*. *Loësel* est peut-être le premier Botaniste qui ait étudié avec soin les Cryptogames, savoir les *Mousses* et les *Champignons* qui croissent aux environs de Konigsberg. Il ne faut cependant pas croire que toutes les Espèces qu'il annonce comme neuves, le soient réellement. Quelques-unes avoient été indiquées et décrites par *G. Bauhin*, d'autres ne sont que des variétés, telle que sa *Valeriana*, n.° 84, qui n'est qu'une variété du *Valeriana dioïca* de *Linné*. En général les descriptions de cet Auteur nous ont paru incomplètes.

LUDW. *Gen.* Christiani Gottlieb LUDWIG Definitiones Generum Plantarum. *Lipsiæ*, 1760 ; un vol. in-8°, sans Figures, renfermant 1288 Genres, disposés selon le Système de l'Auteur sur la régularité et l'irrégularité de la corolle, et sur le nombre des pétales.

Systématique orthodoxe ; Descripteur et Dénominateur nouveau.

Ludwig nous offre le rare exemple d'un Médecin qui a eu assez de courage pour cultiver non-seulement les parties essentielles de l'art de guérir, mais encore toutes les parties accessoires. La totalité de ses Ouvrages, publiés par lui ou par ses Disciples, nous présente une espèce d'Encyclopédie médicinale. Considéré comme Naturaliste, il a joui d'une très-grande réputation. Ses Ouvrages de botanique le placent parmi les meilleurs Observateurs. Sa philosophie botanique, publiée sous le titre d'*Institutiones Regni vegetabilis*, est un des Ouvrages les plus sages, et la partie physiologique bien rédigée, offre plusieurs observations neuves.

Dans son *Genera*, *Ludwig* a combiné la Méthode de *Rivin* réformée avec celle de *Linné*. Comme *Rivin*, il a constitué ses classes d'après la présence ou l'absence de la corolle, d'après les fleurs considérées comme simples ou composées, comme monopétales ou polypétales régulières ou irrégulières. Ses ordres sont établis sur la considération des étamines et des pistils; ses sous-ordres sur celle des attributs des ovaires et des fruits. Ce plan rend le système de *Ludwig* d'autant plus facile pour déterminer les Plantes, qu'il a évité, en le coordonnant, presque toutes les difficultés que présente le système de *Linné*.

Un Élève, en cherchant à déterminer une plante d'après ce système, a la satisfaction de vérifier successivement toutes les parties de la fructification; et ce qui lui facilite encore ses recherches, c'est que *Ludwig* ajoute souvent à ses caractères génériques déduits des parties de la fructification, des caractères secondaires puisés dans l'ensemble des autres parties de la plante. Tous les avantages qu'offre le système de *Ludwig*, sont bien sensibles d'après l'expérience de plusieurs Professeurs, qui se sont assurés que leurs Élèves faisoient beaucoup plus de progrès, en déterminant les plantes d'après ce système mixte, que d'après ceux des autres Auteurs. Le *Genera* de *Ludwig* présente encore un avantage; c'est un véritable *Pinax* pour tous les Genres constitués avant lui par les différens Auteurs.

Ludwig n'est pas seulement recommandable comme Botaniste par les deux Ouvrages que nous venons d'indiquer, on lui doit plusieurs Dissertations de Botanique, qui établissent ou des dogmes nouveaux, ou qui offrent des observations neuves. Ayant dans sa jeunesse voyagé en Afrique, et ayant rapporté de ce voyage une quantité considérable de graines et de fruits des plantes exotiques, il fut frappé, en confrontant les individus du jardin de Leipzig avec ceux qu'il avoit cueillis sur leur lieu natal, de voir combien la plupart des espèces avoient dégénéré par l'influence de la culture et du climat, non seulement relativement à la grandeur, mais encore par rapport aux attributs mécaniques de chaque espèce; d'où il conclut avec raison que les espèces de

plantes étrangères dessinées et décrites d'après les individus cultivés dans les jardins d'Europe, sont presque toutes très-différentes des mêmes espèces cueillies dans leur lieu natal.

Aussi *Ludwig* pensoit-il qu'un grand nombre même des espèces Linnéennes n'étoient point réelles, mais plutôt le résultat de l'influence du climat et du sol. Cette espèce de paradoxe se change en une vérité démontrée aux yeux des Botanistes qui ont comparé avec soin nos plantes Alpines, avec les mêmes espèces que l'on observe dans les plaines du Nord. Aussi un Ouvrage à refaire d'après les idées de *Ludwig*, consignées dans sa Dissertation *de minuendis Speciebus Plantarum*, seroit une vérification rigoureuse de toutes les prétendues nouvelles espèces publiées depuis la mort de *Linné*.

Nous devons encore à *Ludwig* des analyses bien faites de tous les Ouvrages d'Histoire naturelle et de Botanique publiés depuis 1750 jusqu'à sa mort, analyses qui annoncent toutes des connoissances profondes dans les différentes parties d'Histoire naturelle, et ce qui est rare dans les Journalistes, une impartialité et une justesse de jugement qu'on ne sauroit trop estimer. Ces analyses sont consignées dans les *Commentarii de rebus gestis in Medicinâ et in Historiâ naturali*.

M.

MAGNOL. *Bot.* Botanicum Monspeliense, *sive* Plantarum circa Monspelium nascentium, Index. *Monspelii*, 1686; un vol. in-12, avec 23 Figures sur cuivre, en noir, ombrées, médiocres; et 1371 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Ejusd. Hort. Hortus Regius Monspeliensis, *sive* Catalogus Plantarum quæ in Horto Regio Monspeliensi demonstrantur, à Petro MAGNOL. *Monspelii*, 1697; un vol. in-8°, avec 21 Figures sur cuivre, en noir, ombrées, médiocres; et 2655 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur et Dénominateur ancien.

Quoique *Magnol* ait fait ses recherches dans un pays qui paroissoit épuisé par *Pena*, *Lobel*, *Dalechamp*, les *Bauhin*, *Richier de Belleval*, cependant son *Botanicum Monspeliense* nous prouve qu'après des Botanistes passionnés, chaque canton peut offrir de nouvelles richesses à leurs successeurs. En effet, *Magnol* a indiqué plusieurs centuries de Plantes qu'il a le premier reconnues dans nos Départemens méridionaux; quelques-unes même sont neuves. Il a donné des notices assez exactes et des Figures si non bien gravées, du moins dessinées de manière à les faire reconnoître.

MAPP. *Alsat.* Marci MAPPI Historia Plantarum Alsaticarum. *Argentorati* et *Amstelodami*, 1742; un vol. in-4°, avec 7 Planches sur cuivre, renfermant 12 Figures en noir, ombrées, bonnes; et 1689 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Mappi a beaucoup augmenté le nombre des Plantes d'Alsace, après *Lindern;* mais son Ouvrage qui présente quelques Figures assez bonnes, n'annonce ni un Observateur exact ni un Botaniste nourri de principes lumineux.

MATTH. *Oper.* Petri Andreæ Matthioli Opera. *Basileæ*, 1574, édition de *G. Bauhin;* un vol. in-folio, avec 1272 Figures sur bois, ombrées, médiocres et bonnes.

Inventeur, Collecteur, et Descripteur.

Matthiole, quoique très-savant et en état de rédiger un Ouvrage avec élégance et netteté, n'étoit pas assez exercé dans la pratique de la Botanique, pour prendre place parmi les fondateurs de l'art, doués d'un certain génie, comme *l'Ecluse*, *Columna*, les *Bauhin*, etc. Cependant la science lui a de vraies obligations. En ne le considérant que comme Collecteur, il paroit d'après un examen sévère du texte de son Ouvrage et de ses Figures, 1.° que ses descriptions sont rédigées sans plan et sans les détails nécessaires pour le diagnostique de la Plante; 2.° qu'il faisoit dessiner les Plantes telles que les Herboristes les lui apportoient, sans s'embarrasser si les échantillons étoient complets; 3.° Que souvent il faisoit dessiner le fruit en même temps que la fleur, et *vice versâ;* 4.° que quelquefois même il ne donne que la racine et les feuilles radicales, comme pour la *Gynoglosse officinale* et l'*Onosma echioïdes*. Quelquefois il présente des monstruosités singulières qui ont dérouté les plus habiles Botanistes, comme lorsqu'il a fait graver l'enveloppe du *Phallus impudicus* qui, se déchirant par le sommet, reçoit quelques graines de Plante apportées par le vent, qui y ont germé et développé leurs feuilles radicales; cette Figure a long-temps désespéré les plus savans Botanistes, jusqu'à ce qu'un semblable individu a été trouvé au Mont-Pilat par notre ami *Sionet*.

On a fait à *Matthiole* un reproche plus grave et mieux fondé, qui est d'avoir fait dessiner un certain nombre de Plantes d'imagination, ou plutôt d'après les descriptions de *Dioscoride*. On en trouve en effet quelques-unes dans les premières éditions de son Ouvrage, et même dans la dernière; mais ce reproche a été trop exagéré par ses ennemis. En effet, quelques-uns de ses dessins que l'on avoit regardé comme traces d'imagination, ont été démontrés par les Botanistes modernes comme exprimant des espèces existantes réellement dans le plan de la Nature. L'*Hyoscyamus Scopolia*, L. et l'*Astrantia epipactis*, L. en fournissent la preuve.

Nous avons désigné *Matthiole* comme Inventeur, parce que quoiqu'il ait calqué plusieurs de ses Figures sur celles de ses prédécesseurs *Brunsfeld* et *Fuchs*, cependant nous lui en devons plusieurs centuries qu'il a fait dessiner d'après nature et dont plusieurs sont excellentes, si nous les examinons relativement

au port de la plante et à l'ensemble de la floraison. Un autre mérite de ses Figures c'est d'avoir le premier fait dessiner des jets des grands arbres qui représentent très-bien les parties caractéristiques, tandis que ses prédécesseurs les représentoient en entier, ce qui ne laissoit aucune idée distincte de l'espèce.

Parmi les innombrables éditions de *Matthiole*, on distingue sur-tout celle des *Valgrise*, à grandes et petites Figures, à texte latin ou italien; mais nous avons préféré dans notre Ouvrage de citer l'édition de *G. Bauhin*, dont les Figures sont aussi exactes, qui est enrichie d'une synonymie précieuse, outre qu'elle offre près de 300 Figures que l'on ne trouve point dans les dernières éditions de *Matthiole*, et dans laquelle *G. Bauhin* a fait entrer une partie des Figures qu'il a publiées dans son *Prodromus*.

MÉM. de l'Acad. Histoire de l'Académie royale des Sciences, depuis son établissement en 1666 jusqu'en 1777. *Paris*, 1738; quatre-vingt-seize volum. in-4.° avec ..... Planches sur cuivre, renfermant . . . . . Figures en noir, ombrées, bonnes. Collection peu abondante en Mémoires relatifs à la Botanique, cependant précieuse par les monographies de *Tournefort*, des *Jussieu*, *Isnard*, *Vaillant*, *Nissole*, *Duhamel*, *Marchand*, *Guettard*.

* MENTZ. *Pugil.* Chris. MENTZELII Pugillus rariorum Plantarum. *Berolini*, 1682; un vol. in-folio avec 11 Planches sur cuivre, renfermant 47 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Cet Auteur a coordonné d'une manière assez confuse le *Pinax* de *G. Bauhin*, en forme de Dictionnaire de Botanique. Mais ce qui rend son Ouvrage véritablement précieux, c'est son Appendix intitulé : *Pugillus rariorum Plantarum*, qui présente plusieurs espèces de Plantes Alpines, et sur-tout les Plantes les plus rares de la partie septentrionale de l'Allemagne. Ses Figures, quoique incomplètes, sont conformes aux échantillons de nos herbiers. Mais ses descriptions très-peu détaillées, ne peuvent être regardées que comme des esquisses.

MICHEL. *Gen.* Nova Plantarum Genera juxta Tournefortii methodum disposita, auctore Petro-Antonio MICHELIO. *Florentiæ*, 1728; un vol in-4°, avec 108 Planches sur cuivre, renfermant environ 570 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Cet Auteur a constitué plusieurs genres parmi les plantes à fructification visible. On lui doit un très-grand nombre de découvertes importantes sur les Cryptogames.

MILL. *Dict.* Dictionnaire des Jardiniers de Philippe MILLER,

à *Paris*, 1785; dix vol. in-4°, y compris les deux volumes de Supplément, par M. de CHAZELLES. Le Supplément avec 9 Planches sur cuivre, renferme 70 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

**Id. Icon.* Figures of the plants described in the Gardener's Dictionary, by Philipp MILLER. *London*, 1760; deux vol. in-folio, avec 300 Planches sur cuivre, renfermant 399 Figures coloriées, médiocres et bonnes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Le Dictionnaire de *Miller* est très-précieux, même en le considérant comme un ouvrage de Botanique. La plupart de ses descriptions nous ont paru faites d'après nature, mais elles sont moins caractéristiques que celles de *Haller*; l'Auteur prodiguant trop souvent les attributs communs à toutes les espèces du Genre et même de l'Ordre. Ses Figures originales sont exactes et bien gravées, mais celles qui ont été imitées dans la traduction Françoise, n'ont pas à beaucoup près ce mérite. D'ailleurs l'ouvrage de *Miller* est le premier qui nous offre des détails suffisans sur la culture des plantes rares.

* MONT. *Prod.* ou *Gram.* Josephi MONTI Catalogi Stirpium agri Bononiensis Prodromus. Gramina et adfinia complectens. *Bononiæ*, 1719; un vol in-4°, avec . . . Planches sur cuivre, renfermant . . . Figures en noir, ombrées, bonnes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Ce petit ouvrage de *Monti* est devenu très-rare, et mériteroit d'être réimprimé, vû que cet Auteur est non-seulement recommandable par une nouvelle disposition méthodique des Graminées, mais encore parce qu'il présente la description et les Figures de plusieurs nouvelles espèces observées en Italie.

MORAND. *Hist.* Historia Botanico-practica, *seu* Stirpium atque Herbarum quæ ad usum Medicinæ pertinent, nomenclatura, descriptio, virtutes, etc. Opus Equitis Joannis Baptistæ MORANDI. *Mediolani*, 1761; un vol. in-folio, avec 68 Planches sur cuivre, renfermant 556 Figures en noir, ombrées, exactes.

Les 9 Figures de la première Planche et les trois premières Figures de la Planche 66, représentent des corallines, coraux, etc., et autres productions marines.

Systématique orthodoxe; Collecteur, et Dénominateur ancien.

L'Ouvrage de *Morandi* mérite quelque attention quant au texte, qui offre le développement du Système de *Boerrhaave*, appliqué aux Plantes médicinales, et présente des Figures presque toutes d'après nature, et souvent caractéristiques, dessinées par l'Auteur et gravées à l'eau forte.

Les dépôts de la Bibliothèque de Turin renferment des porte-feuilles très-considérables des dessins de végétaux exécutés par *Moran-*

di, soit des plantes spontanées en Italie, soit des espèces rares cultivées dans les jardins. Ces dessins sont souvent cités par *Allioni* dans sa *Flora Pedemontana*. Nous remarquerons que l'Ouvrage de *Morandi* offre non-seulement les caractères des genres tels que les avoit conçu *Boerrhaave*, mais encore une synonymie assez exacte, et des descriptions la plupart extraites de l'*Historia Plantarum* de *Rai*. Mais cet Ouvrage n'est point achevé, l'Auteur étant mort avant d'avoir publié la seconde partie qui devoit renfermer l'Histoire des arbres et des arbrisseaux.

MORIS. *Hist.* Plantarum Historia universalis Oxoniensis, *seu* Herbarum Distributio nova, auctore Roberto MORISON. *Oxonii*, 1715; deux vol. in-folio, avec 302 Planches sur cuivre, renfermant 3523 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Cet Auteur qui a long-temps vécu à Blois ville de France, étant chargé de la direction du Jardin de *Gaston d'Orléans* frère de *Louis XIII*, a le premier signalé et décrit plusieurs espèces rares de France, dans son Ouvrage intitulé: *Prœludia Botanica*. Retiré en Angleterre et chargé de la direction du Jardin d'Oxford, il entreprit son grand ouvrage, intitulé: *Historia Plantarum*, dont il n'a publié qu'un volume sur les Herbes, le troisième ayant été rédigé d'après ses manuscrits, par son successeur *Bobard*. Le premier, qui devoit traiter des arbres et des arbrisseaux, n'a jamais paru.

Cet Ouvrage dans lequel l'Auteur croyoit avoir tracé le véritable plan de la méthode naturelle, annonce presque à chaque page, comme l'a observé *Rai*, un amour propre désordonné. On ne trouve qu'un assez petit nombre de descriptions et de figures neuves, toutes les autres sont calquées d'après celles de ses prédécesseurs; et ses descriptions ne sont le plus souvent que la copie (sauf quelques additions) des descriptions de *J. Bauhin*. Cependant on doit à *Morison* des détails très-intéressans, spécialement sur les Fruits, et un rapprochement heureux des espèces dont il a le premier constitué les genres, ce qui a donné lieu aux critiques fréquentes, intitulées: *Allucinationes Bauhini*. Cet Auteur, dans sa distribution méthodique des *Ombellifères*, offre des figures plus grandes et meilleures que celles de son grand Ouvrage, mais cette Famille naturelle n'est pas pure dans cet Essai, l'Auteur ayant ajouté comme Ombellifères les *Valérianes*, etc.

* MUNT. *Brit.* Abrahami MUNTINGII Phytographia curiosa, exibens arborum, fruticum, herbarum et florum icones. *Amstelodami*, 1713: un volum. in-4°, avec 245 Planches sur cuivre, renfermant 253 Figures en noir, ombrées, bonnes.

Ouvrage publié par François KIGGELAER.

Inventeur,

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Linné écrivant à *Haller* qui lui avoit demandé un exemplaire de l'Ouvrage de *Muntingius*, lui répondit : *Que voulez-vous faire d'un si mauvais ouvrage ?* Cependant dans la suite il le cite pour plusieurs espèces de *Rumex* et pour quelques autres Plantes. Il est certain que le texte de cet Auteur ne mérite aucune attention ; mais la plupart de ses Figures assez exactes ont été dessinées d'après nature, et plusieurs même sont originales.

MURRAI *Syst. veget.* Caroli Linnæi Systema Vegetabilium, secundùm classes, ordines, genera et species, cum caracteribus et differentiis, curante J. Andræa MURRAI, editio decimaquarta. *Gottingæ*, 1784 ; un vol. in-8°, sans Figures, renfermant 1454 genres et 12594 espèces, rangées suivant le Système sexuel.

Systématique orthodoxe ; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Le Système des Végétaux de *Murrai* est d'autant plus précieux, que le plus grand nombre des additions a été fait d'après les vues et les notes de *Linné*. Il présente même les caractères distinctifs d'une multitude de nouvelles espèces Européennes, publiées par *Jacquin*, dont on n'avoit auparavant aucune phrase spécifique. Ce Système de Végétaux est travaillé avec beaucoup d'art, mais ceux qui bien imbus des principes de la philosophie Linnéenne, examineront avec soin les nouvelles espèces Européennes, s'assureront facilement qu'un grand nombre d'entr'elles ayant été soumises à la critique de *Linné*, ne sont réellement que des variétés tranchantes des espèces analogues de *Linné*, variétés produites par le climat et quelquefois même par la culture dans les jardins botaniques. L'on sera porté à le croire, si on se rappelle que plusieurs espèces annoncées comme nouvelles par le sévère Botaniste *Gouan*, ayant été examinées par *Linné*, il n'en avoit reconnu comme telles qu'un très-petit nombre. D'où nous concluons, que si *Linné* avoit eu sous les yeux toutes les prétendues nouvelles espèces de nos Botanistes très-modernes, comme de *Jacquin*, *Allioni*, etc. etc. etc. peut-être n'en auroit-il adopté qu'un aussi petit nombre.

O.

* OED. *Flor. Dan.* Icones Plantarum, spontè nascentium in Regnis Daniæ et Norvegiæ, etc. ad illustrandum Opus de iisdem Plantis, regio jussu exarandum FLORÆ DANICÆ nomine inscriptum, auctore Georgio-Christiano OEDER. *Hafniæ*, 1766 ; vingt-un fascicules in-fol. avec 1260 Planches sur cuivre, renfermant ..... Figures en noir, ombrées ou coloriées, bonnes, et en partie complètes.

Inventeur.

Oeder n'a publié que six centuries de cet Ouvrage. Il a été continué par *Muller* et *Vahl*, qui l'ont déjà porté à près de 1800 Planches. Les Figures sont proposées sans ordre, à mesure

que les Auteurs pouvoient se les procurer. Les plus communes ont été exécutées à Gottingue sous la direction de *Murrai*. Plusieurs espèces proposées par *Oeder* sont neuves, et celles qui avoient déjà été déterminées par *Linné*, sont la plupart d'une vérité frappante, et offrent souvent tous les détails des parties de la fructification. *Oeder* avoit des vues très-étendues sur la Botanique, comme on peut s'en assurer par la lecture de ses *Elementa Botanices*. Élève de *Haller*, il inclinoit dans la pratique pour la méthode naturelle, dont il a tracé dans ce même Ouvrage une excellente esquisse.

P.

PER. *Tab. méth.* Tableau méthodique d'un cours d'Histoire naturelle médicale, par Bernard PEYRILHE. *Paris*, an 7; un vol. in-8°, sans Figures.

Peyrilhe nous offre l'exemple très-rare d'un Chirurgien qui a osé mener de front toutes les parties essentielles et accessoires de l'art de guérir. Tous ses Ouvrages de Chirurgie annoncent une vaste érudition guidée par un jugement sain et des vues profondes. Ses leçons sur les productions naturelles, considérées comme utiles aux Élèves en Médecine et en Pharmacie, nous prouvent qu'il a étudié avec soin les différentes parties de l'Histoire Naturelle. En adoptant pour texte de ses leçons la Matière médicale de *Linné*, il nous a convaincu qu'il avoit senti comme *Haller*, que cet Ouvrage rédigé par le génie, pouvoit seul rappeler à un Professeur tous les faits les mieux constatés. Les additions qu'il a faites à cette Matière médicale, ne la déparent pas. Elles portent principalement sur les principes actifs des médicamens déterminés par l'analyse chimique, et sur plusieurs propriétés bien constatées, reconnues par les observateurs modernes.

* PETIV. *Gaz.* Jacobi PETIVERI Opera Historiam Naturalem spectantia. *Londini*, 1767; deux vol. in-folio, avec 268 Planches sur cuivre, dont à peu près la moitié relatives à la Botanique, renferment environ 2000 Figures en noir, ombrées, mauvaises, médiocres et bonnes. Les autres Planches représentent des poissons, coquilles, insectes, etc.

Cet Ouvrage comprend, 1.° Gazophylacium Naturæ et Artis; 2.° Herbarii Britannici clariss. D. Rai Catalogus; 3.° Hortus Peruvianus medicinalis; 4.° Plantarum Italiæ marinarum icones et nomina. 5.° Pterigraphia Americana.

Collecteur, et Dénominateur ancien.

Les Amateurs recherchent l'Ouvrage de *Petiver* comme un supplément à l'Histoire des Plantes de *Rai*. Mais ses Figures, quoique présentant un assez grand nombre d'espèces qui n'avoient pas encore été dessinées avant lui, sont si petites et si mal exécutées qu'elles ne méritent guères d'être consultées.

PLUK. *Phytog.* Leonardi PLUKENETII Phytographia, *sive* Stir-

pium illustriarum et minus cognitarum Icones. *Londini*, 1691; trois vol. in-4°, avec 454 Planches sur cuivre, renfermant 2813 Figures en noir, ombrées, mauvaises, médiocres et bonnes; et 8779 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Cet Ouvrage comprend. 1.° Almagestum Botanicum; 2.° Almagesti Botanici mantissa; 3.° Amaltheum Botanicum.

Collecteur, Inventeur, et Dénominateur ancien.

Quoique cet Auteur n'ait pas voyagé, et qu'il n'ait fait dessiner le plus grand nombre de ses Plantes que d'après des échantillons conservés en herbier, cependant ses collections de Figures seront toujours regardées comme un des plus grands monumens en Botanique; elles intéressent même les Botanistes qui ne s'occupent que des Plantes Européennes: car il en a proposé le premier plusieurs espèces qui bien vérifiées, nous ont paru dessinées d'après les individus vivans.

PLUM. *Gen.* Nova Plantarum Americanarum genera, auctore P. Carolo PLUMIER. *Parisiis*, 1703; un vol. in-4°, avec 40 Planches sur cuivre, renfermant 106 Figures de genres, en noir, ombrées, bonnes.

* PLUM. *Amer.* Description des Plantes de l'Amérique, par le P. Charles PLUMIER, Minime. *Paris*, 1793; un vol. in-folio, avec 108 Planches sur cuivre, renfermant 150 Figures, partie au trait ou sans ombre, partie en noir et ombrées, bonnes.

* *Ejusd. Filic. Amer.* Traité des Fougères de l'Amérique, par le P. Charles PLUMIER, Minime et Botaniste du roi dans les isles de l'Amérique. *Paris*, 1705; un vol. in-folio, avec 172 Planches sur cuivre, renfermant 237 Figures en noir, ombrées, bonnes, parmi lesquelles sont représentés des Lichens, Mousses, Agarics, etc.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Si les différens manuscrits de *Plumier* avoient été publiés, il seroit en droit de revendiquer une foule de Plantes Américaines annoncées de nos jours. Il a le premier constitué la plupart des genres des Plantes d'Amérique, d'après les vues et la méthode de *Tournefort*.

POLL. *Palat.* Joannis-Adami POLLICH Historia Plantarum in Palatinatu electorali spontè nascentium. *Manhemii*, 1776; trois vol. in-8°, avec 4 Planches sur cuivre, renfermant 17 Figures en noir, ombrées, bonnes; et 1205 Plantes rangées selon le système de *Linné*.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur moderne.

Ce qui rend cet Ouvrage très-intéressant, c'est que l'Auteur a eu le courage et la patience de décrire *ex vivo* toutes les espèces qu'il a proposées méthodiquement d'après le Système de *Linné*. On peut regarder ses dé-

criptions comme de véritables tableaux d'après lesquels on pourroit dessiner les mêmes Plantes de manière à les faire connoître.

PON. *Bald.* Plantæ *seu* Simplicia, ut vocant, quæ in Baldo monte et in viâ à Veronâ ad Baldum reperiuntur, cum Iconibus et nominibus, à Joanne PONA. *Antuerpiæ*, 1601; un vol. in-folio, imprimé à la suite de l'*Historia* de *l'Ecluse*, avec 16 Figures sur bois, en noir, ombrées.

Inventeur.

Le Catalogue des Plantes du Mont-Baldi, par *Pona*, est recherché pour quelques espèces Alpines dont il a donné le premier la description et la figure.

R.

RAJ. *Hist.* Historia Plantarum, Species hactenùs editas aliasque insuper multas noviter inventas et descriptas complectens, auctore Joanne RAJO. *Londini*, 1676; trois vol. in-folio, sans Figures.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Rai a été un de ces hommes rares dont le génie ardent et très-étendu a pu embrasser avec succès toutes les parties de l'Histoire Naturelle. Mais en le considérant comme Botaniste, tous ses Ouvrages sont précieux pour les Amateurs. Il a été le premier qui ait tracé le plan d'une méthode véritablement naturelle, et qui ait désigné les Genres et les Espèces d'après des caractères faciles à saisir. Dans son grand Ouvrage intitulé *Historia Plantarum*, il a présenté avec précision, élégance et netteté, toutes les connoissances acquises de son temps; et sans avoir la prétention de tout réformer, il a mis en ordre et rectifié les excellentes Descriptions de *J. Bauhin*, *l'Ecluse* et *Columna*, se contentant d'intercaler dans son texte les observations qui lui étoient propres, toutes les fois qu'il avoit pu vérifier leurs descriptions sur les Plantes vivantes. On peut non-seulement compter sur son exactitude relativement aux Plantes d'Angleterre qu'il avoit eu de fréquentes occasions d'examiner, mais encore sur la plupart de nos Plantes Alpines et Méridionales, ayant plusieurs fois parcouru, en véritable observateur, nos Alpes, l'Italie, le Languedoc et la Provence.

REICH. *Gen.* Caroli Linnæi Genera Plantarum, curante Joanne-Jacobo REICHARD. *Francofurti ad Mœnum*, 1778; un vol. in-8°, sans Figures, renfermant 1343 genres.

Ejusd. Syst. Pl. Caroli Linnæi Systema Plantarum, curante REICHARD. *Francofurti ad Mœnum*, 1779, quatre volumes in-8°, sans Figures, renfermant 8311 Plantes.

Systématique orthodoxe.

RENEAL. *Specim.* Pauli RENEALMI Specimen Historiæ Plantarum. *Parisiis*, 1611; un vol. in-4°, avec 25 Planches sur cuivre, renfermant 47 Figures en

noir, ombrées, bonnes, et imparfaites.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien avec des phrases grecques.

Rénéalme paroît avoir rédigé cet Ouvrage d'après les vues et le plan de *Richier de Belleval :* même nomenclature caractéristique grecque; même manière de décrire; même plan de dessin pour les Figures dont plusieurs sont caractéristiques; rapprochemens heureux des espèces pour constituer les genres généraux et subalternes comme dans ses *Gentianes.*

Columna, *Prosper Alpin*, *Richier de Belleval* et *Rénéaulme* ont été les premiers qui ont abandonné les Figures sur bois, pour leur substituer les Figures sur cuivre.

* RHEED. *Malab.* Hortus Indicus Malabaricus, adornatus per Henricum Van RHEEDE. *Amstælodami*, 1678; douze volumes in-folio avec 794 Planches sur cuivre, renfermant 794 Figures en noir, ombrées, bonnes et imcomplètes.

Inventeur et Descripteur.

Cette Collection a été une des plus grandes entreprises botaniques. Elle seroit bien plus précieuse, si les rédacteurs de cet Ouvrage, imbus des principes qui ont dirigé les Botanistes modernes, avoient fourni les détails nécessaires sur les parties de la fructification. Cet Ouvrage présente un très-grand nombre d'arbres et d'arbrisseaux; mais il ne faut pas croire, comme quelques Botanistes, que la région qui les produit soit plus féconde en Plantes ligneuses qu'en Plantes herbacées. Les premiers voyageurs Botanistes en Amérique, en Asie et en Afrique, ont dû décrire et figurer les arbres et les arbrisseaux comme se présentant au premier coup d'œil et frappant davantage leur imagination. Mais il est certain que des recherches ultérieures ont démontré que sur la même étendue de sol, le nombre des genres et des espèces étoit infiniment plus considérable dans les pays qui avoisinent l'Équateur que dans nos climats tempérés Septentrionaux. *Linné*, n'ayant pas assez insisté sur cette observation, s'est trompé relativement au nombre de Végétaux supposés existans sur toute la surface du globe. Il a prétendu dans sa préface du *Species Plantarum*, qu'en comparant le nombre des Plantes découvertes en Europe, et à peu près épuisées, les trois autres parties du globe n'en présentoient qu'un nombre proportionel. Mais s'il avoit fait attention à la grande différence qui se trouve, pour le nombre des genres et des espèces, entre la Flore de Suède et celle de Portugal, par exemple, il auroit reconnu que les pays Méridionaux nourrissent un plus grand nombre de Plantes que les régions Septentrionales.

Notre ami *Dombey* nous assura que dans un vallon du Pérou, qui n'offroit pas une lieue de longueur sur à peu près cent toises de largeur, il avoit eu la curiosité de calculer avec beau-

coup de soin le nombre des espèces de Plantes que ce terrain très-borné pourroit lui offrir. Il s'assura, après de fréquentes herborisations faites uniquement sur ce local en différens temps, qu'il avoit préparé et desseché 1400 espèces bien distinctes, cueillies uniquement dans ce vallon, c'est-à-dire l'équivalent des Plantes observables à quatre ou cinq lieues à la ronde d'une ville de France. Quoi qu'il en soit de cette vérité, l'Ouvrage de *Rheede* est devenu nécessaire comme celui de *Rumphius*, à tous les Botanistes qui veulent connoître les Plantes d'Asie. Mais il s'en faut beaucoup que toutes les espèces que ces deux Auteurs ont figurées soient ramenées à celles qui sont déjà liées avec le Système de *Linné*.

ROEM. *Flor.* Floræ Lusitanicæ et Brasiliensis Specimen, Auctore J. J. ROEMER. *Norimbergæ*, 1796; un vol. in-8°, avec 8 Planches sur cuivre, renfermant 62 Figures en noir, ombrées, bonnes.

Systematique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Cet Ouvrage de *Roemer* est intéressant en ce qu'il renferme les Lettres de *Linné* père et fils à *Vandell:* elles sont au nombre de vingt-deux.

ROTH *Catal. Bot.* Catalecta Botanica, quibus Plantæ novæ et minùs cognitæ describuntur atque illustrantur, ab Alberto-Guilielmo ROTH. *Lipsiæ*, 1797; premier fascicule avec 8 Planches sur cuivre, renfermant 35 Figures coloriées, bonnes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Cet Ouvrage de *Roth* offre un travail considérable sur les *Hépatiques*, principalement sur les *Conferves*, les *Ulves*, etc; des descriptions soignées, des observations nombreuses, et des figures coloriées de la plupart des espèces.

ROTTB. *Desc. et Icon.* Descriptiones et Icones rariorum et pro maximà parte novarum Plantarum, Auctore Christiano Friis ROTTBOELL. *Hauniæ*, 1786; un vol. in-fol. avec 21 Planches sur cuivre, renfermant 81 Figures en noir, ombrées, bonnes et complètes.

Inventeur, Descripteur, et Denominateur nouveau.

L'Ouvrage de *Rottboell* sur les Graminées est recommandable par l'exactitude des descriptions, la beauté et la vérité des Figures. Il devient sur-tout nécessaire aux Botanistes qui ont l'ambition de connoître les plantes exotiques.

RUMPH. *Amb.* Georgii Everardi RUMPHII Herbarium Amboïnense, curâ et studio Joannis BURMANNI. *Amstelodami*, 1750 et 1755; sept vol. in-fol. avec 550 Planches sur cuivre, renfermant 550 Figures en noir ombrées, bonnes et incomplètes.

Inventeur et Descripteur.

L'Ouvrage de *Rumphius* sur les Plantes d'Amboine est aussi

précieux que celui de *Rheede* sur les Plantes du Malabar ; il étoit devenu aussi rare : mais *Buc'hoz* ayant acheté ses cuivres en Hollande, les a publiés dans ses différentes collections.

L'Ouvrage de *Rumphius* présente plus d'arbres et d'arbrisseaux que d'herbes, par les mêmes raisons que nous avons données à l'article de *Rheede*.

Un grand nombre des espèces qu'il a figurées sont encore inconnues aux modernes, n'ayant point été ramenées aux dispositions systématiques par les derniers Voyageurs. Mais ce qui rend précieuses ces deux collections de *Rheede* et de *Rumphius*, c'est qu'ils ont les premiers, fait connoître plusieurs espèces utiles dans les Arts, la Médecine et l'Economie domestique.

S.

SABBATI *Hort. Rom.* Hortus Romanus secundùm Systema J. P. *Tournefortii*, à Nicolao-Martello SABBATI. *Romæ*, 1780; sept vol. in-folio, avec 700 Planches sur cuivre, renfermant 700 Figures enluminées, médiocres et bonnes.

Systématique orthodoxe ; Collecteur, Inventeur de quelques espèces, et Dénominateur ancien et nouveau.

L'*Hortus Romanus* nous fournit la preuve que des Botanistes occupant des chaires distinguées dans les plus grandes villes de l'Europe, et dirigeant des jardins magnifiques, n'ont pas toujours l'érudition nécessaire pour déterminer avec sûreté les espèces qu'ils ont sous les yeux. L'*Hortus Romanus* dans son plan général paroît être une production du 17e siècle. Les Rédacteurs n'ont connu ni la manière de philosopher de *Linné*, ni celle de ses contemporains, ni la véritable méthode de ramener leurs espèces à des genres bien circonscrits. Leur synonymie est souvent fautive, et leurs dénominations quelquefois peu exactes. Cependant cet Ouvrage incomplet relativement au Système de *Tournefort* que les rédacteurs ont suivi, présente un assez grand nombre de Plantes rares, mieux dessinées que coloriées.

SCHEUCHZ. *Gram.* Agrostographia *sive* Graminum, Juncorum, Cyperorum, Cyperoïdum, iisque affinium Historia, auctore Joanne SCHEUCHZERO. *Tiguri*, 1729 ; un vol. in-4°, premièrement avec 11 Planches sur cuivre, renfermant 179 Figures en noir, au trait, bonnes et caractéristiques ; secondement, huit Planches sur cuivre, renfermant 20 Figures d'espèces en noir, ombrées, bonnes.

Systématique orthodoxe ; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Avant cet Auteur, la nombreuse et difficile famille des *Graminées* étoit encore très-embrouillée. *G. Bauhin* l'avoit à peine ébauchée, dans le premier vol. de son *Theatrum Botanicum*. Son frère *J. Bauhin* ne lui étoit pas supérieur dans cette classe, ni pour les descriptions ni pour les Figures. Les *Graminées* les

plus vulgaires d'Europe étoient à peine décrites. Nous ne possédions aucune Figure exacte de la plupart des espèces. *Loësel*, *Barrelier* et *Monti* en avoient fait connoître et dessiner un grand nombre ; mais il étoit réservé à *Scheuchzer* de les tous examiner à neuf, de disséquer les parties de la fructification de chaque espèce, d'exprimer ces parties par des mots techniques, d'en faire dessiner les principales différences.

Le seul défaut qu'on puisse reprocher à cet infatigable Graministe, c'est de n'avoir pas su distinguer les descriptions naturelles d'avec les descriptions caractéristiques. En effet, plus les familles des Plantes sont naturelles, c'est-à-dire plus ces Plantes se ressemblent, non-seulement par les principales parties de la fructification, mais encore par la racine, les feuilles, les fleurs, etc. moins l'on doit se piquer d'énoncer pour chaque espèce, la forme, la situation et la grandeur de chaque partie, c'est-à-dire les attributs qui sont communs à toute la famille. Les descriptions naturelles rendent la lecture de *Scheuchzer* très-fastidieuse.

* SCHŒF. *Fung.* Joannis-Christiani SCHŒFFER Fungorum qui in Bavariâ et in Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur, Icones nativis coloribus expressæ. *Ratisbonæ*, 1761 et 1762 ; deux vol. in-4°, avec 200 Planches sur cuivre, renfermant 1146 Figures coloriées, bonnes.

Systématique orthodoxe ; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

L'Ouvrage de *Schœffer* sur les Champignons d'Allemagne, est le plus grand travail exécuté sur cette partie très-obscure de la Botanique. *Linné* avoit désespéré de pouvoir jamais déterminer avec justesse, dans cette famille des Cryptogames, ce qui est espèce et variété. En effet, les différens temps d'accroissement, sur-tout les compressions que les Champignons éprouvent dans leur développement, les différentes couleurs qu'ils acquièrent suivant le terrain, les divers degrés de chaleur, de froid, d'humidité et de sécheresse, parurent à *Linné* si considérables, qu'il regarda comme variétés cette multitude d'espèces reconnues et adoptées par ses successeurs et ses contemporains.

Schœffer, sans s'inquiéter beaucoup des dogmes de *Linné* à cet égard, fit dessiner et colorier tous les Champignons qu'il avoit observés en Allemagne, pour peu qu'il leur reconnût quelque différence relative à la grandeur, à la forme et à la couleur ; ce qui porta les prétendues espèces des environs de Ratisbonne, à un nombre prodigieux, en le comparant avec les espèces reconnues par *Linné* dans toute l'Europe. Quoi qu'il en soit, les descriptions de *Schœffer* sont très-exactes et ses Figures excellentes. On auroit desiré que cet Auteur eût donné une synonymie pour les Champignons, travail essentiel qui auroit rendu son Ouvrage beaucoup plus utile, parce que sans ce travail important, on ne sait à quelle espèce de *Linné* ou autres Botanistes rapporter ses Figures.

Nous lui devons encore un Ouvrage utile, rédigé en faveur des élèves, intitulé : *Botanica expeditior*, *Ratisbonæ*, 1760, in-8.° Ce sont des Tables des genres Linnéens dont le texte est gravé, dans lesquelles on trouve une distribution méthodique et le signalement des genres exprimés par les seuls attributs caractéristiques, et disposés suivant la méthode combinée de *Rivin* et de *Tournefort;* savoir, la régularité et l'irrégularité de la corolle, et le nombre des pétales.

SCHKUHR *Carex*. Histoire des Carex ou Laiches, contenant la description et les Figures coloriées de toutes les espèces connues, et d'un grand nombre d'espèces nouvelles, par Chrétien SCHKUHR. *Leipzig*, 1802; un vol. in-4°, avec 54 Planches sur cuivre, renfermant 124 Figures, coloriées, bonnes et complètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

On desiroit depuis long-temps une monographie sur les *Carex*, et elle devenoit d'autant plus nécessaire que ce genre très-nombreux offre peu de différences saillantes pour constituer les véritables espèces. Ce qui rend leur détermination très-difficile, c'est que les épis mâles offrent un aspect et des formes très-différentes dans les divers temps de leur développement. L'Ouvrage de *Schkuhr* ne laisse presque rien à desirer. Ses descriptions sont très-détaillées, et portent sur des attributs vraiment caractéristiques. Les parties de la fructification sont dessinées séparément et souvent grossies à la loupe; en cela il a imité son prédécesseur *Leers*. Ses Figures présentent, toutes les fois qu'il est nécessaire, les *Carex* dans les différens états de leur développement, ce qui fait connoître combien les espèces de ce genre varient pour la forme des épis. Le traducteur qui nous a procuré en françois cet excellent Ouvrage, *G. F. de la Vigne*, l'a non-seulement enrichi de notes précieuses, mais encore de plusieurs espèces nouvelles.

SCHMID. *Icon.* Icones Plantarum et Analyses partium æri incisæ atque vivis coloribus insignitæ, etc. quas composuit Casimirus-Christophorus SCHMIDEL, editio 2, curante *Valentino Bischoff*. *Norimbergæ*, 1782; un vol. in-fol. avec 25 Planches sur cuivre, renfermant 28 Figures d'espèces, coloriées, bonnes et complètes, excepté celle de la Planche 23; et 519 Figures pour les parties de la fructification.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Les fascicules de *Schmidel* offrent en général les plus grands détails sur les différentes parties des espèces qu'il a illustrées, et une foule d'observations neuves sur quelques *Cryptogames*. Si cet Auteur avoit traité un genre ou deux de chaque famille naturelle, comme le *Martynia annua*, le *Nolana prostrata*, le *Polygala Chamæbuxus*, etc. nous possé-

derions assez de détails, surtout sur les parties de la fructification, pour déduire des corollaires très-lumineux relativement à l'organisation des végétaux. Nous devons encore à cet Auteur une édition très-soignée des Ouvrages posthumes du grand *Gesner*, publiée après sa mort. Ses voyages en France, en Italie, etc. sont très-intéressans par une multitude d'annotations sur les productions naturelles des pays qu'il a parcourus.

SCOPOL. *Carn.* Joannis-Antonii Scopoli Flora Carniolica, exhibens plantas Carnioliæ indigenas. *Vindobonæ*, 1772; deux vol. in-8°, avec 65 Planches sur cuivre, renfermant 87 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes; et 1645 Plantes rangées selon le Système sexuel.

Ejusdem Delic. Fl. Deliciæ Floræ et Faunæ Insubricæ, *seu* novæ aut minus cognitæ species Plantarum et Animalium, quas in Insubriâ Austriacâ tàm spontaneas, quàm exoticas vidit, descripsit et æri incidi curavit Joannes-Antonius Scopoli. *Ticini*, 1786; trois vol. in-folio, avec 75 Planches sur cuivre, dont 53 relatives à la Botanique, renferment 57 Figures en noir, ombrées, bonnes et complètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Scopoli a été un de ces Naturalistes assez courageux pour étudier avec succès, non-seulement toutes les branches de l'Histoire naturelle, mais encore pour en aviver les principales parties, sur-tout la Minéralogie, par des connoissances profondes en chimie. Considéré comme Botaniste, nous lui devons plusieurs Ouvrages remplis de vues et d'observations neuves.

Dans les uns, comme sa première édition du *Flora Carniolica*, et dans son esquisse du Système végétal, l'Auteur s'est attaché à tracer le plan d'une méthode naturelle. Dans la seconde édition du *Flora Carniolica*, il a adopté le Système de *Linné*, mais avec des modifications considérables relativement à la formation des genres. C'est principalement ce dernier Ouvrage qui rend *Scopoli* recommandable aux Amateurs. Dans ses genres, il a indiqué le plus souvent les observations dues aux plus célèbres Systématiques, tels que *Tournefort*, *Linné*, *Haller*, *Adanson*, etc. Dans le signalement des espèces, il ne s'est pas contenté de transcrire les phrases caractéristiques de *Linné*, *Haller*, etc.; mais sous le titre de *Diagnostique*, il a présenté fréquemment d'autres caractères plus faciles à saisir, et qui signalent très-bien l'espèce à déterminer. Toutes les espèces neuves ou obscures sont décrites avec précision et vérité. Ses Figures sont assez exactes pour faire reconnoître la plante.

On trouve encore des vues précieuses et des observations neuves, dans ses Ouvrages intitulés : *Fundamenta botanica*; *Anni medici*; *Plantæ Insubricæ*.

Dans ce dernier Ouvrage, par lequel il a terminé sa carrière littéraire, *Scopoli* s'étoit proposé de donner les Figures et les descriptions de toutes les productions naturelles, soit du Jardin et du Musée de Pavie, soit celles qui sont indigènes dans les environs de cette ville, en considérant ces productions comme nouvelles ou comme n'ayant point encore été décrites et figurées suivant les règles de l'art. La partie la plus neuve de cet Ouvrage et qui a été peu imitée, nous offre d'excellentes observations sur les cotylédons des Plantes qu'il a décrites.

SEG. *Ver.* Plantæ Veronenses *seu* Stirpium quæ in agro Veronensi reperiuntur, methodica Synopsis, auctore Joanne-Francisco SEGUIERO. *Veronæ*, 1745; 2 vol. in-8, avec 17 Planches sur cuivre, renfermant 54 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

* *Ejusd. Suppl.* Plantarum quæ in agro Veronensi reperiuntur, Supplementum *seu* volumen tertium, operâ Jo. Francisci SEGUIERI. *Veronæ*, 1754; un vol. in-8°, avec 8 Planches sur cuivre, renfermant 28 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes. La quinzième Planche du second volume et la huitième du Supplément, renferment les figures caractéristiques des *Orchidées*.

Systématique orthodoxe; Descripteur, et Dénominateur ancien.

Seguier a joui pendant sa longue vie d'une très-grande réputation, comme Antiquaire et comme Naturaliste. A ces deux titres, il étoit en correspondance suivie avec les plus savans hommes de l'Europe. Ayant long-temps voyagé avec le respectable marquis *de Maffey* dans les différentes parties de l'Europe, il ne laissa échapper aucune occasion d'augmenter ses connoissances sur ces deux sciences favorites. Pendant son séjour à Lyon, il fit connoître aux Antiquaires de cette ville une foule de monumens, sur-tout d'inscriptions qu'il sut découvrir jusques dans les caves des particuliers. C'est dans ses voyages qu'il recueillit les matériaux de sa *Bibliothèque botanique*, le premier Ouvrage de ce genre, après les Essais de *Gesner*. Pendant son long séjour à Vérone, il ne cessa d'herboriser dans cette partie féconde de l'Italie, et sur-tout sur le mont Baldi.

Ses excursions botaniques nous ont procuré son Ouvrage intéressant, intitulé *Plantæ Veronenses*, dans lequel il a disposé les plantes de cette région, selon le Système de *Tournefort*, un peu modifié d'après celui de *Rivin*. Ce premier Essai offre plusieurs observations neuves pour la formation des Genres, et un assez grand nombre d'espèces nouvelles bien décrites et dessinées correctement par l'Auteur. Il avoit préparé un bien plus grand nombre de dessins, mais les frais de gravure l'empêchèrent de les publier.

Retiré dans sa patrie, à Nismes, il ne cessa jusqu'à sa mort d'her-

boriser autour du terroir de cette ville, si fécond en plantes médicinales. Son cabinet disposé avec goût, étoit sur-tout remarquable par les empreintes des poissons trouvés sur une montagne aux environs de Vérone. Ses herbiers offroient une suite complète des Plantes de nos provinces méridionales. Il auroit pu rédiger une excellente Flore pour les environs de Nismes, mais il se contenta de communiquer toutes les espèces neuves qu'il avoit découvertes, à ses amis *Sauvages*, *Cusson* et *Gouan*, qui l'ont fréquemment cité avec éloge. Ses immenses collections en antiquités, histoire naturelle, et sa belle bibliothèque, si riche en livres rares de Botanique, sont devenus par son testament la propriété de l'Académie de Nismes, dont il étoit un des membres les plus laborieux.

SLOAN. *Jam.* Voyages to the Islands Madera, Barbadas, Nieves, St. Christhopheus and Jamaïca with the natural History, by HANS-SLOANE. *London*, 1707; deux vol. in-folio, avec 274 Planches sur cuivre, renfermant 490 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes. Sur ces 274 Planches, il y en a environ 60 qui représentent des oiseaux, des poissons, des insectes, des corallines, etc.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Hans-Sloane a été un des Naturalistes les plus passionnés. Il avoit employé non-seulement son patrimoine, mais encore tout le produit d'une pratique très-nombreuse et très-lucrative à Londres, à assembler une des plus riches bibliothèques en Histoire naturelle, et les collections les plus nombreuses pour son temps. Il avoit jeté les fondemens de son cabinet et recueilli ses premières observations à la Jamaïque; et ce qui est surprenant, c'est qu'il y ait pu rassembler autant de faits et autant de productions naturelles pendant un séjour aussi peu prolongé. *Sloane* légua sa bibliothèque, ses herbiers et ses collections d'Histoire naturelle, à la Société royale de Londres. A ce titre et par ses différens Ouvrages l'immortalité lui est justement acquise.

T.

* TABERNA. *Hist.* Jacobi-Theodori TABERNÆMONTANI Historia Plantarum Germanica, tribus partibus edita. *Francofurti*, 1588; deux vol. in-folio, avec 2087 Figures sur bois, en noir, ombrées, mauvaises, médiocres et bonnes.

Inventeur, Descripteur, et Collecteur.

Tabernamontanus peut être considéré comme compilateur et comme inventeur. Son Ouvrage rédigé en allemand en deux vol. in-folio, ne présente pas autant de Figures que de notes descriptives; cependant c'est une des plus grandes collections de Botanique. *G. Bauhin*, en publiant la seconde édition de cet Ouvrage, y ajouta quelques notes et quelques synonymes. Son frère *J. Bauhin* a souvent critiqué

Tabernamontanus avec amertume, le traitant de compilateur ignorant Il lui reproche avec raison d'avoir multiplié les Figures d'une même espèce, relativement à des différences accidentelles de couleur ou de grandeur ; cependant cet Ouvrage est devenu nécessaire à tout Botaniste, 1.° parce qu'il offre des copies exactes des meilleures Figures des Anciens ; 2.° parce qu'il nous présente au moins une centurie d'espèces Européennes dont on n'avoit auparavant que de très-mauvaises Figures et même un assez grand nombre de Dessins absolument neufs. Les Botanistes modernes citent rarement le grand Ouvrage de *Tabernamontanus* rédigé en allemand, ils préfèrent de citer l'édition format in-4° oblong qui n'offre que les Figures et leur nomenclature.

THAL *Herc.* Sylva Hercinica *sive* Catalogus Plantarum sponte nascentium in montibus et locis vicinis Herciniæ Sylvæ à Joanne THALIO conscriptus. *Francofurti ad Mœnum*, 1588 (à la suite du Camerarii Hortus) ; un vol. in-4°, avec 9 Planches sur bois, renfermant 12 Figures en noir, ombrées, bonnes et en partie complètes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Ce Catalogue de *Thal* est sur-tout remarquable par l'étonnante quantité d'espèces de Plantes qu'il a indiquées, comme les *Hieracia ; de Haller* qui avoit parcouru avec soin la même forêt, n'a pu les ramener toutes aux Espèces modernes connues.

THEAT. *Flor.* Theatrum Floræ. *Lutetiæ Parisiorum*, 1633 ; un vol. in-folio, avec 69 Planches sur cuivre, renfermant 262 Figures en noir, ombrées, bonnes et incomplètes.

Cet Ouvrage présente de très-bonnes Figures de toutes les plantes coronaires ou d'agrément introduites dans les jardins de Paris sous le règne de *Louis XIII.* Parmi ces Figures on doit sur-tout remarquer celle de l'*Amaryllis formosissima*, L. qui est une des plus correctes et des plus exactes.

THOUIN l'aîné, Directeur du Jardin Botanique de Paris, a publié d'excellens articles sur la culture des Plantes dans l'Encyclopédie méthodique. L'aménité de son caractère et la générosité avec laquelle il procure à tous les Botanistes de l'Europe des semences et des plants vifs, lui ont obtenu l'amitié et l'estime de tous ceux qui correspondent avec lui. Ce Botaniste pourroit seul nous donner en françois un travail analogue à celui de *Miller*, sur les meilleures méthodes de cultiver les Plantes exotiques. Les savantes leçons qu'il donne à ses Élèves, sont un sûr garant de notre assertion.

THUIL. *Par.* Flore des environs de Paris, ou distribution méthodique des plantes qui y croissent naturellement, par J. L. THUILLIER, Botaniste. *Paris*, 1798 (an VII) ; un vol. in-8°, sans figures, renfermant 1418

Plantes disposées selon le système de *Linné*. L'Auteur a promis la Cryptogamie.

Systématique orthodoxe.

On ne devoit guères espérer, après les recherches de *Tournefort*, *Vaillant*, *Dalibard*, *Bulliard*, etc. que les environs de Paris pourroient fournir à notre Auteur de nouvelles espèces. Cependant son catalogue en présente un grand nombre, même de celles qui par leur grandeur ne sont pas supposées avoir pu échapper à la sagacité des premiers Observateurs. Mais ce qui peut résoudre cette difficulté, c'est que nous nous sommes assurés par les observations des Botanistes Lyonnois, que chaque Flore présente des variations accidentelles, causées par les inondations des rivières, par les vents impétueux, par le passage annuel des oiseaux pendant leurs migrations, qui procurent et disséminent des graines amenées souvent de très-loin. Cette Flore de Paris, telle que l'ont proposée *Vaillant* et *Thuillier*, offre certainement un très-grand nombre d'espèces; mais sa richesse ne nous paroît pas fondée, vû la grande étendue de terrain que ces Botanistes ont indiqué: ils portent leurs prétentions à plus de trente lieues de cordon.

THUNB. *Jap.* Caroli-Petri THUNBERG Flora Japonica, sistens Plantas insularum Japonicarum secundùm Systema sexuale emendata. *Lipsiæ*, 1784; un vol. in-8°, avec 39 Planches sur cuivre, renfermant 39 Figures en noir, ombrées, bonnes et incomplètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Cet Auteur seroit regardé comme le disciple le plus légitime de *Linné*, s'il avoit suivi avec plus de rigueur les dogmes de son maître. Les réformes qu'il a faites dans le Système sexuel et qui ont été adoptées par *Gmelin* dans son *Systema Naturæ*, et par *Haenck* dans son *Genera*, n'ont pas été approuvées par les vieux Botanistes, accoutumés à la disposition méthodique de *Linné*, telle qu'il l'avoit proposée. D'après cette réforme de *Thunberg*, les Genres du dernier Ordre de la Syngénésie, savoir la *Monogamie*, sont distribués dans la Pentandrie; les Gynandres, les Monoïques, Dioïques et Polygames rentrent dans les différentes Classes formées par le nombre des étamines. On peut cependant avouer que cette réforme est avantageuse, en ce qu'elle facilite et simplifie les recherches des Élèves. Mais ce qui assure à *Thunberg* une place distinguée parmi les Inventeurs, ce sont ses monographies qui présentent un grand nombre d'espèces neuves très-bien caractérisées et parfaitement décrites.

TILL. *Pis.* Catalogus Plantarum Horti Pisani, auctore Michaele-Angelo TILLI. *Florentiæ*, 1723: un vol. in-folio, avec 50 Planches sur cuivre, renfermant 87 Figures en noir, ombrées, médiocres; et 4073 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Ce Catalogue offre un si grand nombre de plantes, qu'on peut douter qu'elles aient toutes existé en même temps dans le Jardin de Pise. Mais ce qui le rend précieux, ce sont les Figures de plusieurs plantes exotiques et de quelques plantes indigènes d'Italie, qui sont très-exactes, et dont plusieurs sont neuves et originales.

TOURN. *Inst.* Josephi PITTON DE TOURNEFORT Institutiones Rei herbariæ. *Lugduni*, 1719, (sur l'édition de Paris, avec le corollaire à la fin du troisième volume); trois vol. in-4°, avec 489 Planches sur cuivre, renfermant 743 Figures de Genres, en noir, ombrées, bonnes.

Les onze premières Tables représentent les diverses parties des fleurs, telles que le calice, la corolle, les étamines, le pistil, les différentes formes de corolle; et les Tables 338, 339, 340, 341 et 342, figurent des corallines, coraux, madrépores, lythophytes, orgues de mer, éponges.

Ejusd. Voy. au Lev. Relation d'un Voyage du Levant fait par ordre du Roi, etc. par PITTON DE TOURNEFORT. *Paris*, 1717; deux vol. in-4°, avec 49 Planches sur cuivre, relatives à la Botanique, renfermant 49 Figures en noir, ombrées, bonnes et complètes.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

La méthode de *Tournefort* aura toujours un grand avantage sur celle de ses successeurs, étant aussi ingénieuse que celle de *Linné*, mais beaucoup plus simple dans son développement, et conduisant l'Élève aux notes caractéristiques de chaque Genre par des comparaisons d'objets qui sont familiers à tous les hommes. Quoique méthode mixte, elle présente un très-grand nombre de Familles naturelles et de Genres primitifs fondamentaux. Tous les Savans conviennent de la première assertion, mais on n'a peut-être pas fait assez d'attention à la seconde : les *Renoncules*, les *Alsines*, les *Lychnidées*, etc. en fournissent la preuve.

Si on considère les bornes très-limitées de la mémoire du plus grand nombre des Savans, peut-être connoîtra-t-on que les *Institutes* de *Tournefort* présentent le cadre des véritables connoissances botaniques, absolument nécessaires pour ceux qui, guidés par une sage logique, ont le courage de se borner à la connoissance des plantes Européennes et des plantes exotiques qui, considérées comme curieuses, doivent fixer leur attention. Dans cette hypothèse, en considérant la méthode de *Tournefort*, augmentée ou perfectionnée par *Plumier*, *Micheli* et *Dillen*, les Amateurs qui auroient fixé ainsi leurs prétentions d'après leurs besoins réels, ne trouveront-ils pas dans ces quatre Auteurs réunis, toutes les connoissances qui peuvent constituer un véritable Botaniste, sur-tout si les faits et les observations qu'ils auront puisés dans ces Auteurs, relativement aux plantes

qu'ils ont indiquées, sont vérifiées de nouveau par la concordance de ses connoissances, avec le Système de *Linné*, et avec les observations de ce grand homme sur les Genres et les Espèces déjà proposés par *Tournefort?*

Obs. Il a été tiré quelques exemplaires du Voyage de *Tournefort* au Levant sur papier fin; on les connoît à un petit point placé à côté des signatures au bas de chaque page, figuré ainsi qu'il suit : .A .B .C, etc.

Les éditions de l'Imprimerie Royale sont distinguées par les deux caractères suivans : 1.° par une petite ligne qui occupe le centre extérieur de chaque l minuscule; 2.° par de petits traits horizontaux qui bordent par en haut et par en bas certaines lettres minuscules, comme b, d, h, i, k, l, m, n, p, q, r, fi. Ces traits qui terminent les six premières lettres que nous citons, passent horizontalement de l'un et de l'autre côté de la tige, les cinq autres commencent par un demi-trait aussi horizontal; au lieu que les mêmes lettres d'usage en Europe, commencent par un petit trait incliné qui n'occupe que la partie gauche.

TRAG. *Histor.* Hieronimi TRAGI, Stirpium Historia. *Argentinæ*, 1552; un vol. in-4°, avec 560 Figures sur bois, au trait ou sans ombre, médiocres et bonnes.

Inventeur et Descripteur.

L'Ouvrage de *Tragus*, publié en allemand, fut traduit en françois par *David Kiber*. Ses Figures sont en partie calquées sur celles de *Brunsfeld* et de *Fuchs*; mais il offre plusieurs plantes originales dont il est l'inventeur. Il en a même décrit brièvement, de manière cependant à les reconnoître, environ 140, la plupart indigènes en Allemagne, dont il n'a point publié de Figures, et qu'il a le premier reconnues : à ce titre on a eu raison de le placer parmi les Inventeurs. Ce qui rend son Ouvrage précieux, c'est qu'il a déterminé les propriétés de plusieurs plantes indigènes, telles que les Médecins modernes les plus sceptiques les ont reconnues par de nombreuses observations.

V.

VAILL. *Bot.* Botanicon Parisiense, *ou* Dénombrement par ordre alphabétique des Plantes qui se trouvent aux environs de Paris, par Sébastien VAILLANT. *Leyde* et *Amsterdam*, 1727; un vol. in-fol. avec 33 Planches sur cuivre, renfermant 355 Figures en noir, ombrées, bonnes et en grande partie complètes; et 2357 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Systématique orthodoxe; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

On l'a déjà dit, la plupart des Auteurs se peignent sans le savoir dans leurs Ouvrages. C'est ce qu'on remarque sur-tout dans ceux de *Vaillant*. Ses notes critiques annoncent un caractère difficile et ombrageux; mais ce qu'on ne lui pardonnera jamais, c'est d'avoir dirigé sa censure avec une aigreur prononcée contre son

son maître *Tournefort*, à qui il avoit de si grandes obligations.

Quelque estimable qu'il soit, sa gloire comme inventeur seroit plus pure, si on n'avoit pas ce reproche à lui faire. Quoi qu'il en soit de son caractère, on ne peut lui refuser une grande sagacité dans ses observations, des vues profondes sur la disposition méthodique des plantes qu'il avoit peu à peu rapprochées de la véritable méthode naturelle, telle que les modernes l'ont conçue. Il avoit très-bien reconnu que plusieurs Genres de *Tournefort* étoient mal placés, comme les *Convallaria* qui devoient être portés dans la Classe des *Liliacées;* que les Genres trop nombreux des *Renoncules* de *Tournefort* devoient être divisés en plusieurs, comme *Ranunculus*, *Alisma*, *Sagittaria*, *Myosurus*. Les Genres des Fleurs composées sont mieux constitués que ceux de *Tournefort*, et portent sur des observations beaucoup plus détaillées.

Contemporain de *Dillen*, il a le premier, sans avoir eu connoissance de ses recherches sur les *Cryptogames*, déterminé, décrit et figuré une multitude de Mousses inconnues à ses prédécesseurs. On peut même dire que ses Figures présentant, grossies à la loupe, les parties caractéristiques des *Cryptogames*, comme les feuilles, l'urne et la coiffe, offrent plus de facilité pour reconnoître les espèces que celles de *Dillen*. Aussi *de Haller* qui, de l'aveu de *Linné*, avoit fait de très-grands progrès dans la connoissance de ces plantes obscures, avoue que, sans les Figures de *Vaillant*, il n'auroit pas eu le courage d'étudier avec soin les différentes espèces de Mousses : *duce Vaillantio, in difficillimâ Muscorum classe, glaciem fregi.*

*VAN-ROY. *Fl. Leyd.* Adriani Van Royen Floræ Leydensis Prodromus, exhibens plantas quæ in Horto academico Lugduno-Batavo aluntur. *Lugduni-Batavorum*, 1740; un vol. in-8°, sans Figures.

Systématique orthodoxe, et Dénominateur nouveau.

Quoique nous n'ayons point cité cet Ouvrage de *Van-Royen*, cependant comme *Linné* a adopté plusieurs de ses phrases spécifiques, et quelques Genres qu'il a constitués, nous croyons devoir en faire mention.

Van-Royen, successeur de *Boerrhaave* dans la direction du Jardin de Leyde, avoit beaucoup connu *Linné* pendant son séjour en Hollande, et il paroît qu'il s'étoit familiarisé avec la méthode de recherche et de nomenclature de ce Réformateur moderne. Le Système de *Van-Royen* est après celui de *Ray*, celui qui peut être dénommé *Méthode naturelle*. Nous devons à cet Auteur quelques Genres nouveaux et plusieurs Espèces rares nouvellement introduites dans les jardins de Hollande, qu'il a signalées par des phrases caractéristiques, rédigées d'après les lois de la *Philosophia botanica;* et s'il ne les a point décrites, son Ouvrage n'étant qu'un *Prodromus*, c'est qu'il se proposoit de les publier

séparément avec des descriptions détaillées et des Figures.

VESL. *ad Alp.* Joannis VESLINGII de Plantis Ægyptiis Observationes et Notæ ad Prosperum ALPINUM ; un vol. in-4°, imprimé à la suite du *Prosperi Alpini de Plantis Ægypti*, avec 23 Planches sur cuivre, renfermant 23 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

Inventeur.

VENTEN. *Reg. vég.* Tableau du Règne végétal, selon la méthode de *Jussieu*, par C. P. VENTENAT. *Paris*, an VII ; quatre vol. in-8°, avec 24 Planches sur cuivre, renfermant 110 Figures de Genres, en noir, ombrées, bonnes.

Systématique orthodoxe ; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Nous devons à cet Auteur une excellente Introduction à la Méthode naturelle de *Jussieu*, et une traduction très-exacte de son *Genera*. Son Ouvrage présente même une amélioration précieuse pour la coordination de la méthode naturelle. Mais ce qui placera *Ventenat* au rang des Botanistes qui ont véritablement reculé les bornes de la science, ce sont les excellentes monographies des nouvelles espèces de plantes des Jardins de Cels, etc. Ses descriptions et ses figures peuvent lutter avec avantage contre les meilleures publiées de nos jours, même contre celles de l'*Héritier*, qui étoient sans contredit les plus parfaites.

VILL. *Hist. des Pl.* Histoire des Plantes du Dauphiné, par VILLARS. *Grenoble*, 1787 ; trois vol. in-8°, avec 55 Planches sur cuivre, renfermant 225 Figures en noir, ombrées.

Systématique orthodoxe ; Inventeur, Descripteur, et Dénominateur nouveau.

Les hautes Alpes du Dauphiné avoient déjà été parcourues par les plus célèbres Botanistes, les *l'Écluse*, *Daléchamp*, *Bauhin*, *Ray*, *Barrelier*, *Belleval*, etc. qui avoient indiqué, décrit et fait graver un très-grand nombre de plantes rares propres à ces montagnes. Dès 1769, *Allioni*, *Clapier*, *Liotard*, avoient parcouru avec succès les chaînes des hautes Alpes de cette province, les plus difficiles et les plus escarpées. Les espèces neuves qu'ils avoient découvertes, avoient été communiquées à plusieurs savans Botanistes de la capitale et de Montpellier. *Lamarck* dans sa Flore Françoise, en avoit indiqué un grand nombre qui lui avoient été communiquées par *Liotard* ; mais toutes ces indications réunies ne présentoient point encore la véritable Flore Delphinale. *Villars* en conçut le plan en 1770, et pour le remplir, il eut le courage, favorisé par deux Intendans de la province, de parcourir en véritable observateur, non-seulement toutes les plaines de la vaste province du Dauphiné, mais encore de faire des herborisations suivies et méthodiques non-seulement sur les montagnes qui avoient déjà été visitées par les Botanistes ci-dessus dénommés, mais encore sur plusieurs autres que l'on pouvoit regarder comme vierges. Aidé par les observations analogues du curé

Chaix de Gap, il fut en état en 1786 de publier l'*Histoire des Plantes du Dauphiné*. Comme il étoit nourri par la lecture des meilleurs Auteurs, il se proposa dans la rédaction de cet Ouvrage d'imiter la manière des plus célèbres. 1.° Il donna une nouvelle tournure au Système de *Linné* pour se ménager les moyens de conserver le plus grand nombre des Familles naturelles. 2. Étayé par de nouvelles observations, il crut devoir faire quelques réformes à un certain nombre de Genres de cet Auteur. 3.° A l'imitation de *Haller*, il s'efforça de rendre ses descriptions caractéristiques, ne présentant que les attributs propres à chaque espèce. 4.° D'après le plan de *J. Bauhin*, il discuta pour le plus grand nombre des Espèces, et sur-tout pour celles qui lui parurent obscures, la synonymie de ses prédécesseurs. 5.° Ayant rassemblé un très-grand nombre d'individus des Espèces obscures, il crut trouver dans quelques-uns des formes assez différentes pour en constituer de nouvelles Espèces. Enfin, pour compléter son travail, il signala les Espèces utiles ou nuisibles, en indiquant leurs véritables propriétés. Les Espèces très-rares ou qu'il crut nouvelles, furent dessinées par ses soins. Cet Ouvrage fut accueilli avec empressement par tous les Botanistes; et ce qui prouve que l'Auteur a bien rempli son plan, c'est que tous ceux qui ont travaillé après lui, le citent avec éloge. Et si quelques-uns lui ont disputé l'existence réelle de plusieurs de ses Espèces neuves, il n'est pas moins vrai qu'en ne les supposant pas réelles, elles constitueront toujours des variétés qu'il étoit important de signaler, vû qu'elles présentent des attributs assez saillans pour les éloigner plus ou moins du type des Espèces. Nous pouvons même ajouter que des recherches plus suivies et plus minutieuses des plantes qui croissent spontanément dans nos plaines, comparées avec celles des différentes chaînes des hautes montagnes qui leur ressemblent le plus, pourront prouver un jour que telle Espèce des hautes Alpes descendant dans les plaines et s'y naturalisant, acquiert ou perd par l'influence du nouveau climat et du nouveau sol, des attributs qui ont servi jusqu'à présent à constituer les espèces. Cette vérité a déjà été établie d'une manière incontestable par *Ludwig* qui, examinant avec rigueur une foule d'espèces développées dans son jardin à Leipzig, provenant des plantes d'Afrique qu'il avoit cueillies dans leur lieu natal, les trouva tellement changées, même dans les attributs mécaniques, qu'il n'hésita pas d'annoncer que toute figure et description des plantes exotiques faites dans les jardins d'Europe, (ce qui n'est que trop arrivé) donneroit lieu par la suite à la création d'une multitude de prétendues nouvelles Espèces.

VOLK. *Flor. Norimb.* Flora Noribergensis *sive* Catalogus Plantarum in agro Noribergensi tàm spontè nascentium, quàm exoticarum, etc. operâ et labo.e

Joannis – Georgii VOLKAMERII. *Noribergæ*, 1700; un vol. in-4°, avec 25 Planches sur cuivre, renfermant 25 Figures en noir, ombrées, bonnes et incomplètes; et 2203 Plantes rangées par ordre alphabétique.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

Les Amateurs recherchent cet Ouvrage non-seulement pour les figures de quelques Plantes exotiques que cet Auteur a le premier fait dessiner, mais encore pour les caractères génériques qu'il a rédigés d'après les premiers Méthodistes, savoir *Hermann*, *Morison*, *Rivin*, *Ray*, etc. En général sa Synonymie est assez exacte.

Z.

ZANN. *Hist.* Jacobi ZANNONII rariorum Stirpium Historia, (édition de Monti). *Bononiæ*, 1742; un vol. in-folio, avec 185 Planches sur cuivre, renfermant 211 Figures en noir, ombrées, médiocres et bonnes.

Inventeur, Descripteur, et Dénominateur ancien.

L'Ouvrage de *Zannoni*, publié d'abord en italien, et long-temps après en latin, avec des additions considérables par *Monti*, est devenu nécessaire aux Amateurs, plutôt pour les Plantes rares d'Italie, dont il a donné le premier de bonnes descriptions et d'excellentes figures, que pour les exotiques, dont les dessins lui avoient été fournis par un Missionnaire Capucin, et qui la plupart sont encore aujourd'hui indéterminées.

AUTEURS dont les Ouvrages ne sont pas venus à notre connoissance, et dont nous n'avons cité les Figures que d'après Reichard.

† ARDUINI Animadversationum Botanicarum Specimen, etc.

BROWN Plantæ Jamaïcenses, etc.

BURMANN Flora Indica, etc. Ejusd. *Gerania.*

EHRET Icones, etc.

GUNNER Flora Norwegica, etc.

MARCG. Brasil. etc.

MARTYN Cent. etc.

RIVIN Monopetala, etc.

SCHAW Afric.

SCHREBER Decad.

WALTHER Hortus.

Nous prévenons les Lecteurs que nous n'avons cité dans notre Table alphabétique des Auteurs de Botanique, que les éditions que nous avons pu vérifier nous-mêmes, notre intention n'ayant point été de publier une bibliothèque Botanique.

Fin de la dixième Table.

TABLE ONZIÈME.

TABLE CHRONOLOGIQUE

DES Auteurs de Botanique cités dans le Système des Plantes.

NOMS des Auteurs.	LEUR Patrie.	ANNÉES de leur Naissance.	ANNÉES de leur Mort.	DURÉE de leur Vie.
BRUNSFELD . . .	*Allemand.* .	. . . . .	1534	. . . .
TRAGUS.	*Allemand.* .	1498	1554	56
MATTHIOLE	*Italien* . . .	1500	1557	57
FUCHS.	*Allemand.* .	1501	1566	65
DALÉCHAMP . . .	*François* . .	1513	1588	75
GESNER (Conrad)	*Suisse.* . . .	1516	1565	49
DODOENS.	*Flamand* . .	1517	1585	68
TABERNAMONTANUS .	*Allemand.* .	. . . . .	1590	. . . .
L'ÉCLUSE.	*Flamand* . .	1526	1609	83
CAMERARIUS . . .	*Allemand.* .	1534	1598	64
ALDROVANDE. . .	*Italien* . . .	. . . . .	1605	. . . .
LOBEL.	*Flamand* . .	1538	1616	78
ALPIN (Prosper)	*Italien* . . .	1553	1616	63
COLUMNA.	*Italien* . . .	1567	1650	83

NOMS des Auteurs.	LEUR Patrie.	ANNÉES de leur Naissance.	ANNÉES de leur Mort.	DURÉE de leur Vie.
BAUHIN (Jean). .	*Né à Lyon, domicilié en Suisse.*	1541	1613	72
BAUHIN (Gaspard)	*Né en Suisse, originaire de Lyon.*	1560	1624	64
BELLEVAL.	*François* . .	. . . . .	1632	. . .
PONA	*Italien* . . .	1594	. . . . .	. . .
VESLINGIUS. . . .	*Allemand.* . .	1598	1649	51
BARRELIER. . . .	*François* . .	1606	1673	67
MARCHAND	*François* . .	. . . . .	1678	. . .
LOESEL	*Prussien* . .	1607	. . . . .	. . .
ZANNONI	*Italien* . . .	1615	1682	67
VOLKAMER	*Allemand.* . .	1616	1693	77
MORISON.	*Anglois.* . . .	1620	1683	63
MENTZEL.	*Prussien* . .	1622	1701	79
MUNTINGIUS. . .	*Hollandois.*	1626	1683	57
RAI.	*Anglois.* . . .	1626	1705	79
RUMPHIUS. . . .	*Hollandois.*	1627	1706	79
COMMELIN (Jean)	*Hollandois.*	1629	1692	63
KÆMPFER.	*Allemand.* . .	1631	1716	85
MAPPI	*Allemand.* . .	1632	1701	69
DODARD.	*François* . .	1634	1707	73

Noms des Auteurs.	Leur Patrie.	Années de leur Naissance.	Années de leur Mort.	Durée de leur Vie.
Rheede	*Hollandois*.	1635	1691	56
Breyn	*Flamand, établi en Pologne.*	1637	1697	60
Magnol	*François* . .	1638	1715	77
Hermann (Paul)	*Saxon*. . . .	1640	1695	55
Scheuchzer . . .	*Suisse*	1641	1738	97
Plukenet.	*Anglois*. . .	1642	. . . . .	. . . .
Plumier.	*François* . .	1646	1706	60
Nissole.	*François* . .	1647	1735	88
Rivin.	*Allemand*. .	1652	1723	71
Tilli	*Italien* . . .	1653	1740	87
Tournefort. . .	*François* . .	1656	1708	52
Buxbaum	*Allemand*. .	. . . . .	1729	. . . .
Garidel.	*François* . .	1659	1737	78
Sloane (Hans)	*Anglois*. . .	1660	1752	92
Boccone	*Italien* . . .	1663	1704	41
Petiver.	*Anglois*. . .	. . . . .	1718	. . . .
Commelin (Gaspar)	*Hollandois*.	1667	1731	64
Boerrhaave. . .	*Hollandois*.	1668	1738	70
Vaillant	*François* . .	1669	1722	53
Micheli.	*Italien* . . .	1679	1737	58

NOMS des Auteurs.	LEUR Patrie.	ANNÉES de leur Naissance.	ANNÉES de leur Mort.	DURÉE de leur Vie.
DILLEN.	*Anglois.* . .	1684	1747	63
JUSSIEU (Antoine).	*François* . .	1686	1758	72
CATESBY.	*Anglois.* . .	....	1749	...
TREW.	*Allemand.* .	1695	....	...
JUSSIEU (Bernard)	*François* . .	1699	1777	78
SCHAW	*Allemand.* .	....	1751	...
DUHAMEL	*François* . .	1700	1782	82
SEGUIER	*François* . .	1704	1780	76
VAN-ROYEN . . .	*Hollandois.*	1704	....	...
LINNÉ.	*Suédois* . . .	1707	1778	70
HALLER.	*Suisse.* . . .	1708	1777	69
LUDWIG	*Allemand.* .	1709	1780	71
LINNÉ fils	*Suédois* . . .	....	1783	45
GMELIN (Jean)	*Allemand.* .	1709	1775	66
OEDER	*Danois* . . .	....	1776	...
HILL.	*Anglois.* . .	1712	1780	68
SCHÆFFER	*Saxon.* . . .	1717	1787	70
DAMBOURNEY . .	*François* . .	1722	1795	73
SCOPOLI.	*Allemand.* .	1732	1786	54
LATOURRETTE. .	*François* . .	1729	1793	64

AUTEURS dont nous n'avons pu connoître les années de la naissance et de la mort.

NOMS.	PATRIE.
ALLIONI.	*Piémontais.*
AMMAN	*Russe.*
ARDUIN	. . . . .
AUBLET	*François.*
BROWN	*Anglois.*
BULLIARD	*François.*
BURMANN	*Hollandois.*
CORNUTUS	*Médecin à Paris.*
CRANTZ	*Allemand.*
DURANDE	*François.*
EHRET.	*Allemand.*
FEUILLÉE	*François.*
FORSKAL.	*Suédois.*
GLEDITSCH. . . .	*Prussien.*
GŒRTNER	*Suédois.*
GUNNER.	. . . . .
HASSELQUIST. . .	*Suédois.*
KNORR	*Allemand.*
LEERS.	*Allemand.*
LINDERN.	*Alsacien.*
MARCGRAVE . . .	*Allemand.*
MARTYN.	*Anglois.*
MILLER	*Anglois.*
MONTI.	*Italien.*
MORANDI	*Italien.*
POLLICH.	*Allemand.*
REICHARD. . . .	*Allemand.*
RENÉAULME . . .	*François.*
SABBATI.	*Italien.*
SCHMIDEL	*Allemand.*
SCHREIBER. . . .	*Allemand.*
THAIL.	. . . . .
WALTHER	. . . . .

AUTEURS VIVANS.

NOMS.	PATRIE.
BRIDEL.	*Genevois.*
CAVANILLES. . .	*Espagnol.*
DELARBRE. . . .	*François.*
DESFONTAINES. .	*François.*
GERARD.	*François.*
GILIBERT	*François.*
GISÈKE	*Suédois.*
GMELIN.	*Allemand.*
GOUAN	*François.*
HOFFMANN. . . .	*Allemand.*
JACQUIN.	*Flamand.*
JUSSIEU.	*François.*
LAMARCK	*François.*
MURRAI.	*Suédois.*
PEYRILHE. . . .	*François.*
ROEMER.	*Allemand.*
ROTH	*Allemand.*
ROTTBOEL. . . .	*Allemand.*
SCHREIBER. . . .	*Allemand.*
SCHKUHR.	*Allemand.*
THOUIN	*François.*
THUILLIER. . . .	*François.*
THUNBERG. . . .	*Suédois.*
VENTENAT. . . .	*François.*
VILLARS.	*François.*

Fin de la onzième Table.

TABLE DOUZIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ÉTYMOLOGIES des noms génériques cités dans le Système des Plantes.

A.

ABRUS, du grec, *mou*, parce que les feuilles sont très-tendres.

Acœna, synonyme d'*Acanthus*.

Acalypha, du grec, *qui n'est pas bon à manger*.

Acanthus, du nom du jeune *Acanthe*, dont parle la Fable.

Acer, ainsi nommé à cause de la dureté de son bois.

Achillea, du nom d'*Achille*, qui employa la Mille-feuille commune pour guérir une blessure de *Thélèphe*.

Achras, nom donné par *Dioscoride* au poirier sauvage.

Achyranthes, du grec, *fleur de paille*, à cause de la couleur des fleurs.

Acnida. . . . .

Aconitum, ainsi nommé, parce que l'espèce la plus commune croit sur les rochers, ou dans les lieux qui ne sont pas couverts de terre.

Acorus, grec radical.

Acrostichum, du grec, *rang le plus haut*.

Actæa, de l'Attique qu'on appeloit *Attica*, *Actæa*, ou du roi Acteus, ou du grec, *sureau*, parce que les fruits de l'Actæa sont disposés comme ceux du sureau.

Adansonia, du nom d'un Botaniste françois.

Adelia, du grec, *sans* et *visible*, à cause de la petitesse des fleurs.

Adenanthera, du grec, *Anthères glanduleuses*.

Adiantum, du grec, *non mouillé*, parce que le capillaire trempé dans l'eau ne prend pas l'humidité.

Adonis, d'*Adonis*, qui, selon la Fable, fut changé en cette plante.

Adoxa, du grec, *sans gloire*.

Ægylops, du grec, *regard de chèvre*. L'espèce ainsi nommée, guérit, suivant *Pline*, l'*ægilops*, espèce d'abcès formé entre les narines et le grand angle de l'œil, maladie commune parmi les chèvres.

Ægiphila, du grec, *aimé des boucs*.

Ægopodium, du grec, *pied de chèvre*, à cause d'une prétendue ressemblance entre la feuille et le pied d'une chèvre.

Æschynomene, du grec, *pudeur*, parce que les feuilles se ferment lorsqu'on les touche.

Æsculus. . . . . .

Æthusa, du grec, *brûlant*, à cause des qualités dangereuses de l'*Æthusa Cynapium*, L.

Agaricus, d'une contrée de la Sarmacie nommée *Agaria* ou *Agnia*, où cette espèce de champignon croissoit abondamment.

Agave, du grec, *admirable*.

Ageratum, du grec, *qui ne vieillit pas*, parce que les espèces de ce genre conservent long-temps leur éclat.

Agrimonia, du latin, *Ager*, parce que l'espèce commune croît dans les champs.

Agrostema, du grec, *couronne des champs*, à cause de la beauté de ses fleurs.

Agrostis, du grec, *champ*.

Agyneia, du grec, *sans femme*, parce que *Linné* croyoit que ce genre étoit dépourvu de style.

Aira, nom donné par les grecs à l'ivraie.

Ajuga, corrompu du latin *abiga*, nom que les anciens donnoient au *Chamæpythis*.

Aizoon, du grec, *toujours et vie*, à cause de la durée de la plante, dont les feuilles sont toujours vertes.

Albuca, dérivé du latin *albus*, *blanc*.

Alcæa, du grec, *remède*.

Alchemilla, ainsi nommé, parce que l'espèce commune étoit très-employée par les alchimistes.

Aldrovanda, du nom d'un Botaniste Italien.

Aletris, du grec, *meûnière*, parce que les fleurs d'une espèce sont blanches, et chargées d'un duvet qui les fait paroître farineuses.

Alisma, grec radical.

Allamanda, du nom d'un Botaniste.

Allionia, du nom d'un Botaniste Piémontois.

Allium, peut-être du grec, *je fuis*, parce que plusieurs personnes craignent son odeur.

Allophyllus, du grec, feuille.

Aloë, mot grec dont l'origine est orientale.

Alopecurus, du grec, *queue de renard*, à cause de la forme de son épi.

Alpinia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Alsine, du grec, *forêt*, parce que quelques espèces de ce genre croissent dans les forêts.

Alstroëmeria, du nom d'un Botaniste Suédois.

Althæa, du grec, *médicament*, à cause des vertus de l'esèpce appelée *Althæa officinalis*, L.

Alyssum, du grec, *qui ôte la rage*, à cause des propriétés que les anciens lui attribuoient.

Amaranthus, du grec, *fleur immarcessible*, à cause de sa longue durée.

Amaryllis, nom poétique.

Ambrosia, du grec, *nourriture des dieux.*

Ambrosinia, du nom d'un Botaniste Italien.

Amellus, ainsi nommé, du fleuve Mella, ou parce que sa fleur n'a point de mieillier.

Amethystea, dérivé du latin, *amethystinus*, couleur d'améthyste, à cause de la couleur des fleurs.

Ammannia, du nom d'un Botaniste Russe.

Ammi, du grec, *sable*, parce que plusieurs espèces de ce genre croissent dans les lieux arides.

Amomum, nom grec.

Amorpha, du grec, *sans forme*, parce que les fleurs sont dépourvues d'ailes et de carène.

Amygdalus, du grec, *stries*, à cause des stries ou crevasses qu'on remarque sur le noyau; ou de l'hébreu, *vigilant*, parce que la floraison de l'Amandier annonce le retour du printemps.

Amyris, du grec, *je coule*, à cause du suc résineux qui découle du tronc de plusieurs espèces de ce genre.

Anabasis, du grec, *je monte*, parce que la plante s'élève beaucoup.

Anacardium, du grec, *cœur*, à cause de la forme du fruit.

Anacyclus, du grec, *fleur et circuit*, à cause de la forme des fleurs.

Anagallis, du grec, *hyacinthe*, à cause de la couleur de ses fleurs.

Anagyris, du grec, *avec courbure*, à cause de la forme du fruit et des semences.

Anastatica, du grec, *je suis ressuscité*, parce que la rose de Jérico s'ouvre lorsqu'on l'a plonge dans l'eau.

Anchusa, du grec, *suffoquer*, parce que la décoction de la racine de l'espèce officinale suffoque les cousins.

Andrachne, nom que *Théophraste* donnoit au Portulacca.

Andromeda, nom poétique.

Andropogon, du grec, *barbe de bouc.*

Androsace, du grec, *repos* ou *guérison d'homme*, à cause des vertus médicinales que les anciens lui attribuoient.

Andryala, corrompu selon *Théophraste*, d'*Andrachne.*

Anemone, du grec, *vent*: ou parce que les fleurs des Anémones s'ouvrent à l'époque où les vents soufflent; ou parce que les Anémones croissent dans les lieux exposés aux vents.

Anethum, du grec, *vaincre*, parce qu'il excite l'appétit; ou du grec, *courir*, parce que l'Aneth croît promptement.

Angelica, du latin *angelus*, *ange*, à cause des vertus attribuées à l'espèce appelée *Archangelica.*

Anguria, du grec, *vase*, parce que le fruit vidé peut servir à contenir de l'eau ou du vin.

Annona, nom américain.

Anthemis, du grec, *fleur.*

Antherieum, du grec, *fleur*, *épi.*

Anthoceros, du grec, *fleur cornue.*

Antholyza, du grec, *fleur lisse.*

Anthospermum, du grec, *fleur, semence. Linné* a donné à ce genre le nom d'*Anthospermum*, parce que *Pontedera* avoit pris la fleur non développée pour le fruit.

Anthoxanthum, du grec, *fleur des fleurs.*

Anthyllis, du grec, *fleur velue.*

Antichorus, à cause de son affinité avec le Corchorus.

Antidesma, du grec, *venin* et *contre*, parce que la plante offre un remède contre la morsure des serpens.

Antirrhinum, du grec, *fleur en nez*, à cause de la forme de ses fleurs, appelées vulgairement mufles de veau.

Aphanes, du grec, *invisible*, à cause de la petitesse des fleurs.

Aphyllanthes, du grec, *fleur sans feuilles.*

Aphyteia. . . . .

Apium, du latin *apex*, *tête*, *sommet*, parce qu'on mettoit sur la tête des vainqueurs aux jeux sacrés, une couronne d'Apium.

Apluda. . . . .

Apocynum, du grec, *chien*, parce que les anciens croyoient qu'il y avoit une espèce d'*Apocyn* qui faisoit mourir les chiens.

Aquartia, du nom d'un Botaniste.

Aquilegia, corrompu d'*Aquilina*, à cause des onglets des pétales, recourbés comme les serres d'un aigle.

Aquilicia, plante connue à l'isle de France, sous le nom de *Bois de source.*

Arabis, du nom de l'Arabie.

Arachis, ainsi nommé, à cause de sa ressemblance avec l'*Arachus.*

Aralia, nom dont l'origine est inconnue.

Arbutus, ainsi nommé, selon quelques Auteurs, parce qu'il croît parmi les arbustes.

Arctium, du grec, *ours.*

Arctopus, du grec, *féroce* et *pied*, à cause de la ressemblance de la collerette avec les griffes des bêtes féroces.

Arctotis, du grec, *ours*, parce que les semences sont velues comme un ours.

Arduina, du nom d'un Botaniste Italien.

Areca, nom que les habitans du Malabar donnent aux fruits de l'espèce que *Linné* appelle *Catechu.*

Arenaria, du latin *arena*, *sable*, parce que plusieurs espèces de ce genre croissent dans les lieux sablonneux.

Arethusa, nom emprunté de la Fable.

Aretia, du nom d'un Botaniste Suisse.

Argemone, du grec, *taie*, parce qu'on l'employoit pour dissiper les taies ou pellicules qui se forment sur l'œil.

Aristida, nom donné à une espèce de Graminée.

Aristolochia, du grec, *lochies meilleures*, parce que la première espèce à laquelle on a

donné le nom étoit employée dans les lochies.

Arnica, mot barbare, corrompu de *Ptarmica*.

Artedia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Artemisia, du nom d'*Artémise* femme de *Mausole*, roi de Carie.

Arum, du grec, *ressemblance* et *pomme de grenade*, parce que l'Arum produit un fruit semblable aux semences de la grenade. *Lobel* veut que *Arum* vienne du nom du pontife *Aaron*.

Arundo, latin radical.

Asarum, du grec, *sans ornemens*, parce que, selon *Pline*, cette plante n'étoit jamais employée à faire des couronnes ou des guirlandes.

Ascyrum, du grec, *sans âpreté*, c'est-à-dire plante sans âpreté, lisse.

Asclepias, du nom d'*Esculape*.

Aspalathus, nom donné par *Dioscoride* au Cytise.

Asparagus, du grec, *non semences*, parce que, suivant *Athenée*, les plus belles asperges ne sont pas celles qui viennent des semences.

Asperugo, du latin *asper*, *rude*, parce que ses feuilles sont rudes au toucher.

Asperula, du latin *asper*, *rude*, parce que plusieurs espèces de ce genre sont rudes au toucher.

Asphodelus, du grec, *sceptre*.

Asplenium, du grec, *rate*, ainsi nommé à cause des propriétés qu'on attribuoit aux espèces de ce genre.

Aster, du grec, *étoile*, à cause de la forme de la fleur.

Astragalus, du grec, *os du talon* ou *vertèbre*.

Astrantia, du latin *aster*, *étoile*, parce que les feuillets de la collerette sont disposées en étoile.

Astronium, du grec, *astre*, à cause de la forme du calice dont les feuillets sont disposés en étoile.

Athamanta, du nom de l'inventeur ou d'une montagne de Thessalie.

Athanasia, du grec, *immortalité*, à cause de la durée de ses fleurs.

Atractylis, du grec, *fuseau ou quenouille*, parce que les tiges de quelques espèces de ce genre servoient à faire des fuseaux.

Atragene, nom que *Dioscoride* donnoit au Clématis.

Atraphaxis, nom donné par *Dioscoride* à l'Atriplex.

Atriplex, nom dérivé du grec *Atraphaxis*.

Atropa, du nom d'*Atropos*, une des trois parques.

Avena, du latin *aveo*, *desirer avec ardeur*, parce que les bestiaux aiment beaucoup l'*avoine*.

Averrhoa, du nom d'un Médecin Arabe.

Avicennia, du nom d'un Médecin Arabe.

Axyris. . . . .

Ayenia, du nom d'un François.

Azalea, du grec, *sec*, parce que l'espèce nommée *Azalea procumbens*, L. croît dans les lieux secs.

B.

Baccharis, du nom de *Bacchus*.

Bœckea, du nom d'un Botaniste qui avoit donné des plantes à *Linné*.

Ballota, du grec, *oreille*, parce qu'on l'employoit pour guérir les maux d'oreilles invétérés.

Baltimora, du nom d'une ville du Mariland.

Banisteria, du nom d'un Botaniste Anglois.

Barleria, du nom d'un Botaniste François.

Bartsia, du nom d'un Botaniste.

Basella, nom que les habitans du Malabar donnent à une espèce de ce genre.

Basia, du nom d'un Botaniste Italien.

Batis, synonyme du *Crithmum*.

Bauhinia, du nom de *Jean* et de *Gaspard Bauhin*.

Befaria, nom d'homme?

Begonia, du nom d'un Intendant de la marine Françoise.

Bellis, ainsi nommé à raison de la couleur de ses fleurs, comme si l'on disoit belle fleur.

Bellium, du nom de *Bellis*.

Bellonia, du nom d'un Naturaliste François.

Berberis, mot barbare, indien d'origine.

Bergera, du nom d'un Botaniste Allemand.

Bergia. . . . .

Besleria, du nom d'un Pharmacien.

Beta, latin radical.

Betonica, corrompu de *vetonica*, nom d'un peuple qui passoit pour avoir découvert cette plante.

Betula, on donne différentes étymologies de ce nom, qu'on croit être d'origine Celte.

Bidens, du latin, *à deux dents*, à cause de la forme des semences, terminées dans la plupart des espèces par deux dents.

Bignonia, du nom de l'abbé *Bignon*.

Biscutella, ainsi nommé à cause de la forme du fruit à double écusson.

Bisserula, ainsi nommé à cause des gousses dentées à dents de scie sur les deux bords.

Bixa, nom américain.

Blœria, du nom d'un Botaniste Anglois.

Blackea, du nom d'un Botaniste Anglois.

Blasia, du nom d'un Botaniste Italien.

Blechnum, du grec, *insensé*, parce que la plante est sans vertus.

Blitum, d'un mot grec qui désigne l'insipidité des espèces connues de ce genre.

Bobartia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Bocconia, du nom d'un Botaniste Italien.

Boerrhaavia,

Boerrhaavia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Boletus, d'un mot oriental, qui signifie *prominere*, *être élevé*, parce qu'il croît sur les arbres.

Bombax, du grec, *bombyx*, *ver à soie*, à cause du duvet qui entoure les semences.

Bontia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Borasus, nom donné par les anciens au fruit du *Dattier* enveloppé par sa collerette.

Borbonia, du nom de *Gaston* fils d'*Henri IV*.

Borrago, de *corrago*, parce qu'elle fortifie le cœur, ou de *bovago*, à cause des feuilles qui par leur rudesse imitent la langue du bœuf.

Boseu, du nom d'un sénateur de Leipzig, qui possédoit un jardin de Botanique.

Brabeïum, du grec, *sceptre*, à cause de la disposition des rameaux qui forment en s'élevant une pyramide.

Brassica, du grec, *dévorer*, parce que les Anciens faisoient grand usage des Choux pour leur nourriture.

Briza, du grec, *dormir*, parce le pain fait avec sa farine fait dormir.

Bromelia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Bromus, du grec, *nourriture*.

Brossæa, du nom d'un Botaniste François.

Browallia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Brownea, du nom d'un Botaniste Anglois.

Brunsfelsia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Brunia, du nom d'un voyageur Hollandois.

Bryonia, du grec, *pousser abondamment*, parce que la *Bryone* jette une grande quantité de tiges.

Bryum, du grec, *germer*.

Bubon, du grec, *âne*, parce qu'on employoit l'espèce connue sous le nom de *Bubon Macedonicum*, L. pour guérir l'inflammation de cette partie du corps.

Buchnera, du nom d'un Botaniste.

Bucida, du grec, *corne*, à cause de la forme du fruit.

Buddleïa, du nom d'un Botaniste Anglois.

Buffonia, du nom de l'immortel *Buffon*, et non pas comme on l'a écrit, de *Bufo*, *crapaud*, parce que, ajoute-t-on, la *Buffonia tennifolia*, L. croît dans les lieux marécageux. Nous observerons que la *Buffonia* est une plante de la famille des *Caryophyllées*, qui croît dans les lieux secs et arides, et que *Sauvages*, qui a décrit le premier ce genre, l'avoit dédié à *Buffon*.

Bulbocodium, du grec, *bulbe-laine*, parce que sa racine est velue.

Bunias, du grec, *cou*, parce que sa racine a la forme d'un cou.

Bunium, du grec, *mamelle*, à cause de la forme de la racine.

Buphthalmum, du grec, *œil de bœuf*, à cause de la forme de ses fleurs.

Buplevrum, du grec, *côte de bœuf*, à cause de la roideur des feuilles de quelques espèces de ce genre.

Burmannia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Bursera, du nom d'un Botaniste Allemand.

Butomus, du grec, *bœuf*, *couper*, parce que les feuilles de cette plante qui sont aiguës, blessent la langue des bœufs qui en mangent.

Buttneria, du nom d'un Hollandois.

Buxbaumia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Buxus, corrompu du grec *Puxos*, nom par lequel *Théophraste* désignoit la même plante.

Byssus, nom oriental adopté par les grecs et les latins.

C.

CACALIA, du grec, *dessécher*, à cause des propriétés de l'espèce à laquelle on a donné ce nom; ou peut-être du grec, *ignoble*, à cause du peu de valeur de la plante ainsi nommée.

Cachrys, du grec, *je brûle*, à raison de la causticité des semences.

Cactus, du grec, *je me retire*, parce que la plupart des espèces qui sont épineuses, font reculer les personnes qui les touchent; ou du grec, *je brûle*, parce qu'elle pique et occasionne des démangeaisons.

Cœanothus, nom donné par *Théophraste* à une espèce de chardon.

Cæsalpina, du nom d'un Botaniste Italien.

Calamus, du latin, *roseau*.

Calceolaria, du latin, *calceolus*, *petit-soulier*, à cause de la forme de la lèvre inférieure de la corolle.

Calea, du grec, *beau*.

Calendula, ainsi nommé, parce que l'espèce la plus commune fleurit à toutes les calendes.

Calla, étymologie douteuse.

Callicarpa, du grec, *beau fruit*.

Calligonum, du grec, *beaux genoux*, à cause des nodosités de la tige et des rameaux.

Callisia, étymologie douteuse.

Callitriche, du grec, *belle chevelure*.

Calophyllum, du grec, *beau feuillage*.

Caltha, corrompu du latin *calathus*, *coupe* ou *calice*, à cause de la forme des fleurs.

Calycanthus, du grec, *calice et fleur*, à cause de la couleur des segmens du calice qui ressemblent à des pétales.

Cambogia, nom de pays.

Camellia, du nom d'un Jésuite qui a décrit plusieurs plantes des isles Philippines.

Cameria, du nom d'un Botaniste Allemand.

Campanula, du latin, *petite cloche*, à cause de la forme de la corolle.

Camphorosma, ainsi nommé à cause de son odeur camphrée.

Canarina, du nom des isles Canaries.

Canarium, nom du Malabar.

Canna, d'un mot grec dérivé de l'hébreu *Caneh*, qui signifie *Roseau*.

Cannabis, du grec, *bois grêle*, parce que les tiges de Chanvre desséchées, sont légères en comparaison des tiges des autres plantes.

Capparis, nom arabe, adopté par les grecs.

Capraria, ainsi nommé, parce que les chèvres recherchent l'espèce nommée *biflora*.

Capura. . . . .

Capsicum, du grec, *je mords*, à cause de la saveur poivrée et brûlante des semences; ou du latin *capsa*, parce que les semences sont enfermées dans une espèce d'étui.

Cardamine, ainsi nommé parce que la saveur de la plupart des espèces se rapproche de celle du *Cresson*.

Cardiospermum, du grec, *semence en cœur*, à cause de la cicatrice en forme de cœur qui se trouve à la base de l'ombilic des semences.

Carduus, latin radical.

Carex, du grec, *couper*, parce que les angles de la tige sont aigus dans quelques espèces.

Carica, de la *Carie*, nom de pays.

Carissa, nom dérivé peut-être du mot *carandras*, par lequel les Indiens désignent une espèce de ce genre.

Carlina, du latin *Carolina* et *Carolus*, parce que la *Carline* fut employée du temps de *Charlemagne* contre la peste.

Carpesium, peut-être du grec, *fruit*.

Carpinus, latin radical.

Carthamus, du grec, *purger*, à cause de la propriété des semences.

Carum, ainsi nommé, selon quelques Auteurs, parce que la plante qui constitue ce genre abonde dans la Carie.

Caryophyllus, du grec, *feuille de noix*.

Caryocar. . . . .

Caryota, nom donné par *Dioscoride* aux Dattes sèches.

Cassia, nom obscur, hébreu d'origine?

Cassine, nom des Sauvages de l'isle de la Floride.

Cassyta, nom donné par *Rumphius* à une plante parasite ressemblant à la *Cuscute*.

Catananche, du grec, *au besoin*; parce que les femmes de la Thessalie s'en servoient dans leurs enchantemens.

Catesbæa, du nom d'un Botaniste Anglois.

Caturus, ainsi nommé parce que l'épi a la forme d'une queue de chat.

Caucalis, du grec, *tige couchée*.

Cecropia, du nom d'un roi d'Athènes.

Cedrela, du latin, *Cedrus*, à cause de la résine aromatique que produit l'espèce qui constitue ce genre.

Celastrus, nom donné par *Théophraste* à un arbre toujours vert.

Celosia, de *cœlum*, ou *planta celestis;* ou du latin, *celare*, *cacher*, parce que les *Célosies* cultivées dans des pots et placées sur les fenêtres, interceptent une partie du jour.

Celsia, du nom d'un savant Suédois.

Celtis, grec obscur, ou d'un peuple chez lequel croissoit abondamment l'espèce nommée *Celtis Orientalis*, L.

Cenchrus, nom donné par les Anciens au *Milium*.

Centaurea, du nom du Centaure *Chiron*, qui se guérit d'une blessure avec une espèce de ce genre.

Centella, du grec, *je stimule*.

Centunculus, nom que les Anciens avoient donné à une espèce de *Clématite*.

Cephalanthus, du grec, *fleur en tête*.

Cerastium, du grec, *cornu*, à cause de la forme de la capsule.

Ceratocarpus, du grec, *fruit cornu*.

Ceratonia, du grec, *gousse cornue*.

Ceratophyllum, du grec, *feuille cornue*.

Cerbera, nom emprunté de la Fable.

Cercis, nom employé par *Théophraste* pour désigner l'*Arbre de Judée*.

Cerinthe, du grec, *cire*, parceque sa fleur est de couleur de cire; ou parce que l'on a cru que les espèces de ce genre fournissoient aux abeilles la matière de leur cire.

Ceropegia, du grec, *candelabre*, parce que dans plusieurs espèces, la disposition des fruits imite un candelabre.

Cestrum, du grec, *maillet*, à cause de la forme des filamens des étamines.

Chærophyllum, du grec, *feuille gaie*, à cause de la beauté du feuillage.

Chalcas, nom emprunté de la Fable.

Chamærops, du grec, *arbrisseau petit*.

Chara, du grec, *joie* ou *plaisir*, ainsi nommé parce que les espèces de ce genre se plaisent dans l'eau, et y croissent abondamment.

Cheiranthus, de l'arabe, *Keiri*, *Giroflée* ou *Violette blanche;* et du grec, *anthos*, *fleur*.

Chelidonium, du grec, *hirondelle*, parce que la Chélidoine fleurit à l'époque où les hirondelles arrivent.

Chelone, du grec, *tortue*.

Chenopodium, du grec, *patte-d'oie*.

Cherleria, du nom d'un Botaniste Suisse.

Chiococca, du grec, *neige*, *graine*, parce que les fruits du

Chiococca racemosa, L. sont blancs comme la neige.

Chionanthus, du grec, *fleur de neige*.

Chironia, du nom du centaure *Chiron*.

Chlora, du grec, *jaune*, à cause de la couleur des fleurs.

Chondrilla, du grec, *grumeau*, parce que le suc laiteux qui découle du *Condrilla juncea*, L. se grumelle facilement.

Chrysanthemum, du grec, *fleur d'or*.

Chrysitrix. . . . . .

Chrysobalanus, du grec, *gland doré*, à cause de la couleur des fruits.

Chrysocoma, du grec, *chevelure d'or*.

Chrysogonum, du grec, *semence dorée*.

Chrysophyllum, du grec, *feuille d'or*.

Chrysosplenium, du grec, *or*, *rate*; ou plante à fleur d'or, et propre à guérir les maladies de la rate.

Cicca. . . . . .

Cicer, du grec, *force*.

Cichorium, mot égyptien adopté par les Grecs, passé ensuite chez les autres nations, qui signifie *je trouve*, parce que la Chicorée se trouve par-tout.

Cicuta, nom par lequel les Anciens désignoient les entre-nœuds d'une canne, ou une flûte, un chalumeau.

Cimifuga, du latin, *chasse-punaise*.

Cinchona, du nom du comte de *Chincon* vice-roi du Pérou, sous le règne duquel la vertu du *Quinquina* fut découverte.

Cineraria, du latin, *cinis*, *cendre*, à cause de la couleur des feuilles de quelques espèces de ce genre.

Cinna. . . . . .

Circœa, du nom de la magicienne *Circée*.

Cissampelos, du grec, *Lierre*, parce qu'il grimpe sur les murailles et les arbres.

Cissus, nom que les Grecs donnoient au *Lierre*.

Cistus, grec radical.

Citharexylon, du grec, *bois de guitare*.

Citrus, mot africain adopté par les Latins.

Clathrus, du grec, *grille*.

Clavaria, du latin, *clava*, *massue*, à cause de la forme de quelques espèces.

Claytonia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Clematis, du grec, *petite vigne*, parce que plusieurs espèces sont sarmenteuses.

Cleome, nom qu'*Octave Horace* donnoit à une plante qui ressembloit au *Sinapi*.

Cleonia, étymologie obscure.

Clerodendrum, du grec, *arbre heureux*.

Clethra, du grec, *Aulne*, parce que ses feuilles ressemblent à celles de cet arbre.

Clibadium. . . . . .

Clifortia, du nom d'un Hollandois, propriétaire d'un riche jardin de Botanique, dont

Linné a decrit les plantes dans le superbe Ouvrage qui porte le nom d'*Hortus Cliffortianus*.

Clinopodium, du grec, *pied de lit*.

Clitoria, ainsi nommé à cause d'une espèce de ressemblance de la fleur avec une partie des organes de la génération de la femme.

Clusia, du nom d'un Botaniste Flammand.

Clutia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Clypeola, du latin, *petit bouclier*, à cause de la forme du fruit.

Cneorum, du grec, *mordant*, à cause de la saveur des feuilles.

Cnicus, du grec, *jaune*, à cause de la couleur des fleurs dans quelques espèces.

Coccoloba, du grec, *semence lobée*.

Cochlearia, du latin, *cochlear*, *cuiller*, à cause de la forme des feuilles de l'espèce nommée *Cochlearia officinalis*, L.

Cocos, nom indien.

Codon, étymologie douteuse.

Coffea, nom arabe.

Coïx, nom d'un Palmier chez les Anciens.

Colchicum, du nom de la Colchide, où cette plante croissoit abondamment.

Coldenia, du nom d'un Botaniste.

Collinsonia, du nom d'un membre de la Société royale de Londres.

Columnea, du nom d'un Botaniste Italien.

Colutea, du grec, *mutiler*.

Comarum, nom donné par *Pline* à une espèce d'Arbousier.

Cometes, peut être du grec, *ceint*.

Combretum, du grec, *orné*, *vêtu*; parce que les semences sont hérissées de poils.

Commelina, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Comocladia. . . . . .

Conferva, nom de *Pline*.

Conium, du grec, *je rends presque aveugle*, à cause des effets que produit la *Ciguë*, sur les personnes qui en mangent.

Connarus. . . . . .

Conocarpus, du grec, *semence en cône*, à cause de la forme du fruit.

Convallaria, ainsi nommé, parce qu'on trouve quelques espèces de ce genre dans les vallées.

Convolvulus, ainsi nommé, parce que plusieurs espèces de ce genre se roulent autour des corps qui les avoisinent.

Conyza, du grec, *gâle*, *demangeaison*, parce que les Anciens se servoient de l'espèce à laquelle on a donné ce nom, pour guérir la gâle.

Copaïfera, ainsi nommé, parce que la plante qui constitue ce genre produit le baume de Copahu.

Corcorus, dulatin, *cor*, parce que son fruit a la forme d'un cœur.

Cordia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Coreopsis, du grec, *figure de punaise*, à cause de la forme des semences.

Coriandrum, du grec, *punaise*, parce que les semences ont avant leur maturité l'odeur de cet insecte.

Coriaria, du latin, *corium*, *cuir*, à cause de l'usage qu'on fait de cette plante dans la préparation des cuirs.

Coris, du grec, *punaise*, à cause de la forme des semences.

Corispermum, du grec, *semence*, *punaise*, parce que les semences ressemblent à une punaise.

Cornucopiæ, ainsi nommé à cause de la forme du calice.

Cornus, du latin, *cornu*, à cause de la dureté du bois.

Cornutia, du nom d'un Botaniste François.

Coronilla, du latin, *corona*, à cause de la disposition des fleurs.

Corrigiola, du grec, *je purge*, parce que la tige qui est rampante, étouffe les herbes qu'elle rencontre; ou du latin, *corrigia*, *courroie*, *attache*.

Cortusa, du nom d'un Botaniste de Padoue.

Corylus, du grec, *noix*.

Corymbium, de *corymbe*, à cause de la disposition des fleurs.

Corypha, du latin, *faîte*.

Costus, nom arabe?

Cotula, diminutif de *Cota*, nom que les Anciens donnoient à une espèce d'*Anthemis*.

Cotyledon, du grec, *cavité*, à cause de la forme des feuilles dans quelques espèces.

Crambe, du grec, *sec*, *aride*, parce que l'espèce connue sous le nom de *Crambe maritima*, L. croît dans les lieux sablonneux.

Craniolaria, du mot *crâne*, à cause de la forme du fruit.

Crassula, du latin, *crassus*, *épais*, à cause de la nature des feuilles qui sont succulentes.

Cratægus, du grec, *force*, à cause de la dureté du bois.

Cratæva, du nom d'un Médecin Grec.

Crepis, du grec, *chaussure*.

Cressa, ainsi nommé, parce que l'espèce qui constitue ce genre croît abondamment dans l'isle de Crète.

Crescentiæ, du nom d'un Agriculteur Italien.

Crinum, nom que les Grecs donnoient au *Lis*.

Crithmum, nom de *Dioscoride*.

Crocus, nom poétique selon quelques Auteurs.

Crotalaria, du grec, *instrument qui fait du bruit*, parce que les rameaux chargés de gousses qui font du bruit lorsqu'on les agite, servent d'amusement aux enfans.

Croton, synonyme du *Ricinus* dans *Dioscoride*.

Crucianella, dérivé du latin, *crux*, parce que ses feuilles sont disposées en croix.

Cruzita, nom espagnol.

Cucubalus, du grec, *mauvaise blessure*, parce que l'espèce connue des Anciens étoit employée contre la morsure des serpens.

Cucumis, du latin, *curvus*, *courbé*, à cause de la forme du fruit.

Cucùrbita, même étymologie que *Cucumis*.

Cuminum, du grec, *je conçois*, parce que l'espèce qui constitue ce genre étoit employée dans les accouchemens ; ou d'une montagne de l'Etrurie, où elle croît spontanément.

Cunila, du nom d'une ville où cette plante avoit été découverte, selon quelques-uns ; ou selon d'autres, de la forme des fleurs qui ressemblent par leur disposition à une espèce de cône.

Cunonia, du nom d'un Danois.

Cupania, du nom d'un Botaniste qui a décrit les Plantes de Sicile.

Cupressus, du grec, *j'engendre également*, parce que le *Cyprès* produit des rameaux égaux.

Curatella. . . . .

Curcuma, pour *crocea*, à cause de la ressemblance de sa couleur avec le Safran.

Cuscuta, du latin, *réseau*, parce que la *Cuscute* enveloppe les plantes.

Cyanella, du grec, *bleu*, à cause de la couleur de la fleur.

Cycas, nom donné par *Théophraste* à une espèce de Palmier.

Cyclamen, du grec, *cercle*, à cause de la figure arrondie de la racine.

Cymbaria, ainsi nommé, à cause de la capsule qui s'ouvre en deux parties semblables à une nacelle.

Cynanchum, du grec, *étrangle-chien*.

Cynara, ainsi nommé à cause de la couleur cendrée des feuilles ; ou du grec *chien*, parce que les écailles épineuses qui terminent les écailles du calice, ressemblent aux crocs d'un chien.

Cynoglossum, du grec, *langue de chien*, à cause de la forme des feuilles.

Cynometra, du grec, *matrice de chien*, à cause de la forme du fruit.

Cynomorium, ainsi nommé à cause de sa ressemblance avec les parties de la génération du chien.

Cynosurus, du grec, *queue de chien*, à cause de la forme de son épi.

Cyperus, du grec, *vase*, ainsi nommé à cause de la forme de la racine.

Cypripedium, du grec, *chaussure de Vénus*.

Cyrilla, du nom d'un Botaniste Napolitain.

Cytinus, nom sous lequel les Anciens désignoient les fleurs du Grenadier.

Cytisus, du nom d'une isle de l'Archipel.

D.

Dactylis, du grec, *digital*, parce que les divisions du panicule imitent l'expansion de la main.

Daïs. . . . . .

Dalechampia, du nom d'un Botaniste François.

Daphne, nom que les Grecs donnoient au *Laurier*.

Datisca, synonyme du *Catananche* dans *Dioscoride*.

Datura, mot turc d'origine. Aux Indes, les femmes lascives font prendre à leurs maris les semences des *Endormies*, pour les exciter à l'amour.

Daucus, du grec, *je brûle*, parce que les semences du *Daucus Carotta* sont échauffantes.

Decumaria, ainsi nommé à raison du nombre des parties de la fructification.

Delphinium, du grec, *Dauphin*.

Delima, de *lime*, à cause de la rudesse des feuilles dentées à dents de scie, dont on se sert à Ceylan pour polir les meubles.

Dentaria, du latin, *dens*, *dent*, à cause de la forme de la racine.

Dialium, synonyme de l'*Héliotrope* chez les Anciens.

Dianthera, du grec, *deux anthères*.

Dianthus, du grec, *fleur de Jupiter*.

Diapensia, nom ancien et insignifiant.

Dictamnus, du nom de *Dicta*, montagne de Crète où cette plante croît abondamment.

Digitalis, ainsi nommé parce que la fleur a quelque ressemblance avec un dé à coudre.

Dillenia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Diodia, ainsi nommé peut-être à cause du nombre des feuillets du calice.

Dionæa, surnom de *Vénus*.

Dioscorea, du nom d'un Botaniste Grec.

Diosma, du grec, *odeur des Dieux*, à cause de l'odeur suave que répandent toutes les parties de la plante.

Diospyros, du grec, *blé de Jupiter*.

Dipsacus, du grec, *ayant soif*, ainsi nommé parce que les eaux des pluies se ramassent dans la cavité des feuilles qui embrassent la tige.

Dirca, du grec, *source*, parce que la plante à laquelle on donne ce nom, croît dans les lieux humides et marécageux.

Disandra, du grec, *double*, *mari*, à cause du nombre des étamines qui varie.

Dodartia, du nom d'un Botaniste François.

Dodecatheon, du grec, *douze Divinités*, à cause du nombre de ses fleurs qui sont inclinées au sommet de la hampe.

Dodonæa, du nom d'un Botaniste Flamand.

Dolichos, du grec, *long*, à cause de la longueur de la gousse ou des espèces de ce genre.

Doronicum, de l'arabe, *poison de léopard*.

Dorstenia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Draba, du grec, *acre*, à cause de sa saveur.

Dracæna, de *Draco*, nom que

l'Ecluse a donné le premier à l'espèce qui fournit le *Sang-dragon*.

Dracocephalum, du grec, *tête de dragon*.

Dracontium, du latin, *draco*. Les Anciens donnoient ce nom à une espèce d'*Arum*.

Drosera, du grec, *couvert de rosée*, à cause des glandes transparentes qui surmontent les poils dont les feuilles sont hérissées, et qui ressemblent à des gouttes d'eau.

Dryas, du grec, *Chêne*, à cause d'une espèce de ressemblance des feuilles du *Dryas octopetala*, L. avec celles du *Chêne*.

Drypis, du grec, *je déchire*, à cause des épines dont la plante est armée.

Duranta, du nom d'un Botaniste Italien.

Durio, nom du Malabar.

E.

Ebenus, de l'hébreu, *pierre*, à cause de la dureté du bois.

Echinophora, du grec, *porte-épine*, à cause des feuillets de la collerette qui sont piquans.

Echinops, du grec, *hérisson*.

Echites, du grec, *vipère*.

Echium, du grec, *vipère*, à cause d'une espèce de ressemblance des semences de l'espèce vulgaire avec la tête d'une vipère.

Eclipta, ainsi nommé, à cause des fleurs droites et environnées de poils, qui imitent le soleil lorsqu'il est éclipsé.

Ehretia, du nom d'un peintre Anglois.

Elæagnus, du grec, *parent de l'Olivier*.

Elæocarpus, du grec, *fruit d'Olivier*.

Elaïs, ainsi nommé parce qu'on retire de l'huile de son fruit.

Elate, nom grec, par lequel *Théophraste* désigne le spathe qui enveloppe la fructification du *Dattier*.

Elaterium, du grec, *je chasse*; à raison de l'élasticité avec laquelle s'ouvrent les battans du fruit.

Elatine, nom donné par les Anciens à une espèce de *Véronique*.

Elephantopus, du grec, *pied d'éléphant*, à cause de la forme des feuilles inférieures dans une espèce.

Ellisia, du nom d'un Naturaliste Anglois.

Elymus, du grec, *marais*, parce que les espèces de ce genre croissent dans les marais; ou du grec, *collerette*, parce que les semences sont enveloppées par une collerette.

Empetrum, du grec, *parmi les rochers*, parce que l'espèce à laquelle les Anciens donnoient ce nom croissoit dans les lieux pierreux.

Ephedra, du grec, *reposer*, parce qu'une espèce de ce genre est grimpante.

Epidendrum, du grec, *arbre parasite*.

Epigea, du grec, *sur terre*,

parce que cet arbrisseau est rampant.

Epilobium, du grec, *violette sur une silique.*

Epimedium, du grec, *feuille*, *trois*, à cause du nombre des feuilles.

Equisetum, du latin, *queue de cheval.*

Eranthemum, du grec, *printemps*, *fleur*, à cause du moment où elle fleurit.

Erica, du grec, *désert*, parce que les espèces de ce genre croissent dans les déserts; ou du grec, *briser*, parce que l'on attribuoit à la décoction de l'espèce ordinaire, la vertu de dissoudre le calcul de la vessie.

Erigeron, du grec, *vieillard*, *printemps*, parce que la fleur qui passe promptement est remplacée par des aigrettes blanches.

Erinus, nom grec que *Linné* a substitué à celui d'*ageratum*, qui appartient à plusieurs plantes; ou selon quelques Auteurs, du grec, *laine*, parce que l'espèce nommée *Erinus Africanus* est toute velue.

Eriocaulon, du grec, *tige laineuse.*

Eriocephalus, du grec, *tête laineuse.*

Eriophorum, du grec, *porte-laine.*

Erithalis, du grec, *fleur printanière.*

Ervum, du grec, *je mange* et *bœuf*, parce que les Bœufs recherchent les Lentilles.

Eryngium, du grec, *poil de bouc*, à cause des piquans dont plusieurs parties de cette plante sont armées.

Erysimum, du grec, *échauffant* ou *estimé*, à cause de ses vertus.

Erythrina, du grec, *rouge*, à cause de la couleur des fleurs.

Erythronium, du grec, *dent de chien*, à cause de la forme de la racine.

Erythroxylon, du grec, *bois rouge.*

Ethulia. . . . .

Euclea, étymologie obscure.

Eugenia, du nom du prince *Eugène.*

Evolvulus, ainsi nommé à raison de sa ressemblance avec le *Convolvulus.*

Evonymus, du grec, *bon* et *nom*, dénomination ironique, parce que le *Fusain* est nuisible aux bestiaux.

Eupatorium, du nom de *Mithridate* roi de Pont, surnommé *Eupator.*

Euphorbia, du nom d'un Médecin de Juba, roi de Mauritanie.

Euphrasia, du grec, *joie.*

Exacum, peut-être du grec, *j'apporte du remède*, à cause des vertus attribuées aux espèces qui constituent ce genre.

Excoecaria, nom donné par *Rumphius* à un arbre dont le bois, lorsqu'on le brûle, produit une fumée dangereuse pour les yeux.

F.

FAGARA, nom arabe.

Fagonia, du nom d'un Botaniste François.

Fagus, du grec. *je mange*, parce que l'on peut se nourrir de son fruit.

Ferraria, du nom d'un Botaniste de Sienne.

Ferula, du latin. *ferire*, *frapper*, parce qu'on châtioit les enfans avec les tiges de Férule.

Festuca, du latin. *fœnum*, parce que plusieurs espèces de ce genre fournissent un bon fourrage.

Feuillea, du nom d'un Botaniste François.

Ficus, de l'hébreu, *Figuier*.

Filago, herbe filamenteuse ou cotonneuse.

Flagellaria, ainsi nommé, à cause de la forme de la tige et des feuilles.

Fontinalis, du latin, *fons*, fontaine.

Forskoëhlea, du nom d'un Botaniste Suédois.

Fothergilla, du nom d'un Médecin Anglois.

Fragaria, du latin, *fragare*, à cause de l'odeur des Fraises.

Frankenia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Fraxinus, peut-être du grec, *cloison*, parce qu'on se sert quelquefois du Frêne pour faire des clôtures de haies.

Fritillaria, du latin, *fritillus*, *cornet à jouer aux dés*, à cause des taches carrées dont la corolle est parsemée, et qui représentent en quelque sorte un damier.

Fuchsia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Fucus, d'un nom grec adopté par les latins, qui désigne une plante marine employée à la teinture.

Fumaria, ainsi nommé, parce que son suc produit sur les yeux les mêmes effets que la fumée; ou parce qu'on emploie l'espèce commune contre le larmoiement des yeux.

Fusanus, ainsi nommé, parce que son bois est employé à faire des fuseaux.

G.

GALANTHUS, du grec, *fleur de lait*, à cause de sa blancheur.

Galax, étymologie douteuse.

Galega, nom italien.

Galenia, du nom d'un Médecin Romain.

Galeopsis, du grec, *figure de belette*, à cause de la forme des fleurs.

Galium, du grec, *lait*, parce que ses feuilles ont la propriété de coaguler le lait.

Garcinia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Gardenia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Garidella, du nom d'un Botaniste François.

Gaultheria, du nom d'un Botaniste François, qui exerçoit la médecine dans le Canada.

Gaura, peut-être du grec, *superbe*, à cause de la beauté de la fleur.

Gaurea. . . . .

Genipa, nom de pays.

Genista, du latin, *genu*, *genoux*, parce que les branches sont pliantes.

Gentiana, du nom de *Gentius* roi d'Illyrie.

Geoffræa, du nom d'un Médecin François.

Geranium, du grec, *grue*, à cause de la forme du fruit.

Gerardia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Geropogon, du grec, *barbe de vieillard*.

Gesneria, du nom d'un Botaniste Suisse.

Gethyllis, nom que les grecs donnoient au Poireau.

Geum, nom employé par *Pline*, dont l'origine est obscure.

Ginkgo. . . .

Ginora, du nom d'un Allemand.

Gisekia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Glabraria, nom de *Rumphius*.

Gladiolus, du latin, *petit glaive*, *petite épée*, à cause de la forme des feuilles.

Glaux, du grec, *lac*, *lait*, à cause des vertus qu'on lui attribuoit; ou du grec, *bleu*, à raison de sa couleur.

Glechoma, nom grec qui désigne le Pouliot.

Gleditschia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Glaux, nom donné à l'Érable des champs.

Globba, nom Indien.

Globularia, du latin, *globus*, *boule*, à cause de la disposition des fleurs.

Gloriosa, ainsi nommé, à cause de la beauté de sa fleur.

Gluta, ainsi nommé, parce que les pétales sont agglutinés par leur base au réceptacle.

Glycine, du grec, *doux*.

Glycyrrhiza, du grec, *racine douce*.

Gmelina, du nom d'un Botaniste Allemand.

Gnaphalium, du grec, *duvet*, parce que la plupart des espèces de ce genre sont cotonneuses.

Gnetum, nom de *Rumphius*.

Gnidia, peut-être du grec, *piquer*, à cause des feuilles qui dans quelques espèces sont en aléne.

Gomphrena, du grec, *pointe*, à cause des paillettes aiguës qui sont placées entre chaque fleur.

Gordonia, du nom d'un Anglois.

Gouterta, du nom d'un Botaniste, médecin de l'impératrice des Russies.

Gossypium, nom grec emprunté des Égyptiens, qui les premiers ont cultivé le *Coton*.

Gouania, du nom d'un Botaniste François.

Gratiola, du latin, *gratia*, *faveur*, à cause de ses vertus purgatives.

Grewia, du nom d'un Anglois, qui a écrit sur l'anatomie des Plantes.

Grias, du grec, *comestible*, parce que les fruits du *Grias* marinés, connus sous le nom

de *Poires-d'Anchois*, sont servis sur table au dessert.

Grielum. . . . .

Grislea, du nom d'un Botaniste Portugais.

Gronovia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Guaïacum, nom Américain.

Guettarda, du nom d'un Botaniste François.

Guilandina, du nom d'un professeur de Botanique à Padoue.

Gundelia, du nom d'un Botaniste Allemand (*Gundelsheimer*,) qui accompagna *Tournefort* dans son voyage du Levant.

Gunnera, du nom d'un Botaniste Danois.

Gustavia, du nom d'un roi de Suède.

Gypsophila, du grec, *plâtre*, parce que quelques espèces de ce genre croissent sur les murs.

H.

HÆMANTHUS, du grec, *fleur de sang*, à cause de sa couleur.

Hæmatoxylum, du grec, *bois sanguin*.

Halesia, du nom d'un Botaniste et Physicien Anglois.

Halleria, du nom du célèbre *Haller*.

Hamamelis, nom que les Anciens donnoient à une espèce de *Néflier*.

Hamellia, du nom de l'Auteur de la Physique des Arbres, etc.

Hasselquistia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Hebenstreïtia, du nom d'un Naturaliste, professeur de Médecine à Leipzig.

Hedera, du latin, *adherere*, parce que le *Lierre* grimpe et s'attache aux corps qu'il rencontre.

Hedyotis, du grec, *douce oreille*.

Hedysarum, du grec, *odeur douce*, à cause de l'odeur des fleurs de l'*H. coronarium*, L.

Heisteria, du nom d'un Botaniste Allemand.

Helenium, du nom de la femme de *Ménélas*, roi de Sparte, parce que, selon la Fable, la plante que les Grecs nommoient *Helenium*, naquit de ses larmes.

Helianthus, du grec, *fleur du soleil*.

Heliconia, ainsi nommé du Mont-Hélicon.

Helicteres, du grec, *spirale*, à cause des coques roulées en spirale.

Heliocarpos, du grec, *soleil*, *semence*, à cause de la forme du fruit, garni de rayons qui imitent un petit soleil.

Heliophila. . . . .

Heliotropium, du grec, *je tourne vers le soleil*.

Helleborus, peut-être du grec, *herbe meurtrière*.

Helonias, du grec, *marais*, parce que la plante qui constitue ce genre croît dans les marais.

Helvella, du latin, *menues herbes*, ou *petits légumes* : diminutif d'*Olus*.

Hemerocallis, du grec, *beauté d'un jour*, à cause du peu de durée de ses fleurs.

Hemionitis, du grec, *moitié âne* ou *mulet*, parce que les mulets recherchent les espèces de ce genre.

Heracleum, du nom du père d'*Hippocrate*.

Hermannia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Hermas. . . . .

Hernandia, du nom d'un Botaniste Espagnol.

Herniaria, ainsi nommé à cause des vertus qu'on attribue aux espèces de ce genre.

Hesperis, du grec, *soir*, à cause du parfum des fleurs, plus sensible la nuit que durant le jour.

Heuchera, du nom d'un Botaniste Allemand.

Hibiscus, nom grec radical, par lequel on désignoit une espèce de manne ligneuse.

Hieracium, du grec, *épervier*.

Hillia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Hippia. . . . .

Hippocratea, du nom du père de la Médecine.

Hippocrepis, du grec, *fer à cheval*, à cause de la forme de la gousse.

Hippomane, du grec, *cheval* et *fureur*.

Hippophaë, du grec, *splendeur du cheval*, parce que la gomme que fournit cet arbrisseau étoit employée dans l'art vétérinaire.

Hippuris, du grec, *queue de cheval*.

Hiræa, du nom d'un peintre.

Hirtella, ainsi nommé, à cause des poils dont la tige est hérissée.

Holcus, du grec, *tirer*, parce qu'on lui attribuoit la propriété de faire sortir les pailles ou corps étrangers qui seroient entrés dans quelques parties du corps; ou du grec, *mou*, parce que les épis des espèces de ce genre sont mous.

Holosteum, du grec, *tout os* ou *tout osseux*.

Hopea, du nom d'un Botaniste Écossois.

Hordeum, du latin, *horreo*, parce que les épis sont hérissés d'arêtes rudes au toucher.

Horminum, du grec, *porté avec impétuosité*, parce qu'on disoit que cette plante excitoit à l'amour.

Hottonia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Houstonia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Hudsonia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Hugonia, du nom d'un Médecin Allemand.

Humulus, du latin, *humus*, *sol humide*, parce que le Houblon croit dans les terrains arrosés par les débordemens des eaux.

Hura, nom de pays.

Hyacinthus, nom propre très-connu dans la Fable.

Hydnum, du grec, *sens obscur*.

Hydrangea, du grec, *eau*, *vase*.

Hydrastis, du nom d'une Américaine.

Hydrocharis, du grec, *ornement de l'eau.*

Hydrocotyle, du grec *écuelle d'eau*, à cause de la forme des feuilles de l'espèce nommée *Hydrocotyle vulgaris*, L.

Hydrolea, nom de *Loëfling.*

Hydrophyllum, du grec, *feuille d'eau.*

Hymenæa, nom poétique.

Hyobanche, peut-être du grec, *cochon*, *j'étrangle*, comme si on disoit plante nuisible aux cochons.

Hyoscyamus, du grec, *féve de cochon.*

Hyoseris, du grec, *laitue de cochon.*

Hypecoum, du grec, *je résonne*, parce que l'on entend remuer les semences en agitant la silique.

Hypericum, nom grec.

Hypnum, nom donné par les grecs à une espèce de mousse.

Hypochœris, du grec, *sous*, *cochon*, parce que les tiges de la plupart des espèces sont hérissées de poils rudes.

Hypoxis, du grec, *presque aigu*, à cause de la forme des feuilles.

Hyssopus, de l'hébreu, *ezob*, qui désigne une plante sacrée dont on se servoit dans les ablutions pour asperger.

I.

Iberis, du nom d'*Ibérie*, où croissoit une espèce de ce genre.

Illecebrum, du latin, *illicere*, *attirer.*

Ilex, de l'hébreu, *chêne.*

Illicium, du latin, *illicere*, *attirer*, à cause de l'odeur agréable qu'exhalent les capsules.

Impatiens, ainsi nommé, à cause de l'élasticité avec laquelle s'ouvrent les panneaux du fruit, lorsqu'on les touche.

Imperatoria, du latin, *imperare*, à cause des vertus attribuées à l'espèce qui constitue ce genre.

Indigofera, ainsi nommé, parce que l'espèce nommé *indigofera tinctoria*, L. fournit l'Indigo.

Inula, peut-être d'*Helenium.*

Ipomœa, du grec, *semblable au Liseron.*

Iresine, du grec, *laine*, parce que les semences sont enveloppées d'un duvet ou laine très-fine.

Iris, ainsi nommé, parce que la couleur des fleurs de quelques espèces imite celles de l'arc-en-ciel; peut-être du grec, *violette*, parce que les fleurs de quelques espèces teignent en bleu.

Isatis, du grec, *j'aplanis*, parce qu'on employoit le Pastel pour dissiper les tumeurs.

Ischæmum, du grec, *je réprime* et *sang*, à cause de ses propriétés pour étancher le sang.

Isnardia, du nom d'un Botaniste François.

Isoëtes, du grec.

Isopyrum, du grec, *semblable au Froment.*

Itea,

Itea, nom que les Grecs donnoient au *Saule*.

Iva, corrompu d'*Ajuga*.

Ixia, du grec, *glu*, parce qu'on en trouvoit souvent autour de la racine de la plante à laquelle on donnoit ce nom.

Ixora, du nom d'une divinité du Malabar.

J.

Jacquinia, du nom d'un Botaniste Flamand.

Jambolifera. . . . .

Jasione, nom donné par les Grecs à une espèce de *Campanule*.

Jasminum, mot turc.

Jatropha, du grec, *médicament* et *je mange*.

Juglans, *gland de* Jupiter.

Juncus, peut-être du latin, *jungere*, *joindre*, à cause de ses usages.

Jungermannia, nom d'un Botaniste Allemand.

Juniperus, du latin, *juvenis* et *pario*, parce que le *Genevrier* porte de nouveaux fruits pendant que les anciens mûrissent.

Jussiæa, du nom des *Jussieu*.

Justicia, du nom d'un Botaniste Écossois.

K.

Kalmia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Kæmpferia, du nom d'un célèbre Voyageur.

Kiggelaria, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Kleinhovia, du nom du directeur du jardin de Botanique de Java.

Kuautia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Knotia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Koënigia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Krameria, du nom d'un Botaniste Allemand.

Kuhnia, du nom d'un Botaniste Allemand.

L.

Lachnæa, du grec, *laine*, parce que dans la première espèce connue, les groupes des fleurs sont entourés d'une laine blanchâtre.

Lactuca, du latin, *lac*, *lait*, à cause de la couleur du suc propre qui découle des espèces de ce genre.

Lætia. . . .

Lagerstroëmia, du nom d'un Suédois.

Lagoëcia, du grec, *lièvre* et *gîte*, parce que les lièvres établissent leur gîte dans les lieux où croît cette plante.

Lagurus, du grec, *queue de lièvre*, à cause de la forme de son épi.

Lamium, du grec, *gueule*, à cause de la forme de ses fleurs.

Lantana, synonyme de *Viburnum* chez les Anciens.

Lapsana, du grec, *évacuer*, parce que l'espèce commune lâche le ventre.

Laserpitium, du grec, *déchirer*, parce qu'il découle des incisions qu'on fait à la tige, un suc gommeux appelé *laser*.

Lathræa, du grec, *clandestine*.

Lathyrus, du grec, *cacher*, parce que l'étendard recouvre les ailes et la carène.

Lavandula, du latin, *lavare*, *laver*, parce qu'on l'employoit dans les bains.

Lavatera, du nom d'un Médecin Suisse.

Laugeria, du nom du premier professeur de Botanique au Jardin des Plantes à Vienne en Autriche.

Laurus, du latin radical, ou peut-être de *laus*, *louange*, parce qu'une couronne de Laurier étoit la récompense des belles actions chez les Romains.

Lawsonia, du nom d'un Naturaliste Ecossois.

Lechea, du nom d'un Botaniste Suédois.

Lecythis, du grec, *vase*, à cause de la forme du fruit.

Ledum, nom donné par *Dioscoride* à une espèce de *Ciste*.

Leea, du nom d'un Anglois.

Lemna, du grec, *écaille*.

Leontice, du grec, *pied de lion*, à cause de la forme des feuilles.

Leontodon, du grec, *dent de lion*, à cause de la forme des feuilles.

Leonurus, du grec, *queue de lion*, à cause des anneaux nombreux qui forment l'épi.

Lepidium, du grec, *écaille*, parce qu'on employoit la *Passerage commune* pour dissiper les écailles ou taches de rousseur qui viennent sur le visage.

Lerchea, du nom d'un Botaniste.

Leucoïum, du grec, *Violette blanche*.

Leysera, du nom d'un Botaniste Allemand.

Lichen, ainsi nommé parce que les Anciens l'employoient dans les maladies de la peau, nommées *Lichenes*.

Ligusticum, ainsi nommé de la Ligurie.

Ligustrum, ainsi nommé de la Ligurie, où cet arbrisseau croissoit abondamment.

Lilium, latin radical.

Limeum, du grec, *peste*, *contagion*.

Limodorum, du grec, *présent de la faim*.

Limonia, du grec, *pré* et *verdure*, à cause de la couleur des feuilles, ou à cause de son affinité avec les *Limons* de *Tournefort*.

Limosella, du latin, *limus*, *limon*, parce que la *Limoselle* croit dans les endroits fangeux.

Linconia. . . . .

Lindernia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Linnæa, du nom de l'immortel *Linné*.

Linum, du grec, *je tiens*, à cause des usages auxquels on employoit le lin; ou du grec, *lisse*, parce que les semences sont parfaitement unies.

Lipparia, du grec, *éclatant*, à cause de la couleur des feuilles

presque toujours soyeuses ou argentées.

Lippia, du nom d'un Botaniste Italien.

Liquidambar, *ambre* ou *baume liquide*.

Liriodendrum, du grec, *Lis*, *arbre*, à cause de la forme des fleurs.

Lisianthus, du grec, *fleur qui dissout*.

Lithospermum, du grec, *pierre*, *semence*, à cause de la dureté des noix qui renferment les semences.

Littorella, du latin, *litus*, *rivage*, parce l'espèce qui constitue ce genre croît sur le bord des eaux.

Lobelia, du nom d'un Botaniste Flamand.

Loëflingia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Loëselia, du nom d'un Botaniste Prussien.

Lolium, de l'allemand *Lülch*.

Lonchitis, du grec, *lance* ou *pique*, à cause de la forme des pinnules des feuilles.

Lonicera, du nom d'un Botaniste.

Loosa. . . . .

Loranthus, du grec, *lanière*, *fleur*, parce que la fleur est découpée en lanières dans plusieurs espèces de ce genre.

Lotus, du grec, *je desire*, parce que les bestiaux recherchent les espèces de ce genre.

Ludwigia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Lunaria, du latin, *luna*, à cause de la forme du fruit.

Lupinus, du latin, *lupus*, *loup*.

Lychnis, du grec, *lampe*, parce que les tiges et les feuilles de l'espèce connue des Anciens, étoient employées pour former des mèches.

Lycium, du nom de la Lycie, où croissoit la première espèce connue.

Lycoperdon, du grec, *Vesce de loup*.

Lycopodium, du grec, *pied de loup*.

Lycopsis, du grec, *figure de loup*, à cause des poils dont les feuilles et la tige sont hérissées, et qui imitent une peau de loup.

Lycopus, du grec, *pied de loup*.

Lygœum, du grec, *j'entrelace*, parce que l'on emploie en Espagne les chaumes de cette plante pour faire des corbeilles, des nattes, etc.

Lysimachia, du nom d'un roi de Sicile ou de Macédoine, selon *Pline*.

Lythrum, du grec, *sang*, à cause de la couleur des fleurs.

M.

Macrocnemum, du grec, *grand* et *jambes*, à cause de la longueur des pédoncules.

Magnolia, du nom d'un Botaniste François.

Mahernia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Malachra, du grec, *mou*, à cause de la vertu émolliente des espèces de ce genre, ou du peu de dureté de leur bois.

Malope, nom par lequel on désignoit une espèce de manne.

Malpighia, du nom d'un Botaniste Italien.

Malva, du grec, *j'amollis*, parce que plusieurs espèces sont employées comme émollientes.

Mammea, nom Américain.

Mannetia, du nom d'un Botaniste Italien.

Mangifera, qui porte le *Manga*, nom que les Malais donnent au fruit du *Manga*.

Manisuris, ainsi nommé, à cause de la forme de la plante qui ressemble à une queue de rat.

Manuela, ainsi nommé, à cause de l'écartement des divisions du limbe de la corolle, qui imite en quelque sorte les doigts de la main.

Maranta, du nom d'un Botaniste Italien.

Marchantia, du nom d'un Botaniste François.

Marcgravia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Marrubium, de l'hébreu, *suc amer*.

Marsilea, du nom d'un Botaniste Italien.

Martynia, du nom d'un Naturaliste Anglois.

Matricaria, ainsi nommé, à cause de ses vertus médicinales.

Matthiola, du nom d'un Botaniste Italien.

Medeola, du latin, *medere*, *guérir*, à cause de ses vertus médicinales.

Medicago, ainsi nommé, parce que la semence de la *Luzerne* ordinaire a été apportée de la Médie.

Melaleuca, du grec, *noir et blanc*, à cause de la couleur du tronc du *M. Leucadendra*, L.

Melampodium, du grec, *noir* et *pied*, à cause de la couleur de la racine.

Melampyrum, du grec, *blé noir*, à cause de la forme des semences qui sont noires, et qui ressemblent à un grain de froment.

Melanthium, synonyme du *Nigella*.

Melastoma, du grec, *bouche noire*, parce que les fruits noircissent la bouche de ceux qui en mangent.

Melia, nom donné par les Anciens au *Frêne*.

Melianthus, du grec, *miel*, *fleur*, à cause de la liqueur mielleuse contenue dans le segment inférieur du calice.

Melica, du grec, *Meline*, nom que *Théophraste* donnoit au *Panicum*; ou du latin, *Milium*, parce qu'il imite le panicule du *Millet*.

Melicocca, du grec, *fruit mielleux*, à cause de la saveur de la pulpe des fruits.

Melissa, du grec, *abeille*, parce que l'*abeille* recherche la fleur de la *Mélisse*.

Melittis, synonyme de *Mélisse*.

Melochia, nom arabe.

Melothria, nom que les Anciens donnoient à la *Bryone*.

Memecylon. . . . .

Menaïs, nom donné par *Pline* à une plante dont on se servoit contre la morsure des serpens.

Menispermum, du grec, *lune*, *semence*, à cause de la forme des semences.

Mentha, nom emprunté de la Fable.

Mentzelia, du nom d'un Botaniste Prussien.

Menyanthes, du grec, *fleur des mois*.

Mercurialis, nom emprunté de la Fable.

Mesembryanthemum, du grec, *fleur de midi*, à cause de l'heure où s'épanouissent les fleurs de la plupart des espèces de ce genre.

Mespilus, grec radical.

Messerschmidia, du nom d'un Botaniste Polonois.

Mesua, du nom d'un Médecin Arabe.

Michelia, du nom d'un Botaniste Italien.

Micropus, du grec, *petit pied*.

Milium, du latin, *millè*, à cause du nombre de ses semences.

Milleria, du nom d'un Botaniste Anglois.

Mimosa, du latin, *mimus*.

Mimulus, nom de *Pline*.

Mimusops, du grec, *face*, *et singe*, à cause de la forme des fleurs.

Minuartia, du nom d'un Botaniste Espagnol.

Mirabilis, ainsi nommé, à cause de la variété des couleurs que présentent les fleurs sur la même tige.

Mitchella, du nom d'un Naturaliste Anglois.

Mitella, *petite mitre*, à cause de la forme du fruit.

Mnium, nom grec qui signifie *Mousse*.

Moëhringia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Mollugo, du latin, *mollis*, à cause de la texture molle de la plante.

Mollucella, du nom des isles Moluques.

Momordica, du latin, *mordere*, à cause de la forme des semences rongées et comme mordues dans quelques espèces.

Monarda, du nom d'un Botaniste Espagnol.

Monnieria, du nom d'un Botaniste François.

Monotropa, du grec, *je tourne seul*, à cause de la disposition des fleurs tournées d'un seul côté.

Monsonia, du nom d'une Angloise.

Montia, du nom d'un Botaniste Italien.

Morœa, du nom d'un Voyageur en Portugal?

Morina, du nom d'un Médecin François.

Morinda, de *Morus* et *Inda*, *Mûrier d'Inde*, à cause de la ressemblance du fruit avec celui du *Mûrier*.

Morisonia, du nom d'un Botaniste Ecossois.

Morus, du grec, *Morea*, *Mûrier*.

Mucors, du latin, *mucere*, *se corrompre*, et peut-être du grec, *mephitis*, ainsi nommé à cause de la mauvaise odeur qu'il répand.

Muenchausia, du nom d'un Naturaliste Allemand.

Muntingia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Murraya, du nom d'un Botaniste Allemand.

Musa, de *Musa* Médecin d'*Auguste*, selon quelques Auteurs.

Mussœnda, nom Indien.

Myagrum, du grec, *attrape-mouche*.

Myginda, du nom d'un Voyageur Allemand.

Myosotis, du grec, *oreille de souris*, à cause de la forme des feuilles.

Myosurus, du grec, *queue de rat*, à cause de la forme du réceptacle.

Myrica, nom que les Grecs donnoient au *Tamarisque*.

Myriophyllum, du grec, *feuilles très-nombreuses*.

Myrsine, nom que *Théophraste* donnoit au *Myrte*.

Myrtus, de l'arabe ou du grec, *parfum*.

N.

Naïas, nom poëtique.

Nama. . . . .

Napœa, du grec, *bois*, ou de *Napée* Nymphe des bois.

Narcissus, nom propre, très-connu dans la Fable.

Nardus, mot arabe et hébreu, adopté par les grecs et les latins.

Nauclea. . . . . .

Nepenthes, nom donné par *Homère* à un breuvage que formoit *Hélène* pour dissiper les soucis de son époux.

Nepeta, nom d'une ville d'Italie, selon les uns; et selon d'autres, de ce qu'on l'emploie utilement contre la morsure du scorpion.

Nephelium. . . . .

Nerium, du grec, *humide*, parce que le *Laurier-rose* croît autour des eaux.

Neurada, du grec, *nerf*, à cause du fruit qui est hérissé d'épines.

Nicotiana, du nom de *Nicot*, ambassadeur en Portugal, qui en 1559 fit passer en France les semences du *Tabac*.

Nigella, dérivé de *niger*, *noir*, à cause de la couleur noire des semences.

Nigrina, ainsi nommé, parce que la plante qui constitue ce genre, noircit par la dessication.

Nissolia, du nom d'un Botaniste François.

Nitraria, ainsi nommé à cause du nitre que cette plante contient.

Nolana, du latin, *nola*, *sonnette*.

Nyctantes du grec, *Fleur de nuit*, parce que les fleurs de l'espèce appelée *Arbor tristis*, s'ouvrent pendant la nuit.

Nymphœa, ainsi nommé parce que le *Nénuphar* croît dans les eaux.

Nyssa, nom emprunté de la Mythologie.

O.

Obolaria, du latin, *obolus*, à cause de la petitesse et de la forme de ses feuilles.

Ochna, étymologie obscure.

Ocymum, du grec. *prompt*, parce que ses semences lèvent promptement.

Œdera, du nom d'un Botaniste Danois.

Œnanthe, du grec, *fleur de vigne*, parce que les fleurs ont en quelque sorte l'odeur et la couleur de celles de la vigne; ou plutôt parce qu'elles s'épanouissent au moment de la floraison de la vigne.

Œnothera, nom donné par *Théophraste* à une plante de cette famille.

Oldenlandia, du nom d'un Botaniste Danois.

Olea, nom latin dérivé du grec.

Olyra, nom donné par *Théophraste* à une plante graminée.

Omphalea, du grec, *centre*, *mari*, à cause de la disposition des anthères.

Onoclea, du grec, *âne*, *gloire*.

Ononis, du grec, *âne*, parce que les ânes recherchent l'*arrête-bœuf* ordinaire.

Onopordum, du grec, *pet d'âne*.

Onosma, du grec, *odeur d'âne*.

Ophiorrhiza, du grec, *racine de serpent*.

Ophioglossum, du grec, *langue de serpent*.

Ophioxylon, du grec, *bois* et *serpent*, à cause de ses vertus contre la morsure des serpens.

Ophira. . . . .

Ophrys, du grec, *sourcil*.

Orchis, du grec, *testicule*, à cause des deux tubercules de la racine.

Origanum, du grec, *joie des montagnes*.

Ornithogalum, du grec, *lait d'oiseau*.

Ornithopus, du grec, *pied d'oiseau*, à cause de la forme de la gousse.

Orobanche, du grec, *étrangle-orobe*.

Orobus, du grec, *nourriture des bœufs*.

Orontium, du grec, *montagne*, à cause de son climat natal.

Ortegia, du nom d'un Botaniste Espagnol.

Oryza, mot arabe et chaldéen, devenu commun à toutes les langues de l'Europe.

Osbeckia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Osmites, du grec, *odeur*, à cause de l'odeur de la fleur.

Osmunda, nom allemand; ou du latin *osmundare*, *nettoyer la bouche*.

Osteospermum, du grec, *semence osseuse*.

Osyris, du grec, *branchu* ou *rameux*.

Othonna, mot africain qui signifie *herbe decoupee*.

Ovieda, du nom d'un Espagnol qui a fait connoître plusieurs Plantes d'Amérique dans son

Histoire générale des Indes Orientales.

Oxalis, du grec, *acide*.

P.

PÆDERIA, du grec, *aimé des enfans*.

Pæderota, nom générique substitué par *Linné* à celui de *Bonarota*, membre de l'Académie de Florence, auquel on avoit consacré ce genre.

Panax, du grec, *remède souverain*, à cause de ses vertus médicinales.

Pancratium, du grec, *toute-puissance*, à cause des vertus qu'on lui attribuoit.

Panicum, du latin, *panis*, parce que sa graine peut servir à faire du pain.

Papaver, du latin, *papa*, *bouillie* qui servoit à nourrir les enfans, et dans laquelle on mêloit autrefois la semence du *Pavot*.

Parietaria, du latin, *paries*, parce que l'espèce nommée *officinale*, croit sur ou contre les murailles.

Paris, du nom de *Pâris* fils de *Priam*, qui connut cette plante et la mit en usage. Selon quelques Auteurs, du latin, *par*, *pair en tout*, parce qu'elle a quatre pétales, huit étamines, quatre feuilles, etc.

Parkinsonia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Parnassia, du Mont-Parnasse, où croissoit cette plante selon *Dioscoride*.

Parthenium, du grec, *vierge*, parce que la plante à laquelle les Anciens donnoient ce nom, étoit employée dans certaines maladies auxquelles les filles sont sujettes.

Paspalum, nom donné par *Théophrastre* au *Millet*.

Passerina, du latin, *passer*, *moineau*, parce que le fruit représente en quelque sorte la tête d'un moineau.

Passiflora, *Fleur de la passion*, ainsi nommée à cause d'une espèce de ressemblance dans les différentes parties de la fleur, avec les instrumens de la passion de *Jésus-Christ*.

Pastinaca, du latin, *pascere*, parce que la racine est employée comme nourriture.

Patagonula. . . . .

Pavetta, nom que les habitans de l'isle de Zeylan donnent à un arbrisseau.

Paullinia, du nom d'un Botaniste Danois.

Pectis, du grec, *peigne*, à cause des cils qui bordent les feuilles de la première espèce connue.

Pedalium, peut-être du latin, *pedalis*, à cause de la grandeur de l'espèce connue qui s'élève à un pied.

Pedicularis, *Herbe aux pous*, à cause de la vertu qu'on lui attribuoit pour détruire cette sorte de vermine.

Peganum, nom que les Anciens donnoient à la *Rue*.

Peltaria, du latin, *pelta*, *bouclier*, à cause de la forme du fruit.

Penæa, du nom d'un Botaniste Anglois.

Pentapetes, ainsi nommé à cause du nombre des loges de la capsule.

Pentorum, du grec, *cinq bornes*, à cause de la forme du fruit.

Peplis, ainsi nommé à cause de sa ressemblance avec le *Pourpier*.

Perdicium, synonyme d'*Helxine*.

Pergularia, du latin, *pergula*, *treille*, à cause de sa tige grimpante.

Perilla, du nom d'une fille, selon *Ovide*.

Periploca, du grec, *autour*, *lien*, parce que la tige se roule autour des plantes et des corps qu'elle rencontre.

Petesia. . . . .

Petiveria, du nom d'un Botaniste Anglois.

Petrea, du nom d'un Anglois.

Peucedanum, du grec, *Pin*, parce que les feuilles des espèces de ce genre ont quelque ressemblance avec celles du *Pin*.

Peziza, du grec, *soutenu sur un pied*.

Phaca, nom que les Grecs donnoient a la *Lentille*.

Phalaris, du grec, *blanchâtre*.

Phallus, d'un nom grec qui désigne l'organe mâle des animaux.

Pharnaceum, du nom d'un roi de Pont.

Pharus, ainsi nommé de la forme de la fleur qui imite une lanterne.

Phascum, nom donné par les Grecs à une petite mousse qui croît sur les *Mousses*.

Phaseolus, du latin, *phaselus*, *petit navire*, à cause de la forme des semences.

Phellandrium, du grec, *Liége mâle*.

Philadelphus, du nom de *Ptolomée* roi d'Égypte, surnommé *Philadelphe*.

Phillyrea, de *Phillyra* mère de *Chiron*, ou de *Phillyrius* qui avoit découvert cette plante.

Phleum, du grec, *abondant*, à cause de sa fécondité.

Phlomis, du grec, *brûler*, parce qu'on s'en servoit, dit-on, pour faire des mèches.

Phlox, du grec, *flamme*, à cause de la couleur des fleurs.

Phœnix, du nom de l'oiseau de la Fable nommé *Phénix*. *Kempfer* observe que c'est le *Dattier* qui a donné naissance à l'Histoire du *Phénix* de la Fable.

Phryma, ...

Phylica, nom que *Théophraste* donnoit à l'*Alaterne*.

Phyllanthus, du grec, *feuille*, *fleur*, à cause de la disposition des fleurs aux aisselles des feuilles.

Phyllis, du grec, *feuille*, parce que la beauté de cette plante consiste principalement dans son feuillage.

Physalis, du grec, *vessie*, à cause du calice qui est enflé.

Phyteuma, du grec, *engendrer*, à cause des vertus qu'on lui attribuoit.

Phytolacca, du grec, *plante*,

et de *lacca*, *laque*, à cause de ses baies dont on peut retirer une couleur qui approche de la laque.

Picris, du grec, *amer*, à cause de l'amertume de la plante.

Pilularia, du mot latin *pilula*, *pilule*, ainsi nommé à cause de la forme des fruits.

Pimpinella, corrompu de *bipinnula*, *à deux ailes*, parce que les folioles sont disposées sur deux rangs.

Pinguicula, du latin, *pinguis*, *gras*, parce que ses feuilles sont grasses au toucher.

Pinus, l'étymologie de ce nom est douteuse.

Piper, nom indien, adopté par les grecs et les latins.

Piscidia, ainsi nommé parce que les feuilles et les branches écrasées et jetées dans l'eau, enivrent le poisson.

Pisonia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Pistacia, étymologie obscure.

Pistia, du grec, *fossé*, à cause du lieu où croît l'espèce qui constitue ce genre.

Pisum, de la ville de *Pise*; ou du grec, *tomber*, parce que les tiges de plusieurs espèces tombent lorsqu'elles ne sont pas appuyées.

Plantago, du latin, *planta*, *plante*.

Platanus, du grec, *ample*, *large*, à cause de la largeur des feuilles.

Plectronia, peut-être du grec, *fermé*, parce que l'orifice du calice est fermé par cinq écailles velues.

Plinia, du nom d'un Naturaliste Romain.

Plukenetia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Plumbago, du latin, *plumbus*, *plomb*, à raison de la couleur des feuilles de l'espèce appelée *Europæa*.

Plumeria, du nom d'un Botaniste François.

Poa, du grec, *herbe* ou *pâturage*, parce que plusieurs espèces de ce genre fournissent un bon pâturage.

Pœonia, du nom *Pœon* qui, selon *Homère*, guérit avec une espèce de ce genre une blessure qu'*Hercule* avoit faite à *Pluton*.

Podophyllum, du grec, *semblable à un pied de canard*, à cause de la forme des feuilles.

Poinciana, du non d'un gouverneur des Antilles.

Polemonium, du grec, *beaucoup* et *seul*, parce que l'espèce commune a plusieurs folioles qui ne forment qu'une seule feuille. *Pline* le fait dériver de *guerre*, et prétend que deux princes qui vouloient chacun avoir découvert cette plante, se firent la guerre à ce sujet.

Polyanthes, du grec, *plusieurs fleurs*.

Polycarpon, du grec, *plusieurs fruits*.

Polycnemum, du grec, *à plusieurs jambes*, à cause des articulations de la tige.

Polygala, du grec, *beaucoup de lait*, parce que, dit-on, les vaches qui broutent cette plante donnent beaucoup de lait.

Polygonum, du grec, *plusieurs genoux*, à cause des articulations de la tige.

Polymnia, nom poétique.

Polypodium, du grec, *plusieurs pieds*.

Polypremum, du grec, *plusieurs pieds*, à cause du nombre de ses tiges.

Polytrichum, du grec, *beaucoup de cheveux*, à raison de sa coiffe qui est très-velue.

Pontederia, du nom d'un Botaniste Italien.

Populus, du grec, *beaucoup*, à cause de la grande quantité de feuilles que portent les *Peupliers*.

Porana. . . . .

Porella, ainsi nommé, parce que la capsule s'ouvre sur les côtés par plusieurs pores.

Portlandia, du nom d'un Anglois.

Portulaca, du grec, *cochon*, parce que l'espèce commune sert de nourriture à ces animaux.

Potamogeton, du grec, *voisin des fleuves*.

Potentilla, du latin, *potentia*, *puissance*, à cause des vertus attribuées aux *Potentilla Anserina* et *reptans*, L.

Poterium, du grec, *coupe*, à cause de la forme du calice.

Pothos, étymologie douteuse.

Prasium, peut-être du grec, *allumer*, parce que la plante est échauffante.

Premna, du grec, *tronc*.

Prenanthes, du grec, *fleur penchée*.

Primula, du latin, *première fleur du printemps*.

Prinos, peut-être du grec, *scie*, parce que les feuilles de presque toutes les espèces, sont à dents de scie.

Prochia. . . . .

Protea, de *Protée* dont parle la Fable, à cause des différences que présentent les espèces de ce genre, ou des nuances variées du feuillage de l'espèce nommée *Protée argentée*.

Proserpinaca. . . .

Prosopis, du grec, *masque*.

Prunella, nom allemand d'origine.

Prunus, nom asiatique d'origine.

Psidium, nom que plusieurs anciens Botanistes donnoient au *Grenadier*.

Psoralea, du grec, *gâle*, à cause des points glanduleux qu'on trouve sur les calices, les feuilles et les tiges de quelques espèces.

Psychotria, du grec, *fortifiant l'ame*, parce qu'on fait avec les graines d'une espèce de ce genre, une boisson aussi agréable que celle du café.

Ptelea, grec obscur.

Pteris, du grec, *aile*, à cause de la forme des feuilles.

Pterocarpus, du grec, *fruit ailé*.

Pteronia, ainsi nommé à cause

de la forme des semences, et des paillettes implantées sur le réceptacle.

Pulmonaria, du latin, *pulmo*, *poumon*, à cause des vertus attribuées à l'espèce officinale, pour guérir les maladies de ce viscère.

Punica, ainsi nommé, de Carthage son lieu natal, ou de la couleur de ses fleurs.

Pyrola, du latin, *Pyrus*, *Poirier*, à cause de la ressemblance des feuilles de la grande *Pyrole* avec celle du *Poirier*.

Pyrus, ainsi nommé à cause de la forme du fruit en pyramide.

Q.

Quassia, du nom d'un Nègre qui en découvrit les vertus.

Quercus, du grec, *rude*, parce que son écorce est rude au toucher.

Queria, du nom d'un Botaniste Espagnol.

Quisqualis, nom que *Rumphius* a donné à la plante qui constitue ce genre, à cause des changemens qu'elle éprouve.

R.

Rajania, du nom d'un Botaniste Anglois.

Randia, du nom d'un Pharmacien Anglois.

Ranunculus, du latin, *rana*, *grenouille*, parce que plusieurs espèces de ce genre croissent dans les lieux aquatiques.

Raphanus, du grec, *je parois rapidement*, parce que les semences lèvent promptement.

Rauwolfia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Reaumuria, du nom d'un Naturaliste François.

Reseda, du latin, *sedare*, *appaiser*, parce que les Anciens s'en servoient pour appaiser les inflammations.

Restio. . . . .

Rhacoma, synonyme de *rha*, selon *Pline*.

Rhamnus, nom donné par les Anciens à des plantes très-différentes.

Rheedia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Rheum, du grec, *couler*, à cause de sa vertu purgative.

Rhexia, du grec, *fracture*, à cause de la structure des étamines.

Rhinanthus, du grec, *fleur*, *nez*, à cause de la forme de la corolle.

Rhizophora, du grec, *porte-racine*.

Rhodiola, ainsi nommé à cause de l'odeur de la racine qui approche de celle de la *Rose*.

Rhododendrum, du grec, *arbre de rose*, à cause de la couleur de ses fleurs.

Rhus, du grec, *rouge*, à cause de la couleur du fruit.

Ribes, de l'arabe, *aigre*, *acide*.

Riccia, du nom d'un Botaniste de Florence.

Richardia, du nom d'un Botaniste.

Ricinus, ainsi nommé à cause de la ressemblance des semences avec l'insecte que les Anciens appeloient *Ricinus*.

Ricotia, du nom d'un Botaniste Italien.

Rivina, du nom d'un Botaniste Allemand.

Robinia, du nom d'un Professeur de Botanique à Paris.

Roella, du nom d'un Professeur d'Anatomie à Amsterdam.

Rondeletia, du nom d'un Naturaliste François.

Roridula, ainsi nommé à cause des poils dont les feuilles sont garnies, et qui sont terminés par des gouttes jaunes gluantes, semblables à des gouttes de rosée.

Rosa, du grec, *Rhodon*, *Rose*.

Rosmarinus, *rosée de mer*, selon les uns, parce que ses feuilles sont garnies d'une poussière blanchâtre semblable à la rosée; et selon d'autres, parce que ses feuilles ont une saveur amère, approchant de celle de l'eau de la mer.

Rotala, du latin, *rota*, *roue*, à raison de la disposition des feuilles.

Royena, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Rubia, du latin *rubere*, *devenir rouge*, parce qu'une espèce de ce genre est employée pour teindre en rouge.

Rubus, du latin, *ruber*, à cause de la couleur rouge des fruits du *Rubus fruticosus*, L. avant leur maturité.

Rudbeckia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Ruellia, du nom d'un Botaniste François.

Rumex, latin radical.

Rumphia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Ruppia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Ruscus, peut-être du latin, *rusticus*, ou *planta rustica*, parce que les paysans couvroient anciennement les viandes qu'ils vouloient conserver avec les feuilles de l'espèce appelée *Ruscus aculeatus*, pour les défendre des rats.

Ruta, du grec, *je conserve*, à cause du grand usage que les Anciens faisoient de la *Rue* pour conserver ou rétablir la santé.

S.

Saccharum, nom arabe.

Sagina, du latin, *engrais*.

Sagittaria, du latin, *sagitta*; *flèche*, à cause de la forme des feuilles.

Salacia. . . . .

Salicornia, du latin, *sel*, *corne*, parce que l'on retire du sel de quelques espèces de ce genre, et parce que les articulations sont garnies de deux pointes.

Salix, du latin, *salire*, parce qu'il croit très-vite.

Salsola, ainsi nommé à raison de la *Soude* qu'on retire par incinération de la plupart des espèces de ce genre.

Salvadora, du nom d'un Botaniste Espagnol.

Salvia, du latin, *salvare*, *sauver*, à cause des grandes vertus qu'on lui attribue.

Samara, nom donné à la semence de l'*Orme*.

Sambucus, de l'arabe, *purger*.

Samolus, de l'isle de *Samos*.

Samida, grec obscur.

Sanguinaria, ainsi nommé à cause de la couleur du suc de la racine.

Sanguisorba, du latin, *sanguinem sorbere*, à cause de sa vertu pour étancher le sang.

Sanicula, du latin, *sanare*, à cause des vertus vulnéraires de l'espèce appelée *Sanicula Europœa*, L.

Santalum, corrompu de l'arabe *sandal*.

Santolina, du latin, *sancta herba*, *herbe sainte*, à cause de ses vertus; ou de *santalum*, *santal*, à cause de son odeur.

Sapindus, du latin, *sapo*, *indus*, parce que l'écorce de son fruit est employée dans les Indes aux mêmes usages que le savon.

Saponaria, ainsi nommé, à cause de la propriété des feuilles de la *Saponaire officinale*, qui broyées et mêlées dans l'eau, forment une écume semblable à celle du savon.

Saraca, du nom d'un Botaniste.

Sarothra, du grec, *balai*.

Sarracenia, du nom d'un Botaniste et Médecin François.

Satureia, de l'arabe, *satar*, qui désigne dans cette langue la plus grande partie des labiées.

Satyrium, du latin, *Satyrus*.

Saururus, du grec, *lézard*, *queue*.

Sauvagesia, du nom d'un Botaniste François.

Saxifraga, ainsi nommé du lieu natal de la plupart des espèces qui naissent dans les fentes des rochers.

Scabiosa, du latin, *scabies*, à cause des vertus qu'on attribue à l'espèce nommée *arvensis*, pour guérir la gâle.

Scabrita, ainsi nommé, à cause de la forme et de la rudesse des rameaux.

Scœvola, du latin, *gaucher*, ainsi nommé, à cause de l'absence de la lèvre supérieure de la corolle, supposée semblable à l'inférieure.

Scandix, du grec, *aigu*, parce que les semences du *Scandix* sont terminées en pointe.

Scheuchzeria, nom d'un Botaniste Suisse.

Schinus, nom que *Dioscoride* donnoit au *Lentisque*.

Schmidelia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Schœnus, nom donné par les grecs à une espèce de jonc.

Schrebera, du nom d'un Botaniste Allemand.

Schwalbea, du nom d'un Médecin Hollandois.

Schwenkia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Scilla, du latin, *arefacio*, parce que l'espèce appelée maritime croit dans les lieux sablonneux.

Scirpus, du latin, *jonc*.

Scleranthus, du grec, *fleur cendrée*.

Scolymus, du grec, *je déchire*, à cause des piquans dont la plante est armée.

Scoparia, du latin, *balayeuse*, parce qu'on fait des balais avec la *Scoparia dulcis*, L.

Scorpiurus, du grec, *queue de Scorpion.*

Scorzonera, du catalan, *scorzo*, *vipère*, parce que l'espèce ordinaire est employée contre la morsure de la vipère.

Scrophularia, ainsi nommé, parce que l'on a cru que l'espèce désignée sous le nom de *Scrophularia nodosa*, L. guérissoit les écrouelles.

Scutellaria, du latin, *scutum*, *écu*, espèce de bouclier, à cause de l'écaille en forme de bouclier qui accompagne le calice.

Secale, du latin, *secare*, *couper.*

Securidaca, du latin, *securis*, *instrument à couper*, à cause de la forme du fruit.

Sedum, du latin, *sedare*, *appaiser*, à cause de la vertu attribuée à quelques espèces de ce genre.

Seguieria, du nom d'un Botaniste François.

Selago, du latin, *seligo*, *je choisis*, parce que les Druides faisoient grand cas de cette plante.

Selinum, du grec, *marais*, parce qu'une espèce de ce genre croît dans les marais.

Sempervivum, ainsi nommé à cause de la durée des feuilles, qui sont toujours vertes dans plusieurs espèces.

Senecio, du latin, *senex*, *vieillard*, à cause des aigrettes des semences qui sont blanches.

Septas, du latin, *septem*, *sept*, à cause du nombre des parties de la fructification.

Serapias, du nom de *Sérapis*, Divinité des Égyptiens.

Seriola, du grec, *petite chicorée.*

Seriphium, nom chaldéen.

Serpicula, ainsi nommé, parce que la tige rampe sur terre.

Serratula, peut-être de *serra*, *scie*, à cause des feuilles à dents de scie dans plusieurs espèces.

Sesamum, mot indien d'origine adopté par les grecs et les latins.

Seseli, nom barbare *ou* exotique.

Sesuvium, synonyme de *Sedum.*

Sherardia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Sibdaldia, du nom d'un Médecin Écossois.

Sibthorpia, du nom d'un Botaniste Anglois.

Sicyos, nom que les anciens donnoient au *Concombre.*

Sida, nom donné au *Grenadier.*

Sideritis, du grec, *fer*, parce qu'on s'en servoit pour guérir les blessures.

Sideroxylon, du grec, *bois de fer.*

Sigesbeckia, du nom d'un Botaniste Russe.

Silene, du grec, *écumeux.*

Silphium, nom donné par les Anciens à une espèce de *Laserpitium.*

Sinapis, du grec, *nuisible aux yeux*, à cause de la grande acrimonie des semences.

Siphonanthus, du grec, *tubulé*, à cause de la forme et de la longueur de la corolle.

Sirium. . . . .

Sison, du grec, *se réjouir*.

Sisymbrium, nom donné par les Anciens à plusieurs plantes différentes.

Sisyrinchium, du grec, *grouin*, *cochon*, soit à cause de la forme de la racine, soit parce que les cochons la déterrent pour s'en nourrir.

Sium, du grec, *nager*, parce que plusieurs espèces de ce genre flottent sur les eaux.

Sloanea, du nom d'un Botaniste Anglois.

Smilax, du nom de *Smilax*, jeune fille qui, éprise d'amour pour *Crocus*, fut changée, selon la Fable, en cet arbuste.

Smyrnium, de la ville de Smyrne, ou parce que la racine a l'odeur de la *Myrrhe*.

Solandra, du nom d'un Botaniste Anglois.

Solanum, du latin, *solari*, *consoler*, à cause de la vertu calmante attribuée à quelques espèces de ce genre.

Soldanella, du latin, *soldum*, ou *solidum*, ou *sou*, à cause de la forme arrondie de ses feuilles.

Solidago, ainsi nommé, à cause de sa vertu vulnéraire.

Sonchus, du grec, *creux*, à cause de ses tiges qui sont fistuleuses.

Sophora, nom donné anciennement à une plante de la famille des fausses Légumineuses.

Sorbus, de l'arabe, *boisson*.

Sparganium, du grec, *ruban*, ainsi nommé, à cause de la forme des feuilles.

Spartium, du grec, *lien*, parce qu'on se servoit des rameaux d'une espèce dont parle *Dioscoride*, pour lier la vigne.

Spatelia, ainsi nommé, à cause de la forme du spathe.

Spergula, du latin, *spargo*; parce que les semences se dispersent au loin.

Spermacoce, du grec, *semence aiguillonnée*, à cause des dents du calice qui surmontent le fruit.

Sphæranthus, du grec, *sphère*, *fleur*, à cause de la forme des fleurs ramassées en têtes arrondies.

Sphagnum, mot employé par *Pline* pour désigner une espèce de *Mousse* qui croît sur les arbres.

Spigelia, du nom d'un Botaniste Flamand.

Spilanthus, du grec, *tache*, *fleur*, à cause du contraste de la couleur des anthères et des corolles.

Spinacia, du latin, *spina*, selon quelques auteurs, à cause de sa semence aiguë et épineuse.

Spinifex, ainsi nommé, à cause de la forme des épis, terminés en pointe piquante.

Spiræa, du grec, *corde*, à cause de la souplesse des branches de quelques espèces.

Splachnum, nom donné par les Grecs à une espèce de *Mousse*.

Spondias, nom donné par *Théophraste* à une espèce de *Prunier*.

Stachys,

Stachys, du grec, *épi*.

Stehælina, du nom d'un Botaniste Suisse.

Stapelia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Staphylea, diminutif de *staphylodendron*, *raisin*, *arbre*, en grec, à cause des fleurs disposées en grappes.

Statice, du latin, *stare*, parce que selon quelques auteurs, l'espèce appelée *Armeria* est employée pour orner les plate-bandes ; ou selon d'autres, parce qu'on se sert d'une espèce de ce genre pour arrêter les hémorragies du nez.

Stellaria, du latin, *stella*, *étoile*, à cause de la disposition des pétales.

Stellera, du nom d'un Botaniste Allemand.

Stemodia, ainsi nommé, à cause de la forme des filamens des étamines.

Sterculia, nom emprunté de la Fable.

Steris. . . . .

Stewartia, du nom d'un Botaniste Anglois. .

Stilago. . . . .

Stilbe, du grec, *je brille*, à cause de la couleur éclatante des feuillets du calice intérieur.

Stillingia, du nom d'un Naturaliste Anglois.

Stipa, peut-être du latin, *stiparé*.

Stœbe, du grec, *couche*.

Stratiotes, du grec, *soldat*.

Strumfia, du nom d'un Botaniste.

Struthiola, *petite autruche*.

Strychnos, grec obscur.

Styrax, nom grec ou syriaque, d'où est venu le nom latin, *stiria*, parce que la résine de cet arbre tombe goutte à goutte.

Subularia, ainsi nommé, à cause de la forme des feuilles en alêne.

Suriana, du nom d'un Botaniste qui accompagna *Plumier* dans ses voyages.

Symphytum, du grec, *joindre* ou *consolider*, à raison des vertus vulnéraires de l'espèce la plus commune.

Symplocos, ainsi nommé, à cause de la réunion des pétales.

Syringa, nom africain.

Swertia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Swietenia, du nom d'un Médecin qui contribua beaucoup à l'établissement du jardin de Botanique à Vienne en Autriche.

T.

Tabernæmontana, du nom d'un Botaniste Allemand.

Tagetes, mot corrompu de *Tanacetum*.

Tamarindus, de l'arabe, *tamar*, *fruit*, et du latin, *indus*, *inde*, ou *fruit d'inde*.

Tamarix, de l'hébreu, *je purge*, à cause de ses usages en Médecine.

Tamus, étymologie obscure.

Tanacetum, corrompu d'*athanasia*, qui signifie en grec, *immortalité*, à cause de la durée des fleurs.

Tarchonanthus, de *torchon*, nom donné par *Avicenne* à l'*Estragon*, et du grec, *fleur*.

Targionia, du nom d'un Botaniste de Florence.

Taxus, du grec, *poison*, parce que l'*If* est un poison pour les chevaux.

Telephium, du nom de *Télèphe*, roi de Mysie.

Terminalia, du grec, *sommet*, parce que les feuilles pendent à l'extrémité des rameaux.

Tetracera, du grec, *quatre cornes*, à cause de la forme du fruit.

Tetragonia, du grec, *quatre angles*, à cause de la forme du fruit.

Teucrium, du nom de *Teucer*, prince Troyen.

Thalia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Thalictrum, du grec, *vert*, parce que les premières pousses de quelques espèces de ce genre sont d'un beau vert, ou du grec, *rejet* et *genoux*, parce que diverses espèces produisent des rejets genouillés.

Thapsia, du nom d'une isle où fut découverte l'espèce appelée *Thapsia Asclepium*, L.

Thea, du chinois *Thée*.

Theligonum, du grec, *engendrer* et *femme*, parce qu'on lui attribuoit la vertu de rendre les femmes fécondes.

Theobroma, du grec, *nourriture des dieux*.

Theophrasta, du nom d'un Naturaliste grec.

Thesium, du grec, *serviteur*, à cause de ses usages.

Thlaspi, du grec, *je presse*, à cause de la forme du fruit qui est comprimé.

Thryallis. . . . .

Thuya, du grec, *je parfume*, à cause de l'odeur que répandent les feuilles lorsqu'on les froisse.

Thymbra, dérivé de *Thymus*.

Thymus, du grec, *courage* ou *cœur*, parce que le *Thym* ranime les esprits vitaux.

Tiarella, *petite tiare*, ainsi nommé à cause de la forme du fruit.

Tilia, du grec, *aile*, à cause des bractées qui aident à la graine à voler et à être emportée dans les airs.

Tillœa, du nom d'un Botaniste Italien.

Tillandsia, du nom d'un Botaniste Italien.

Tinus, peut-être du grec, *petit*, parce que la plante s'élève peu.

Toluifera, qui porte le *Tolu*.

Tordylium, du grec, *je tourne*, à cause de la forme des semences qui sont arrondies.

Torennia, du nom d'un Botaniste Suédois.

Tormentilla, du grec, *tranchées*, à cause des vertus attribuées à l'espèce nommée *T. erecta*, L. pour guérir les coliques et les maux de dents.

Tournefortia, du nom de l'immortel *Tournefort*.

Tozzia, du nom d'un Botaniste de Florence.

Trachelium, du grec, *cou*, à cause de la longueur du tube de la corolle.

Tradescantia, du nom d'un Naturaliste Anglois.

Tragia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Tragopogon, du grec, *barbe de bouc.*

Trapa, du grec, *je tourne.*

Tremella, du latin, *tremere*, *trembler.*

Trewia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Trianthema, du grec, *trois fleurs*, à cause du nombre des fleurs.

Tribulus, du grec, *trois pointes*, à cause des pointes dont le fruit est armé.

Trichilia, ainsi nommé, à cause du nombre des feuilles, des sillons de la capsule, des semences, etc.

Thichomanes, du grec, *cheveux à foison*, ainsi nommé, à cause de la propriété qu'on lui attribuoit de faire pousser les cheveux.

Trichosanthes, du grec, *chevelue* et *fleur*, à cause des franges que présentent les segmens du calice.

Trichostema, du grec, *filamens*, *cheveux*, à cause de sa racine qui est fibreuse et munie de beaucoup de chevelus.

Tridax, ainsi nommé, à cause de la forme des fleurons divisés en trois parties.

Trientalis, d'un mot latin, qui désigne une mesure de hauteur ou la troisième partie d'un pied.

Trifolium, ainsi nommé à cause du nombre des folioles dont chaque feuille des espèces de ce genre est composée.

Triglochin, du grec, *trois pointes*, parce que la capsule s'ouvre à la base en trois parties.

Trigonella, diminutif de *trigona*, *trois angles*, ainsi nommé à cause de la forme de la corolle.

Trilix, ainsi nommé à cause du nombre des feuillets du calice, et des pétales.

Trillium, du grec, *trois*, parce que plusieurs parties de cette plante sont au nombre de trois.

Triopteris, du grec, *trois ailes*, à cause de la forme du fruit.

Triosteum, ainsi nommé à cause des trois semences osseuses qui forment le fruit.

Triplaris, ainsi nommé à cause du nombre des segmens du calice, des pétales, du style, et de la forme de la noix.

Tripsacum, peut-être du grec, *percer*, parce que la bâle de la fleur femelle est percée à la base.

Triticum, du latin, *tritus*, *broyement*, parce qu'on bat les épis pour faire sortir les grains.

Triumfetta, nom d'un Botaniste Italien.

Trollius, nom allemand que *Gesner* a employé le premier.

Tropæolum, du grec, *petit tro-*

phée, à cause de la forme des feuilles et des fleurs qui représentent des boucliers, des casques, etc.

Trophus. . . .

Tubalgia. . . .

Tulipa, mot turc d'origine.

Turnæra, du nom d'un Botaniste Anglois.

Turræa, du nom d'un Botaniste Italien.

Turritis, ainsi nommé à cause de la disposition des tiges qui imitent une tour.

Tussilago, du latin, *tussis*, toux, parce que les fleurs du *Tussilage* ordinaire sont employées contre la toux.

Typha, du grec, *marais*.

U.

Ulex, du latin, *uligo*, à cause des lieux où croit l'espèce qui constitue ce genre.

Ulmus, latin radical.

Ulva, d'un mot dont les latins se servoient pour désigner toutes sortes de plantes aquatiques.

Uniola. . . . .

Urena, nom du Malabar.

Urtica, du latin, *urere*, *brûler*, à cause des poils piquans dont plusieurs espèces sont hérissées.

Utricularia, du latin, *utriculus*, à cause des vésicules ou utricules dont les feuilles sont garnies.

Uvaria, du latin, *uva*, à cause de la forme des fruits qui ressemblent à ceux de la vigne.

Uvularia, du latin, *uva*, parce que les fleurs sont disposées en petites grappes.

V.

Vaccinium, latin radical.

Valantia, du nom d'un Botaniste François.

Valeriana, du latin, *valere*, qui signifie avoir de grandes vertus.

Vallisneria, du nom d'un Médecin de Padoue.

Vandelia, du nom d'un Botaniste Portugais.

Varronia, du nom d'un Agriculteur Romain.

Vateria, du nom d'un Botaniste Allemand.

Vatica, étymologie douteuse.

Velezia, du nom d'un Botaniste Espagnol.

Vella, nom que *Galien* donnoit à une espèce de *Sisymbrium*.

Veratrum, du latin, *vertere*, parce que cette plante fait perdre l'esprit.

Verbascum, corrompu du latin *barbascum*, formé de *barba*, parce que la plupart des espèces de ce genre sont cotonneuses.

Verbena, c'est-à-dire, *Veneris vena*, parce que l'espèce commune étoit en grande vogue chez les magiciens, qui l'employoient sur-tout pour tâcher

de rallumer les feux d'un amour prêt à s'éteindre.

Verbesina, ainsi nommé parce que la première espèce de ce genre a les feuilles semblables à celles de la Verveine.

Veronica, du nom d'une princesse.

Viburnum, du latin, *viere*, *lier*, parce que les nouveaux jets de la *Viorne*, souples et flexibles, peuvent servir de liens.

Vicia, du latin, *vincire*, *lier*, parce que la *Vesce* semble lier par le moyen de ses vrilles, les plantes qui l'avoisinent.

Vinca, du latin, *vincere*, *vaincre*, parce que la petite Pervenche triomphe de la rigueur des hivers.

Viola, nom grec venu de la nymphe *Io*; les Poëtes ont supposé qu'après sa métamorphose la *Violette* parut pour lui servir de pâture.

Viscum, du grec, *je retiens*, parce qu'il adhère aux branches des arbres.

Vitex, du grec, *je fléchis*, à cause de la flexibilité de ses rameaux.

Vitis, latin radical.

Volkameria, du nom d'un Botaniste Allemand.

W.

Wachendorfia, du nom d'un Botaniste Hollandois.

Waltheria, du nom d'un Botaniste Allemand.

Weimannia, du nom d'un Apoticaire de Ratisbonne.

Willichia, du nom d'un Botaniste Allemand.

Winterana, du nom d'un Navigateur Anglois.

X.

Xanthium, du grec, *jaune*; parce que l'espèce nommée *X. strumarium*, L. est propre, dit-on, à teindre les cheveux en blond.

Xanthoxylum, du grec, *bois jaune*.

Xeranthemum, du grec, *fleur sèche*, à cause des écailles du calice qui sont sèches et roides.

Ximenia, du nom d'un Botaniste Espagnol.

Xylophylla, ainsi nommé à cause de la dureté des feuilles.

Xylopia, du grec, *bois amer*.

Xyris. . . .

Y.

Yucca, mot péruvien.

Z.

Zamia, du grec, *dommage*, *préjudice*.

Zannichellia, du nom d'un Naturaliste Vénitien.

Zanonnia, du nom d'un Botaniste Italien.

Zea, du grec, *vivre*, parce que le *Mays* servit de nourriture aux premiers hommes.

Zinnia, nom d'un Botaniste Allemand.

Zizania . . . .

Ziziphora, du grec et de l'indien, *qui porte le Zizi.*

Zoëgea, du nom d'un Botaniste Suédois.

Zostera, du grec, *ceinture.*

Zygophyllum, du grec, *joug*, *feuille*, à cause des feuilles réunies deux à deux.

FIN du Tome cinquième et dernier.

E R R A T A.

Tome I.er

Introduction, page xx, ligne première : Table alphabétique françoise; lisez *Table alphabétique latine.*

Page 159, genre 168 : Chalef; lisez *Eléagne.*

Page 213, ligne 1re : CHALEF, ÆLEAGNUS; lisez *ELÉAGNE, ELÆAGNUS.*

Page 226, dernière ligne : terminées par un style plane; lisez *par un stigmate plane.*

Page 231, genre 215 : *Cor.* ciliée; lisez *Cor. ciliée ou velue.*

Page 237, genre 251 : Triostée; lisez *Trioste.*

Page 240, genre 334 : Nectaires en étoile; lisez *à Nectaires en étoile.*

Page 245, genre 388 : fruits comme arrondis; lisez *fruits alongés.*

Page 246, genre 400 : Viorme; lisez *Viorne.*

Page 307, espèce 20 : CAMPANULE des Rochers; lisez *CAMPANULE des Pierres.*

Page 360, espèce 3 : S. Menalophleus; lisez *S. Melanophleum.*

Pag. 399, genre 323 : LAURIER-ROSE; lisez *NERIE*, de même qu'à la page 233, à la table synoptique.

Page 511, espèces 5 et 6 : Pharnace distique et P. à feuilles en cœur : à rameaux tortueux; lisez *à grappes tortueuses.*

Tome II.

Page 368, ligne première, après POTENTILLE intermédiaire le nom latin a été oublié; lisez *P. intermedia*, L.

Tome III.

Page 15 : espèce 24; lisez 23.

Pag. 16, lign. 6 : esp. 25; lisez 24.

Page 28, *Crapaudine*, esp. 3, la localité a été oubliée; ajoutez *en Syrie.*

Page 65, ligne première : Bauh. Pist.; lisez *Bauh. Hist.*

Page 89, genre 808 : Anthirrhinum; lisez *ANTIRRHINUM.*

Page 118, *Selagine*, esp. 8, la localité a été oubliée; lisez *au cap de Bonne-Espérance.*

Page 119 : ÉRINE, *Erinus;* lisez *ERINE, ERINUS.*

page 131, genre 846, espèce 1, la localité a été oubliée; ajoutez *au Canada, en Virginie.*

Page 258, ligne 3, genre 928 : Ébénier, *Ebenus :* sans ailes. Il y a un double emploi, le caractère de ce genre étant répété ligne 30, où il doit être placé.

Page 302, genre 938, espèce 1, la localité a été oubliée; ajoutez *dans l'isle de Crète.*

Page 393, ligne 1re : CITRON Oranger; lisez *CITRONNIER Oranger.*

Page 634, lignes 9 et 10, les synonymes de *G. Bauhin* et de

Lobel ont été cités à faux pour la Boulette Ritro, *Echinops Ritro*, L. La citation de Lobel est *Spina alba*, *Icon.* 2, p. 9, fig. 1.

TOME. IV.

Page 23, genre 1100. esp. 1 et 2, la localité est mal indiquée; celle de l'espèce 2 doit être rapportée à l'espèce 1; et pour celle de l'espèce 2, lisez *sur les Alpes de Lapponie.*

Page 36, *Grenadille*, espèce 23, la localité a été oubliée; ajoutez *en Virginie, au Bresil.*

Page 62, à la table synoptique, le genre 1171, Charme, *Carpinus*, a été oublié; lisez CHARME, *CARPINUS.*

M. *Cal. Chatons* à écailles placées en recouvrement les unes sur les autres. *Cor.* nulle. Dix *Etamines.*

F. *Cal.* à six segmens peu profonds. *Cor.* nulle. deux *Pistils.* Une *Noix* nue.

Page 200. genre 1213 : ZANTHOXYLUM: lisez *XANTHOXYLUM.*

TOME V.

TABLE première, page xviij, lettre Z, 1re colonne, ligne 4 : Zanthoxyle; lisez *Xanthoxyle*, nom générique qui doit être placé au commencement de la lettre X.

TABLE seconde, page iij, lettre C: ajoutez après *Cæsalpinia*, ligne 4, *Cœanothus*; ces deux noms ont été placés mal-à-propos page 4, aux deux dernières lettres de la première colonne.

Page viij, lettre H : Heliotropium, tome II; lisez *tom. I.*

Page x, lettre L, seconde colonne, ligne 13 : Littospermum; lisez *Lithospermum.*

Page xvj, lettre S, première colonne, ligne 14 : Stœhelina; lisez *Stehœlina.*

Page xviij, lettre Z, première colonne, le genre *Zantoxylum* a été placé mal-à-propos dans cette lettre; il est indiqué lettre X, première colonne, ligne 2.

TABLE cinquième, page ix, lettre G, ligne 10 : Chamœ-Cyparissus; lisez *Santolina Chamœ-Cyparissus*, et non pas *Artemisia*, le tiret (–) a été placé mal-à-propos sous le nom *Artemisia.*

TABLE septième, page xix, ligne cinquième des noms génériques : Bursa-pastoris; lisez *—Bursa-pastoris*, le tiret (–) qui remplace le mot *Thlaspi* ayant été oublié.

TABLE onzième, pag. ij, colonne première, ligne 11 : MORISON, Anglois; lisez *Ecossois.*

63|3211/A

New York Botanical Garden Library
QK91 .S95 1779f v.5 gen
Linne, Carl von/Systeme des plantes : co
3 5185 00091 0669